Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

Kurs X-II

Doğum Astrolojisi, Bölüm 2

BURÇUN İLERLEMESİ

CC Zain

CofL Basın

www.light.org

önsöz

1909'da, Denver Colorado'daki bir Işık Kardeşliği toplantısına katılırken, Elbert Benjamine, Yoldaşlık tarafından Işık Kardeşliği derslerini yazması için yaklaştı. 1910'da kabul etti ve CC Zain mahlası altında yazmaya başladı. Her ders tamamlandığında seri ders formatında yayınlandı ve Işık Kardeşliği üyelerine dağıtıldı. 1934'te tüm dersleri yazmayı tamamladı. Sonunda seri dersler bugün elimizdeki kitaplara veya kurslara dönüştü.

18 Kasım 1951'de vefat edene kadar, kitaplar yeni bilgileri eklemek veya hataları düzeltmek için sürekli olarak düzenlendi. İç düzleme geçişinden sonra, isteği üzerine kitaplar aynı kaldı. Özel talimatları için bu CD-ROM'daki "İleri" bölümüne bakın.

Yirmi Bir Işık Kardeşliği Derslerinde yer alan materyal, yirminci yüzyılın başlarındaki kültürel ortamı yansıttığından, şüphesiz o zamandan beri daha yüksek düzeyde evrimleşmiş düşünce ile değiştirilen kavram ve fikirler olacaktır. Böyle olacağını tahmin etmişti. Örneğin, bugün birçoğumuz, onun döneminde yaygın olan cinsiyetçi dilden rahatsız oluyoruz. Ve Derslere dahil edilen bilimin çoğu bugün hala geçerli olsa da, artık kabul edilmeyen bir dizi bilimsel referans var. Bunun bir örneği, ölümünden bir yıl sonra 1952'de sahte olduğu tespit edilen Piltdown adamına yapılan atıftır. Zain, aynı zamanda, bilginin iletilmesi için bir araç olarak “eter”e atıfta bulunur.

elektromanyetik dalgalar. Zamanının bilim adamları tarafından esir kavramının gereksiz görüldüğüne işaret ederken, yine de onu faydalı bir kavram olarak tasvir eder. Kavramın son yıllarda bilimsel tartışmalara yeniden girmesi ilginçtir.

Arkaik veya yanlış görünen birkaç şey olsa da, çok sayıda faydalı kavram ve bilgi var. Örneğin, onun teorisi *astral madde*ve *Düşünce Öğeleri*veya*düşünce hücreleri* bilinçaltının nasıl çalıştığını ve astrolojik enerjilerin belirli düşünce öğelerini uyarmada nasıl çalıştığını açıklamak için yeni bir paradigma sunar. Bu teoriler, Hermetik Aksiyom'a "yukarıda nasılsa, aşağıda da öyle" yeni bir ışık tuttu ve iç (biçimlendirici) dünyanın nasıl iç içe geçtiğine ve yaşamdaki düşünceleri, duyguları, duyguları ve olayları nasıl şekillendirdiğine dair birleştirici bir açıklama sağlıyor. Bu yeni teoriler derindir ve araştırmaya ve derinlemesine düşünülmeye değerdir.

Şüphesiz astroloji veya simyanın uygulanması hakkında öğrenecek daha çok şeyimiz var. Yine de, CC Zain'in Yönlendirilmiş Düşünme ve Uyarılmış Duygu kavramları çığır açıcıydı. Büyü, günümüz psikolojisine ve görselleştirme ve pozitif düşünmenin tanınan gücüne dönüşüyor gibi görünüyor.

“Gerçek” için temel arayış söz konusu olduğunda, hiçbiri karşılaştırılamaz. Zain, Işık Kardeşliği Derslerinde belirttiği için bir şeyi doğru olarak kabul etmediğimizi savunuyor. Bunun yerine, her birimizi bilgiyi kendimiz için doğrulamaya zorluyor. Daha fazla keşfe yol açan soru sormaya devam etme felsefesidir. Derslerde sık sık tekrar eder: “gerçek seni özgür kılacak.” Hakikat arayışı ve

insan ruhunu özgürleştirme arzusu, ruhun ilerlemesi yolculuğunda ilerlememizi sağlar. Bir yaşam felsefesi olarak Hermetik geleneğin modern bilimle bütünleşmesi ileriye giden yolu aydınlatır. Işık Kardeşliği Dersleri, günlük yaşam deneyimlerini aydınlatan parlak bir fener gibi parlıyor.

Işık Kilisesi, 2010

Işık Ambleminin Kardeşliği

Bu grafik, Işık Kardeşliği'nin amblemidir. İç içe geçmiş iki üçgeni, genellikle Davut Yıldızı ile ilişkilendirilse de, aslında, Mısır gizem okullarında eğitim görmüş olan Musa'nın zamanından önce gelirler. İç içe geçmiş üçgenler, Babil (Keldani) esaretinden sonraya kadar bir Yahudi sembolü olarak ortaya çıkmadı. Gelenek, bu görüntünün daha eski zamanlardan Babillilere aktarıldığını iddia ediyor. Merkezde İlahın adı ve dışarıda astrolojik semboller bulunan geçmeli üçgenler topluluğu, Yıldızların Dini'nin eski amblemiydi.

İnisiyeler tarafından kullanılan iç içe geçmiş iki üçgen, diğer şeylerin yanı sıra, ruhun evrimi ve evrimi anlamına geliyordu.

Gereklilik Döngüsü aracılığıyla. Gelenek, androjen Ego'nun veya her ruhun özünde bulunan İlahi Kıvılcım'ın bilinçsiz ve mutlu bir Cennet saflığı durumunda var olduğunu, ancak İyilik Ağacı bilgisi yoluyla bilinç elde etmek uğruna maddi forma dönüşmeye ayartıldığını öğretir. ve Kötülük. Maddi alemlere inen tanrısal ego, erkek ve dişi ikiz ruhlara bölünür. Genellikle koyu renkli olan aşağı bakan üçgen, gerekli deneyimi kazanmak amacıyla ruhun maddi koşullara inişini gösterir. Genellikle açık renkli olan yukarı bakan üçgen, maddi koşullarda gerekli deneyimi kazandıktan sonra ruhun ruh alanına geri yükselişini veya evrimini gösterir. İnsan formunda öz-bilinçli farkındalığa ulaştıktan sonra, ikiz ruhlar ruhsal alemde yeniden birleşir.

Bu döngünün özü, dünyanın dini yaratılış hikayelerinin çoğunda bulunur. Örneğin, eski Mısır'da Osiris, öldürülmüş ve parçalanmış olarak tasvir edilir. On dört parçalanmış parça (her bir ruh yedili bir yapıya sahiptir), sonunda Delta'nın (maddi dünya) çamurlu kıyılarına atılmak üzere Nil'den (evrimsel yaşamın akıntısı) aşağı süzülerek gönderildi. Ama sadık İsis (Doğa) bu parçaları bir araya toplar ve üzerlerine yaşam nefesini üfler, yeniden birleşirler ve Osiris bir daha asla ölmemek üzere yeniden doğar. Bu alegoriler, ruhun göksel durumdan inişinin dramını, manevi dünyanın en yüksek aleminde ikiz ruhların ayrılmasını sembolik olarak tasvir eder, bir süre sonra Doğa onları tekrar bir araya getirir ve üzerlerine aşk nefesini üfler,

onları birleştirir ve birleşik güçleri ile bilinçli varlıklar olarak ölümsüz olmak için dönüş yolculuğuna çıkarlar.

Sembolün tepesindeki birleşik güneş ve ay, maneviyatın ve manevi alemlerde daha da ileri evrimsel ilerlemenin en iyi şekilde bir erkek ve bir dişi ruhun evliliği yoluyla gerçekleştirildiğini gösterir.

İç içe geçmiş üçgenlerin dışındaki yedi yıldız ve astrolojik semboller, astrolojik enerjilerin tüm yaşamı güçlü bir şekilde etkilediği inancını gösterir.

İç içe geçmiş üçgenlerin içinde, Tanrı'nın adı Jod-He-Vau-He, daha önceki kare biçimli Keldani harflerinden türetilen İbranice karakterlerle yazılmıştır. Bu şekilde yazılması, tüm evrene nüfuz eden ve üzerinde yönlendirici bir güç uygulayan bir Süper Zekanın olduğu inancını ifade eder. Dört astrolojik işaret, Kozmosun dört evrensel ilkesini veya sütununu sembolize eder - Tek İlke (İrade-Aslan), Tek Yasa (Cinsiyet-Akrep), Tek Ajan (Form-Boğa), Tek Gerçek (Gerçeklik-Kova) - bunun aracılığıyla bu Süper Zeka, kapris veya önyargı ile hareket etmek yerine her zaman çalışır.

Elbert Benjamine (CC Zain)
1882-1951
23 Ciltte 210 Işık Kardeşliği Dersinin Yazarı

Elbert Benjamine, 20. yüzyılın en üretken astroloji yazarlarından biriydi. 50'den fazla kitap ve binlerce dergi makalesi yazdı. Zamanının her fizik biliminde ustalaşmış bir bilgin olan Benjamine, aynı gücü metafizik bilimleri araştırmasına da getirdi. Doğal bir psişik ve kahin olarak doğdu. Bir genç olarak, artan farkındalığı onu bu uçaktan diğerine geçenlerle temasa geçirdi. 1898 sonbaharında ezoterik çalışmalarına başladı. 1900'de The Brotherhood of Light ile temasa geçti ve ciddi astroloji çalışmalarına başladı. 1910 baharında astroloji, simya ve büyü konularını kapsayan 21 Brotherhood of Light kursunu CC Zain mahlası altında yazma sözünü verdi. O zamandan 1951'deki ölümüne kadar, hayatının enerjisini ve kişisel kaynaklarını dersleri yazmaya ve Işık Kardeşliği öğretilerini yaymak için bir araç olarak Işık Kilisesi'ni kurmaya adadı. Çalışmasının kapsamı şu anda belki çok az anlaşılmıştır. Bununla birlikte, Kova Çağı fizik odaklı, bilim dünyasında ortaya çıktıkça, dehası daha geniş çapta anlaşılacaktır.

İleri

Din, optimum yaşam için talimatlar vermelidir. Optimum yaşam, uzun bir hastalık ve sefalet dönemini takip eden birkaç eğlenceli günden, birkaç keyifli haftadan veya birkaç yıllık sağlık ve maddi refahtan fazlasını kapsar. Optimum yaşam, tüm süresine kıyasla hayattan en iyi şekilde yararlanır. Fiziksel olanın çözülmesinden sonra yaşamın devam ettiğine dair muazzam bilimsel kanıt birikimi göz önüne alındığında, din hem dünyadaki yaşamı hem de mezarın ötesindeki yaşamı kucaklamalıdır.

Dünya üzerindeki yaşam sona erdikten sonra en iyi şekilde yaşamak için insan, enerjileri ve özellikleri hakkında iç düzlem alem hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmelidir. Ve hala fiziksel formdayken en iyi şekilde yaşayabilmesi için bu içsel plan enerjileri hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmesi gerektiği giderek daha açık hale geliyor.

Üniversite bilim adamları, duyular dışı algıyı kanıtladılar. İnsan ruhu, çoğu zaman, genellikle kendisinin bilmediği, aklı ve fiziksel duyuları aracılığıyla algılayamayacağı gelecekteki koşullara kendini uyarlamak için başarılı bir şekilde hareket ettiği bilgileri edinir. Fiziksel bedenini kaybettikten sonra tüm bilgilerin elde edilmesi gereken bu duyu dışı algı, fiziksel yaşam sırasında ve sonrasında eşit derecede değerlidir.

Üniversite bilim adamları da psikokinezi göstermiştir. İnsanın fiziksel kasları olmayacağı ve iç düzlemin nesneleri hiçbir şekilde yerçekimine ya da fiziksel baskıya tepki vermeyeceği için; Fiziksel olandan ayrıldıktan sonra, herhangi bir şeyi hareket ettirmek veya inşa etmek veya herhangi bir yere gitmek için insan psikokinezi egzersizi yapmalıdır. Hala yeryüzündeyken, çoğu zaman

psikokinezi hastaları iyileştirmek ve diğer arzu edilen fiziksel koşulları şaşırtıcı bir şekilde göstermek için devreye girer. Bu nedenle psikokinezinin dünya üzerindeki kullanımı, dünya hayatı yapıldıktan sonraki kullanımı kadar değerlidir.

İç düzlemde hava, nem ve ısıyı oluşturan moleküler titreşimler yoktur. Böylece fiziksel ortamdan ayrıldıktan sonra fiziksel hava koşullarından etkilenmez. İç düzlem hava durumunu oluşturan astrolojik titreşimlerden belirgin şekilde etkilendi. Yeryüzündeyken bunun farkında olmasa da, iç düzlemdeki havanın yaşamı üzerinde dış düzlemdeki hava durumu kadar veya daha fazla etkisi vardır. Bu nedenle, bu astrolojik koşulların nasıl tahmin edileceği ve bunlara ilişkin ne gibi önlemler alınması gerektiği bilgisi, insan için fiziksel bir formdayken olduğu gibi, dünya sonrası yaşamda da aynı derecede önemlidir.

İnsanlık, propagandaya körü körüne inanarak dinde veya siyasi görüşlerinde rehberlik edemeyecek kadar iyi eğitiliyor. Bazı ekonomik veya politik sistemleri savunanlardan kanıtlanan gerçekleri giderek daha fazla talep ediyor. Ve zamanı gelince dinini dayandıracağı ispatlanmış gerçekleri talep edecektir. 210 Işık Kardeşliği Dersleri'nde yazar, bu tür önemli dış plan ve iç plan gerçeklerini ve bunlardan elde edilecek mantıksal çıkarımları mümkün olduğunca ortaya koymaya çalışmıştır.

Yazar, Yıldızların Dini'nin yalnızca bu 210 Ders'te sunulan gerçeklerden ve mantıksal çıkarımlardan değil, aynı zamanda bu gerçekler keşfedilip doğrulandığı kadar hızlı ek gerçeklerle destekleneceğinden geleceğin dünya dini olacağına inanıyor. Yıldızların Dini

statik bir din değil. Kanıtlanabilir bilgide ilerleme olduğu kadar hızlı ilerleyecektir.

Bu yazar, 210 Işık Kardeşliği Derslerinde zaten yayınlanmış olanın son söz olduğuna veya onlarda hiçbir hata yapılmadığına veya yeni kanıtlanmış gerçeklerin fikirlerin bazı revizyonlarını gerekli kılmayacağına inanacak kadar aptal değil. orada sundu. Üniversiteye gittiğinde, birçok kimyasal elementin atomunun bölünemez, değiştirilemez ve yok edilemez olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Einstein, Görelilik Kuramı'nı henüz yayınlamamıştı. Ve gençliğinden bu yana uygarlığı büyük ölçüde değiştiren, henüz var olmayan dört şey: otomobiller, uçaklar, sinema ve radyo.

O hala dünyadayken, yeni önemli gerçekleri elde etmek ve Işık Kardeşliği Derslerini bunları içerecek şekilde revize etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bir sonraki uçağa geçtiğinde, hiç şüphesiz Yıldızların Dinine dahil edilmesi gereken yeni önemli gerçekler keşfedilecektir. Bununla birlikte, ortodoksluk, onları ortodoks görüşe uygun hale getirmek için kesinlikle yeterli kontrolü elde etmeye çalışacağından, o, Işık Derslerinin Kardeşliği'nin onları bıraktığında değişmeden kalması gerektiğine inanıyor.

Birinin bu derslere görüşler veya keşifler eklemesi ve onların hem övgüsünü hem de suçunu üstlenmemesi etik olmaz. Yazar, başka birinin fikirleri veya hataları için övgü istemiyor. Her dersin basılı sayfalarının son revize ettiği gibi bırakılmasını ister.

Ancak, yeniden baskıda, herhangi bir dersi 36 veya 40'a veya dört sayfanın herhangi bir katına çıkarmak kolaydır. Bu nedenle, yaptığı herhangi bir hatanın veya yeni keşiflerin veya bu keşiflerden türetilen mantıksal görüşlerin ortaya konulmasını önerir.

ve bu şekilde değiştirilmesi gerektiği düşünülen dersin 32 [orijinal format] sayfasını takip eden bir ekte detaylandırılmıştır. Bu yapılmadan önce ekin yazarı, bu şekilde yazdıklarını Işık Kilisesi Yönetim Kurulu'na sunmalı ve onaylarını sağlamalıdır. Ve onun adı, bu tür yorumların yazarı olarak ekte yer almalıdır.

210 Işık Kardeşliği Derslerinin yazarı, fiziksel ölüm tarihine kadar yazdığı gibi, Stellar İnançları olarak kalıcı olarak muhafaza edilmesini ve sonraki değişikliklerin onları yapan kişilere atfedilmesini istemektedir.



CC Zain
(Elbert Benjamine, 1882-1951)

Ağustos 1951'de Los Angeles,
California'da yazıldı.

Brotherhood of Light Seri Derslerinin Anahtarı[1]

3 ÇALIŞMA DALI

DERSİN ADI SAYI	DERS NUMARASI	SERİ DERS
ASTROLOJİ		
Astrolojik İmzalar	II	1-5, 20, 21, 46, 47
Spiritüel Astroloji	VII	71-83
Horary Astroloji	VIII	36, 86-92
Natal Astrology (2 kitap)	X	19, 103-117
Mundane Astrology	XIII	141-150
Hava Tahmini	XV	190-196
yıldız şifa	XVI	197-208
SİMYA		
Ruhsal Simya	III	49-54
Zihinsel Simya	IX	95-101
Doğal Simya (2 kitap)	XII	125-140
Uygulamalı Okültizm	XIV	151-162
Kozmik Simya	XVII	164-172
Organik Simya	XIX	209-215
Kişisel Simya	XXI	216-225
BÜYÜ		
Okültizm Yasaları	ben	39-45
Antik Duvarcılık	IV	6-18
ezoterik psikoloji	V	56-67
Kutsal Tarot	VI	22-33, 48
Kehanet ve Char.	XI	118-124
Ölçülemeyen Güçleri Okumak	XVIII	183-189
Sonraki Hayat	XX	173-182

1 Işık Kardeşliği Dersleri başlangıçta bireysel seri dersler olarak yayınlandı ve daha sonra kitap formatına dahil edildi.

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 1

Hermetik İlerleme Sistemi

Seri Ders Numarası 19

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

Logaritmalarla İlerleyen Boyutları Hesaplama

KURAL:Öğleden itibaren EGMT Aralığını bulun, görünüm o gün mükemmeldir (Büyük İlerleme Tarihi), efemeris tamamlandığını gösterir. Saatleri 2'ye bölün ve bu ayları ve dakikaları 4'ü arayın ve bu günleri arayın. Bu, Büyük İlerleme Tarihine karşılık gelen takvim yılının Sınırlama Tarihinden önceki veya sonraki takvim aralığını verir.

Örnek 1, Ders No. 113, Logaritmalarla Çözme.

Kayıt. (b)	1.8573	0° 20'	Venüs geçmiş yönü.
Kayıt. (a)	1.2950	1° 13'	günlük hareket Venüs çıkarın.
Kayıt. (d)	0,5623	6s 35dk	eksi EGMT aralığı

6'yı 2'ye bölmek 3mo verir. 35'i 4'e bölmek verir 9d. Böylece 3mo 9d eksi takvim aralığıdır.

1922y	3 ay	22 gün	LD takvim yılında.
	3 ay	9 gün	takvim aralığını çıkarın.
1921 yıl	12 ay	13 gün	tarih Venüs sekstil Satürn*r*.

Orantı veya Logaritma

Doğru Tarihleri Alın.

Sun'ın gelişmiş yönleri üzerinde çalışmak daha uygundur, MC ve Asc. orantıya göre. Ancak Güneş'in yıllık ilerlemesi olarak her zaman 60' kullanıldığında, ilerlemenin mükemmel olduğu tarih birkaç gün hatalı olabilir. Böylece aşağıdaki örnekte 4 Ocak'ta Güneş günde 60' yerine 61' hareket ediyor. Logaritma veya orantı yoluyla 61' kullanılması, görünümün tamamlandığı tarihi 3 Ocak 1922 olarak verir. Bununla birlikte, Güneş'in yıllık ilerlemesi olarak 60' kullanılarak elde edilen 6 Ocak 1922, tüm pratik uygulamalar için yeterince kesindir. amaçlar.

Örnek 6, Ders No. 111, Logaritmalarla Çözme

Kayıt. (b)	1.7270	0° 27'	mesafe Güneş seyahat
Kayıt. (a)	1.3730	1° 01'	etmelidir. günlük hareket
Kayıt. (d)	. 3540	10s 37dk	Güneş çıkarın. artı EGTM aralığı.

10'u 2'ye bölmek 5 mo verir. 37'yi 4'e bölmek 9 gün verir. 5mo 9d artı takvim aralığıdır

1921 yıl	7 ay	24 gün	LD takvim yılında.
	5 ay	9 gün	takvim aralığı ekleyin.
1922	1 ay	3 boyutlu	tarih Güneş yarım kare Venüs*r*.

Örnek 11, Ders No. 111'i Çözme
Logaritma ile.

MC tarafından ve dolayısıyla Güneş tarafından kapatılacak boşluk, derste belirtildiği gibi bulunur. 10 Nisan 1921'de Güneş ve Mars birbirinden 21° 45' uzaktadır ve MC karşıtlığını Mars p yapmak için henüz 8'i kapatmalıdır. Belirtildiği gibi, Güneş'in Mars'taki günlük kazancı 15'tir.

Kayıt. (b) 2.2553		0° 8'	Güneş açı yapmak için kazanmalıdır.
Kayıt. (a)	1.9823	0° 15'	Güneşin günlük kazancını çıkarın.
Kayıt. (d)	. 2730	12s 48dk	artı EGMT aralığı.

12'yi 2'ye bölmek 6mo verir 48'i 4'e bölmek 12d verir. Böylece 6mo 12d artı takvim aralığıdır.

2035y	2 ay	9 gün	LD takvim yılında.
	6 ay	12 gün	takvim aralığı ekleyin.
2035y	8 ay	21 gün	tarih MC muhalefet Mars.*p*.

Bölüm 1

Hermetik İlerleme Sistemi

RADITION asla kayıtlı tarihle karıştırılmamalıdır; yine de düzgün bir şekilde etiketlendiğinde bazen belirli bir ilgi olmadan değildir. Ve gelenek şu ki, tahmin sistemi Burada sunulan olayların muhtemel zamanı, Atlantis ve Mu günlerinden beri Işık Kardeşliği tarafından asla kaybolmadı.

Bu eski topraklarda karanlık kapandığında -gelenek öyledir- koloniler daha sonra yükselecek olan Mısır, Hindistan, Girit, Peru, Meksika, Çin ve Kalde - yedi eski uygarlık merkezi- kuruldu. Bu şekilde nakledilen YILDIZLARIN DİNİ, ellerinden geçtiği her halkın özellikleriyle değişikliğe uğrasa da, sonunda şimdiki nesle ulaşmıştır.

Natal, astrolojinin diğer dalları gibi bahsedilen ülkelerin her birinde uygulandı. Ancak Keldani'de tahminlerin doğruluğu, Anu-Enlil'in kesintisiz olarak bin yılı aşkın bir süredir devam eden gözlemler dizisi tarafından kontrol edildi; bu gözlemlerde, olayların olduğu gibi, kendileriyle çakışan astrolojik konumlarla birlikte kaydedildi. Bu, Keldanilere insan hayatındaki olayların doğasını ve zamanını tahmin etmede alışılmadık bir kesinlik kazandırdı.

Anu-Enlil serisi astrolojik gözlemler, arkeologların üzerinde kayıtların yapıldığı kil tabletleri ortaya çıkarmaları anlamında tarihseldir. Ancak Hermetik Sistemin daha eski bir kaynaktan türetilmiş olması ve bize Kalde yoluyla ulaşması bir gelenektir.

Geleneği kendisinden aldığım selefim, sistemi daha yüksek seviyeye geçişinden önce yirmi yıl boyunca kullandı. 1902'de, yaygın kullanımdaki tüm yöntemleri denedikten sonra, onu benimsedim ve Mayıs 1915'e kadar devam eden kapsamlı bir astrolojik uygulamada en tatmin edici buldum. Los Angeles'ta düzenlenen astrolojik dersler; ve Ekim 1917'de Hermetik Yol Tarifi Sistemi olarak yayınlandı ve o tarihten beri nerede yapılırsa yapılsın tüm B. of L. (şimdi C. of L.) sınıflarında sürekli olarak kullanılıyor ve test edildi ve dünya çapında çok sayıda astrolog tarafından benimsenmiştir.

Işık Kardeşliği Astrolojik Araştırma Departmanı Nisan 1924'te veri toplamaya başladı ve o zamandan beri bu Hermetik Sisteme göre belirli bir olayın zamanına kadar binlerce doğum haritası topladı, dikti ve ilerledi. Kurs XVI'da ele alınan 160 farklı hastalığın her biri için İlerlemiş Sabitler,*yıldız şifa*, Vücut Hastalığı ve Yıldız Tedavisi adlı kitapta ele alınan hastalıkların her biri ve kitapta ele alınan olayların her biri için,*Ne Zaman ve Hangi Olaylar Olacak?*[1], bu şekilde tespit edildi.

Miami'den Seattle'a ve New York'tan Los Angeles'a kadar Işık Kilisesi öğretmenlerinin yinelenen şikayeti, öğrencilerinin çeşitli sistemlerle o kadar karışık olduğudur.

Hermetik Sistemi kullandıklarını düşündüklerinde bile, gerçekte kendi alanlarında değerli olsalar da bu yöntemde yeri olmayan diğer faktörlerle muhakemelerini bulandırıyorlar.

Bazı öğrenciler de Büyük İlerlemeler ve Geçişler hakkında bilgi sahibi olduklarında yeterli eğitim aldıklarını düşünüyor gibi görünmektedir. Ancak hiç kimse, birinci sınıf astrologu, Küçük İlerlemeleri ihmal eden vasattan ayıran ayrıntılar konusunda bu kesinliğe sahip olamaz. Ve günden güne ve haftadan haftaya küçük olayları hayata çektikleri ve kişinin ve arkadaşlarının hayatındaki etkileri böylece kolayca gözlemlenebildiği için, onlarla tam olarak konuşmak, hatta daha az bir görevdir. büyük ilerlemelerde ustalaşmak için.

Tanıdığınız kişilerin doğum haritasını oluşturun. Hatırlayabildikleri her önemli olay için büyük ilerlemeli yönleri hesaplayın ve teorilerinize nasıl uyduğunu gözlemleyin. Önümüzdeki bir veya iki ay için çizelgelerinde daha önemli küçük ilerlemeli yönleri hesaplayın ve onlara gelecek yarım düzine küçük olayın doğasını ve tarihlerini söylemeye çalışın. Ardından sonuçları kontrol edin. Ve benzer şekilde, hem olay hem de önemi açısından, transit yönlerine dayalı olarak kararınızın ne kadar doğru olduğunu öğrenin.

Bu planı, burada ortaya konan sistemle tamamen temellenene kadar takip ederseniz ve onunla ne yapıp ne yapamayacağınızı bilirseniz, iyi bir astrolog olursunuz. Ve bu noktaya ulaştıktan sonra, dallanmanız ve ek bilgileri keşfetmeye çalışmanız için yeterli zaman olacaktır. Aslında, bu noktaya geldiğinizde, kesinlikle yapmalısınız.

anlamına gelir, bu nedenle bilginizin kapsamını ve kapsamını artırmak için daha fazla çaba gösterin.

Gereksiz Tüm Faktörlerden Uzak Durulmalı

Her araştırma alanına uygulanabilen en önemli bilim doktrinlerinden biri, bir koşulun önceden kabul edilmiş faktörlerle yeterince açıklanabildiği sürece, açıklamasına yeni hiçbir faktörün dahil edilmemesidir. Hem doğum haritasını çizerken hem de ilerleyişinde, malzeme biliminin sistemlerini bu kadar başarılı bir şekilde üzerine kurabildiği bu ilkeye inatla bağlı kaldık.

Bazen doğum haritasında Ay'ın Düğümlerini, Kaderin Kısmını ve Sabit Yıldızları neden ihmal ettiğimiz sorulur. Bunu yapıyoruz çünkü bugüne kadar bir insanın hayatında bu diğer faktörlere başvurmadan gezegenlerin konumlarıyla tatmin edici bir şekilde açıklanamayacak herhangi bir koşul bulamadık. Bu pozisyonların değeri yok demiyoruz; sadece şu ana kadar insanların yaşamlarındaki koşulları ve olayları açıklamak için bunları kullanma gereği duymadık.

İnsanların yaşamlarında ancak Asc'ın ilerlemiş yönleriyle yeterince açıklanabilecek olaylar meydana gelir. ve MC Böylece onları, şimdi açıklanacağı gibi, sanki gezegenlermiş gibi ilerletiyoruz. Ancak doğum haritasında diğer evlerin başlangıç açılarını hesaplamıyoruz ve gezegenleri diğer evlerin başlangıç açılarına göre ilerletmiyoruz ya da diğer evlerin başlangıç çizgilerini herhangi bir şekilde ilerletmiyoruz; çünkü şimdiye kadar çok kapsamlı araştırma çalışmalarımızda, bu tür yönler ve ilerlemeler olmadan tam olarak açıklanamayacak hiçbir şey bulamadık.

Duyu ötesi algısı aktif olan bir kişinin, başkaları için ne kadar güvenilmez olursa olsun, hemen hemen her sistemi alabileceği ve şaşırtıcı derecede kesin sonuçlar alabileceği akılda tutulmalıdır. Bununla birlikte, Hermetik Sistemi sunumumuzda amaçladığımız şey bir kehanet sistemi değildir; ama insan yaşamı üzerinde önemli bir etkisi olan tüm gerçek astrolojik enerjileri bulmak ve dahil etmek. Henüz keşfedilmemiş faktörler olabilir; ancak eğer öyleyse, onları ancak kapsamlı analiz yoluyla, yalnızca onların kullanımıyla belirli koşulların veya olayların tatmin edici bir şekilde açıklanabileceğine veya tahmin edilebileceğine tamamen ikna olduğumuzda dahil edeceğiz.

Olaylar Sadece Olağandışı Düşünce Hücresi Tarafından Çekilir faaliyetler

Olaylar ve koşullar, astral formdaki düşünce hücrelerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve diğer tüm canlıların yaşamlarına çekilir. Her canlının astral formu, deneyimlere eşlik eden bilinç tarafından inşa edilen, genellikle yıldız hücreleri dediğimiz bu tür hücrelerden oluşur.

Daha aktifleri, doğum haritasındaki gezegenler tarafından haritalanan dinamik yapılarda organize edilen bu yıldız hücreleri, kendilerine ait belirli bir zekaya sahiptir ve iç düzlemden, yaşam koşullarına ve yola karşılık gelen olayları kendine çekmek için çalışırlar. Onlar hissediyor.

Herhangi bir kaynaktan ek enerji almadıkları zaman, sadece doğum haritasında belirtilen miktarda ve türde aktiviteye sahip olurlar. Sadece bir kaynaktan – astrolojik titreşimler, düşünce titreşimleri veya

nesnelerin karakter titreşimleri—faaliyetlerinin bu şekilde gösterilen normalden daha büyük olduğu ek bir enerji kaynağı alırlar.

Doğumdan itibaren koşullanmanın etkisi ve fiziksel çevrenin mevcut olanakları da dikkate alınmak zorundayken, doğum astrolojisi ile olayların doğasını ve zamanını tahmin etmedeki temel sorun, bu nedenle, belirli yıldız hücre gruplarının içlerinde ne zaman olduğunu tespit etmektir. astral beden ek enerji alacak; ve onlara hangi hacimde, hangi uyum ve uyumsuzlukta ulaşacaktır.

Görelilik Şimdi İlerleyen Yönlerin Zamanın Nasıl Olduğunu Açıklıyor

Enerji Salımları

Einstein'ın Özel Görelilik Kuramı ancak son birkaç yıl içinde dünya çapındaki fizikçiler tarafından neredeyse evrensel olarak kabul edildi ve üniversitelerimizde öğretildiği gibi fiziğin temeli haline geldi.

Yüksek hızlı parçacıkların davranışını açıklamak için artık çok yaygın olarak kullanılan bu özel görelilik kuramının en temel anlayışı, hız ve zaman arasındaki karşılıklı ilişkidir. Mutlak zaman diye bir şeyin olmadığı, ancak hız arttıkça zamanın yavaşladığı, ışık hızında zaman durana kadar yavaşladığı kabul edilir. Tersine, zaman hızlandıkça, hız yavaşlar, ta ki aşina olduğumuz zaman hızında nesneler, fiziksel şeylerin gözlendiği hızda hareket etme eğiliminde olana kadar.

Işık hızında zaman durursa, bu kadar yavaş zamanın tek bir anında sonsuz sayıda olay gerçekleşebilir. Ve hızların olduğu bir alemde veya durumda

O kadar büyük değiller, ancak sıradan fiziksel nesnelerden daha büyükler, bu daha yavaş zamanın tek bir anında çok sayıda olay meydana gelebilir. Örneğin, rüyalarımızda ve bazı insanlar ölmenin eşiğindeyken, sıradan bir zamanda günler veya yıllar gerektiren, bu sınır halinin daha yavaş zamanının birkaç dakikasına sıkıştırılmış sayısız deneyimler vardır.

Malzeme bilimi artık sinir akımlarının elektriksel nitelikte olduğunu ve insanın elektromanyetik bir forma sahip olduğunu kanıtlamıştır. Elektromanyetik dalgalar yayıldığında ışık hızıyla hareket eder; ancak teller veya sinirler üzerinden akan elektrik akımları çok daha yavaş hareket eder. Başka bir deyişle, insanın elektromanyetik biçiminde, sıradan fiziksel maddeninkinden daha büyük hızlar vardır, ancak bunlar ışığın seyahat ettiği saniyede 186.284 mil (1942) kadar büyük değildir.

Daha önce söylenenlerden, eğer bir saat elde ettiği hıza göre yavaşlarsa, bilinç gitgide daha yüksek hızlara ulaştıkça, bu yavaşlamanın dört dakikalık alanı içinde giderek daha fazla deneyime sahip olabilecektir. zaman. İnsanın elektromanyetik biçiminde gerçekleşmesi beklenebilecek olanın sınırı içinde olan belirli bir hızda, dört dakikalık daha yavaş zamandaki deneyimlerin sayısının, dış yaşamın daha hızlı zamanındaki deneyimlerin sayısına oranı, 365¼'e 1'dir.

İnsan vücudunun bir elektromanyetik bölgesi ile fiziksel varlığı arasındaki hızların oranı 1'e 365¼ olduğundan, bu daha yavaş Ana İlerleme Zamanının dört dakikadan biraz daha az bir sürede meydana gelen olaylar, dış dünyanın daha hızlı Takvim Zamanında ifade edildiğinde. dünya 24 saat sürer ve 24 saat içinde olanlar

saat Sınır bölgesinin Büyük İlerleme Zamanı, fiziksel düzlemde dışsallaştırıldığında, olağan Takvim Zamanının 365¼ gününü alır; yani, sınır bölgesinde bir günde meydana gelen, dışsallaştırıldığında, daha hızlı fiziksel zamanın bir yılında gerçekleşir.

İnsan vücudunun başka bir elektromanyetik bölgesi ile fiziği arasındaki hızların oranı yaklaşık 13'e 1 olduğu için, dış dünyanın daha hızlı Takvim Zamanında ifade edildiğinde, bu daha yavaş Küçük İlerleme Zamanının yaklaşık 2 saatinde meydana gelen olaylar bir yer kaplar. 24 saatlik süre ve fiziksel düzlemde dışsallaştırıldığında sınır çizgisi bölgesinde bu Küçük İlerleme Zamanının 27.3 günü içinde gerçekleşenler, sıradan daha hızlı Takvim Zamanının 365¼ gününü alır; yani, bu Küçük İlerleme Zamanının 27.3 gününde gerçekleşen şey, bir yıllık daha hızlı fiziksel zamanda gerçekleşir.

İlerleyen açılar, astral bedende yapısal değişiklikler meydana getiren gün-yıl, ay-yıl veya yıl-yıl oranına göre salınan enerjilerin zaman-hız dönüşümlerini gösterir. Bu yapısal değişiklikler, yıldız hücrelerinin gezegenlerden ek enerjiler almalarını ve böylece belirli türden olayları yaşama getirmek için iç düzlemden çalışma ivmesini kazanmalarını sağlar.

İlerlemiş bir gezegen tarafından haritalandırıldığı şekliyle enerji salımı, ev tarafından haritalanan astral bedenin ve ilerlemiş gezegenin bulunduğu doğum haritasının işareti olan kompartıman ve bölgesindedir. Böylece, doğum haritasındaki bir evden sadece Geçiş, Küçük İlerleme veya Büyük İlerleme ile hareket eden bir gezegen, astral bedende, doğanın, enerjinin enerjisini almasını sağlayan yapısal bir değişiklik meydana getirir.

o bölgedeki ilerlemiş gezegen tarafından gösterilir. İlerleyen bir gezegen tarafından gösterilen enerji salınımı, astral beden içinde geçici bir yıldız dinamik yapısı oluşturur. Bu, gezegenin titreşim hızının enerjilerini almak ve astral bedenin o bölümüne iletmek için bir radyo alıcı terminali görevi görür.

İlerleyen Yönler Geçici Yıldız Antenleri İnşa Eder

Böyle gelişmiş bir gezegen, doğum haritasındaki bir gezegenle veya başka bir büyük-ilerlemiş gezegenle bir açı oluşturduğunda, enerji salınımı astral beden boyunca bir anten görevi gören ve iki terminaline, enerjiyi alıp ileten bir hat oluşturur. açıda yer alan iki gezegenin türleri. Kapsamlı istatistiksel çalışmalarımızda, Mars veya Güneş söz konusu olduğunda ve aynı zamanda Toplanma Kuvvetleri olarak hareket eden diğer ağır gelişmiş yönler olduğunda, belirtilen olayların ilerleme yönü bir derece kadar olduğunda ve mükemmelden bir buçuk. Ancak genel bir kural olarak, içinde ilerlemiş bir görünüm tarafından belirtilen olayın gerçekleşmesinin beklenebileceği etkin küre, mükemmel açıdan bir derecedir.

Mükemmelden bir dereceye ulaşmadan önce astral beden boyunca uzanan hat genellikle etkili bir anten görevi görecek kadar yoğun hale gelmemiştir. Ancak mükemmelden bir derecede, görünümün tepe yükünün yaklaşık yarısını almaya yetecek kadar yoğundur, görünüm mükemmel hale geldiğinde zirveye ulaşılana kadar gücü kademeli olarak artar, ardından bir dereceye kadar mükemmelin ötesine geçene kadar gücü azalır. tepe yükün sadece yarısı kadardır, bu noktayı geçtikten sonra artık etkili bir alıcı olmaktan çıkar.

Bir derece mükemmellik içindeyken, ilerlemiş açı, gezegenlerden, düşüncelerden ve nesnelerin karakter titreşimlerinden, her iki gezegenin frekansında olan ve ileten astral enerjileri alan astral beden boyunca uzanan geçici bir havanın haritasını çıkarır. onları, bu gezegensel terminaller tarafından astral bedende haritalanan yıldız hücrelerine gönderir.

Enerjinin döngüsel salınımı ile oluşturulan bu geçici yıldız antenleri, onları haritalayan görünüm tarafından belirtilen bir uzunluğa sahiptir ve bu, astral enerjinin herhangi bir kaynaktan türetilmiş olup olmadığını belirler. alırlar, uyumlu bir dönüş alırlar veya uyumsuz statik ile yüklenirler.

Uçlarındaki yıldız hücrelerine uyumlu enerjiyi ilettikleri ölçüde, oradaki düşünce hücrelerine olumlu olayları çekmek için çalışma ivmesi verilmiştir. Aynı şekilde, bu geçici yıldız antenleri, uçlarındaki yıldız hücrelerine uyumsuz olan enerjiyi ilettikleri ölçüde, orada bulunan düşünce gruplarına talihsizliği çekmek için bir itici güç verilir.

Ama böylece astral bedendeki herhangi bir düşünce hücresi grubunun faaliyet tipini alınan yeni enerjiyle hızlandırılmış olarak ele alırken, insan doğumundan bu yana şartlanma ile değiştirilmiş olarak orijinal olarak oluştukları koşullar nedeniyle zaten sahip oldukları faaliyet türü. , alınan yeni enerjinin kalitesi kadar önemlidir.

Yani, olumsuz doğum haritası yönleriyle haritalandırıldığı gibi, uyumsuz düşünce bileşiklerinden oluşuyorlarsa, onlara yalnızca uyumlu bir enerji kaynağı eklemek,

doğasını değiştirmek için yeterli değildir. Ya da, doğum haritası yönleriyle gösterildiği gibi, oluştukları bileşik oldukça uyumluysa, onlara geçici olarak uyumsuz statik sağlamak, kendilerini talihsizlik çekmeye çalışacak kadar yoğun bir şekilde kötü hissetmelerine neden olmaz.

Geçici bir yıldız anteni tarafından sağlanan herhangi bir enerji, bu nedenle, bir grup yıldız hücresinin hissettiği uyum veya uyumsuzluğun miktarını belirlemede, doğum haritasındaki yönlerle haritalanan kalıcı antenlerden daha önemli değildir.

Bu kalıcı yıldız antenleri, onları çözmek için yeni düşünce süreçlerinin kasıtlı olarak yetiştirilmesi yoluyla değiştirilmedikçe, yalnızca uçlarındaki düşünce bileşiklerinin doğasını belirtmekle kalmaz, aynı zamanda onları, ahenk veya uyumsuzluk tarafından belirtilen astral enerji ile beslemeye devam ederler. bakış açıları. Ve bileşiklerdeki düşünce elementleri, açıların gösterdiği gibi orijinal olarak birleştikleri ve aynı kalitede bir miktar enerji almaya devam ettikleri için, daha az kalıcı bir yıldız antenin sağladığı geçici enerji, onların bir şekilde hareket etmelerine neden olma gücünde sınırlıdır. geleneklerinden farklı bir şekilde.

Olayın Önemi, Yoğunluğuna Bağlıdır

Düşünce Hücresi Aktivitesi

Bu nedenle, belirli bir zamanda hangi olayların hayata çekileceğini tahmin ederken, yapılacak ilk şey, etkilenen astral beden bölmesindeki düşünce hücrelerinin normal bileşimini ve aktivitesini göz önünde bulundurmaktır. Ardından, bölme içindeki yıldız hücrelerine eklenen enerjinin hacmini, türünü ve uyumunu veya uyumsuzluğunu düşünün ve

Sadece bu yeni enerji arzından kaynaklanacak aktivite miktarını değil, aynı zamanda yeni enerji arzının normal uyum veya uyumsuzluk hissini nasıl değiştirdiğini veya vurguladığını da tahmin edin.

Olayın önemi, diğer şeyler eşit olmak üzere, alınan enerjinin hacmi ile orantılı olacaktır. Yani aynı fiziksel ortamda her zaman düşünce hücresi faaliyetinin miktarıyla orantılıdır. Ama olayın talihi ya da talihsizliği -uyumu ya da uyumsuzluğu- yalnızca eklenen enerjinin uyumu ya da uyumsuzluğu ile belirlenemez. Yeni enerji sadece yıldız hücrelerinin normal zevk veya acı hissini değiştirir. Onları tamamen değiştirmez. Bu nedenle, olayın talihi veya talihsizliği, yalnızca ilerlemiş yönün fiziksel çevre ile ilgili uyumu veya uyumsuzluğundan tespit edilemez, ancak çevre ile ilgili olarak aktif hale getirilen yıldız hücrelerinin uyumu veya uyumsuzluğundan belirlenmelidir.

Geçici yıldız antenleri tarafından toplanan daha küçük enerji hacmi nedeniyle, yalnızca daha az önemli olan olaylar, Küçük-İlerleme ve Geçiş yönleri ile belirtilen yıldız hücresi aktivitesi tarafından çekilir. Astral beden boyunca uzanan, yaklaşık olarak bir mükemmellik derecesi dahilinde, Ana-İlerleme veçhesi tarafından haritalanmış çok daha güçlü bir geçici yıldız anteni olmadıkça, olağanüstü öneme sahip hiçbir olay hayata çekilmeyecektir.

Ek düşünce hücresi faaliyetinin çektiği olay, elbette, doğum haritasındaki ev konumlarına göre haritalanan yıldız hücrelerinin ait olduğu bir yaşam bölümü ile ilgili olacaktır. Yani, olay bir veya daha fazlasına atıfta bulunacaktır.

astral bedendeki bölmeler, ev pozisyonuna göre, görünüm kuralına dahil olan gezegenler. Ve etkinliğe katılan koşullar bu gezegenlerin karakteristiği olacaktır.

Bu zor bir konu değil -çünkü ilerlemiş gezegensel açılar, yeni astral enerjiyi toplayan ve belirli yıldız hücre gruplarına ileten geçici yıldız antenlerinin astral beden boyunca oluşum zamanını o kadar güvenilir bir şekilde gösteriyor ki- ne zaman ve ne zaman bağlantılı olduğunu tam olarak tahmin etmek için. hayatın hangi bölümlerine, bir olay olacak. Ancak önemini, ne kadar şanslı veya talihsiz olacağını veya belirli bir olayı belirlemek çok daha zordur.

Düşünce Hücresindeki Uyum veya Uyuşmazlığın Belirlenmesi faaliyetler

Olayın şans veya talihsizlik derecesinin belirlenmesinin zor olmasının nedeni, yalnızca çevrenin düşünce hücrelerinin arzu ettiklerini gerçekleştirmeye sunduğu direnç veya kolaylıklar değil, aynı zamanda çeşitli koşulların yıldız hücresi aktivitesini etkileyebilmesidir. uyum veya uyumsuzluk konusunda. Etkilenen astral beden bölümünde düşünce hücrelerinin normal şekilde hissettikleri tahmin edilmelidir. O zaman, bu normal duygunun yeni enerji akışıyla ne kadar değişip değişmeyeceği ölçülmelidir. Ayrıca, diğer gelişmiş yönlerin gösterdiği Toplanma Kuvvetlerinin, varsa, bu yıldız hücrelerine, enerji türleri ile ne ölçüde ulaşabileceği dikkate alınmalıdır.

Yani, her zaman genel Zihinsel Tutum faktörü vardır; çünkü eğer bu, özellikle ilerlemeye rağmen

Bu, tüm yıldız antenlerinin uçlarındaki yıldız hücrelerine bu uyumun veya uyumsuzluğun enerjisini sağlar ve onların talih veya talihsizlik çekme faaliyetleri buna göre değiştirilir.

İlerlemiş yönlerin genellikle kendi uyum veya uyumsuzluklarına göre çalışmasının nedeni, çok az kişinin böyle zamanlarda belirtilen şeyi düşünmesine ve hissetmesine izin vermeye direnmesidir. Dini inançları veya Yeni Düşünceye olan inançları nedeniyle, bariz olumsuzluklara rağmen kendilerini neşeli ve mutlu hissetmeye devam edenler tarafından olduğu gibi, Zihinsel Simya veya Toplanma Güçlerinin farkında olmadan uygulanması bile, gözlemleme fırsatı bulduğumuz gibi, oldukça belirgin bir şekilde değiştirir. aksi takdirde ciddi bir ilerleme yönünden beklenebilecek talihsizlik.

Başka bir deyişle, bireye çekici gelen şey doğum haritasından veya ilerlemiş görünümden değil, içsel düzlemden çalışan astral bedendeki düşünce hücrelerinin aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hangi kaynaktan gelirse gelsin, bu düşünce hücresi etkinliğini değiştiren veya düşünce hücrelerinin gerçekleştirmeye çalıştığı fiziksel çevrenin direncini değiştiren herhangi bir şey, kaderi de değiştirir.

Bunun nedeni, astral beden içindeki yapısal değişikliklerin -zamana ve doğaya ilişkin olarak Büyük İlerlemeler, Küçük İlerlemeler ve Geçişler hesaplanarak tespit edilebileceği- genellikle astral enerjilerin astral beden içindeki yıldız hücrelerine eklenmesinde en etkili araçlar olmasıdır. bunların her insan hayatında son derece önemli hale geldiğini.

Bireyin hayatındaki olumlu etkiler, önceden belirlenebilen zamanlarda astral bedeninde yapısal değişiklikler getiren enerji salınımlarını ölçerek, belirli yıldız hücrelerine olayları çekmek için enerji verir ve bu da bir astrologun ilgilenmesi gereken olaylardır. doğum haritasına ek olarak, yalnızca şu üçü vardır: Büyük Aşamalar, Küçük Aşamalar ve Geçişler.

Bu üç ilerleme ölçüsünün etkisinde gözlemlenecek tek fark, her biri tarafından belirtilen yapısal değişimin göreli miktarında ve sonuç olarak düşünce hücrelerine normal miktarlarının üzerinde verilen enerji hacmindedir, bu da olayları göreceli olarak önemli veya çekici hale getirir. önemsiz.

Yani, Geçişler tarafından belirtilen yapısal değişiklikler, düşünce hücrelerine yalnızca önemsiz olayları çekecek kadar ek enerji verir. Küçük İlerlemeler tarafından belirtilen yapısal değişiklikler, yıldız hücrelerine yaşamın küçük olaylarını çekmek için yeterli enerji sağlar. Ancak astral bedenin herhangi bir bölmesindeki düşünce hücrelerine iç plan faaliyetleri yoluyla önemli olayları yaşama çekebilmeleri için yeterli ek enerji sağlayan yalnızca Büyük Gelişmelerin gösterdiği yapısal değişikliklerdir.

Büyük İlerlemeler

Başlıca ilerlemeler, insan hayatındaki bir astrolojik yıl boyunca astral bedende meydana gelen başlıca yapısal değişikliklere neden olan enerjiyi serbest bırakan bir görünür güneş günü sırasında gezegenlerin hareketlerinin oranı ile ölçülür.

Bu basitçe, doğumdan sonra her dört dakikada bir gezegenlerin hareketleri ve konumlarının doğumdan sonra her gün astral bedende meydana gelen yapısal değişiklikleri gösterdiği anlamına gelir; Doğumdan sonraki her iki saatte bir gezegenlerin hareketleri ve konumlarının, doğumdan sonraki yaşamın her ayına gösterilen yapısal değişiklikleri yaydığı ve doğumdan sonraki her gün gezegenlerin hareketleri ve konumlarının, astral beden içindeki yapısal değişikliklerle ilgili olduğu. karşılık gelen yaşam yılı boyunca yer. Bu nedenle, büyük önem taşıyan herhangi bir özel yapısal değişikliğin ne zaman gerçekleşeceğini hesaplamak, yalnızca basit bir sorunu orantılı olarak çözme meselesidir.

1942'ye kadar, büyük ilerlemeli yönlerin verildiği zaman, Bölüm 2, 3 ve 4'teki metinde (Seri Dersler 111-1113) takip edilen şekilde mükemmel olacağının belirlenmesiyle ilgili basit sorunları orantılı olarak çözmek bir gelenekti. Ama o yıl referans kitabını yayınladım, *Standart Astrolojinin İlerleyen Yönleri*[2] İlerlemiş yönlerin hesaplanmasında yer alan orantılı basit problemlerin logaritma kullanılarak çözüldüğü .

İlerlemiş bir yönün mükemmel olduğu kesin zamanın, orantı yönteminin veya logaritma yönteminin kullanılmasıyla tamamen aynı olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, bazı öğrencilerin logaritmayı orantıdan daha kolay bulduğunu, diğer öğrencilerin ise orantıyı daha kolay bulduğunu keşfettik. Nihai sonuç tamamen aynı olduğu için kullanılan oldukça isteğe bağlıdır.

Bir gezegenin efemeris içinde birbirini izleyen iki öğlen arasındaki hareketinin, büyük ilerleme ile 12 aylık Takvim Zamanına eşdeğer olduğu görülecektir.

gezegenin 2 saat içindeki hareketi (24 saatin 12'si), gezegenin aynı 24 saat içindeki hareketinin 1/12'sine eşittir. Gezegenin 24 saat içindeki hareketi ister 12'ye bölünsün, ister 2 saat içindeki hareketi hesaplansın, sonuç aynıdır ve her iki durumda da, bir aylık Takvim Zamanı boyunca büyük ilerleme ile yolculuğunu temsil eder. Başka bir deyişle, ilerleme yoluyla astrolojik enerjilerin serbest bırakılmasına izin veren zaman-hız göreliliğinden, ilerlemiş bir gezegenin konumunun, uzaydaki orantılı hareketiyle hesaplanabileceği sonucu çıkar (aşağıdaki derslerin metninde gösterildiği gibi).) veya zamana göre orantılı hareketiyle (logaritma yöntemidir).

Astrolojiyi kurarken gezegenleri doğum haritasına yerleştirirken, bir gezegenin efemeris öğlen konumundan hareket ettiği mesafeyi (d) EGMT Aralığının logaritmasını, (a) günlük logaritmasını ekleyerek bulmak gelenekseldir. gezegenin hareketi. Bu şekilde bulunan logaritma (b) gezegenin kat ettiği mesafenin logaritmasıdır. Bu nedenle, (d) bir gezegenin kat etmesi gereken EGMT Aralığını (b) bir açıyı tamamlamak için gereken belirli bir mesafeyi bilmek istiyorsak, bu süreci yalnızca tersine çevirmemiz ve (a) logaritmasını çıkarmamız gerektiği açıktır. (b) gezegenin hareket ettiği mesafenin logaritmasından, gezegenin günlük hareketi.

EGMT Aralığı bu şekilde basitçe bulunduğunda, ana ilerlemeler için şu olan zaman-hız oranına göre Takvim Zaman Aralığına dönüştürülebilir:

24 saat (bir gün) büyük ilerleme (efemeris EGMT Aralığı) süresi 12 aylık (bir yıl veya 365¼ gün) takvim süresine eşittir.

2 saat (120 dakika) büyük ilerleme (efemeris EGMT Aralığı) süresi 2/24 yıl (bir ay veya 30 gün) takvim süresine eşittir.

4 dakika (120 dakika bölü 30) ana ilerleme (efemeris EGMT Aralığı) süresi 1/30 ay (bir gün) takvim süresine eşittir.

Şimdi, efemeris EGMT Aralığı, az önce belirtilen orana göre her zaman Takvim Zamanına dönüştürülebilen büyük ilerleme zamanı olduğundan, doğum gününde öğleden itibaren EGMT Aralığı (gezegenlerin öğlen konumlarından kat ettikleri mesafenin hesaplandığı) doğum haritasındaki yerlerini bulurken—Takvim Zamanına dönüştürülebilir. Gezegenlerin doğum günündeki öğlen konumları, böylece belirli bir takvim tarihindeki ilerlemiş konumlarını temsil eder. Matematiksel olarak, bulunan takvim tarihinin bireyin doğumundan önce olması bir fark yaratmaz, çünkü bu durumda, yaşamı boyunca ilerlemiş pozisyonları hesaplamak için bir başlangıç noktası elde etmek için sadece doğumdan geriye gittik.

Gezegenleri doğum haritasına yerleştirirken onları efemeris öğlen konumlarından ileri götürdüysek - artı EGMT Aralığı kullanarak - onları öğlen konumlarına geri getirmek için hareketlerini efemeris konumlarından çıkarmamız gerektiği açık olmalıdır. Ayrıca, gezegenleri öğlen konumlarına geri döndürmeye büyük ilerlemeyle karşılık gelen Takvim Tarihini tespit edeceksek,

gezegenlerin bu şekilde hareket ettiği EGMT Aralığı tarafından temsil edilen takvim aralığını doğumdan geriye doğru hareket ettirmelidir.

Bununla birlikte, eğer gezegenleri doğum haritasına yerleştirirken, onları tekrar öğlen konumlarına getirmek için -eksi bir EGMT Aralığı kullanarak - efemeris öğlen konumlarından geri aldıysak, aynı EGMT Aralığı sırasında hareketlerini ileriye taşımalıyız. Ve eğer gezegenleri öğlen konumlarına ileri doğru hareket ettirmeye büyük ilerlemeyle karşılık gelen Takvim Tarihini tespit edeceksek, doğumdan itibaren, gezegenlerin bu şekilde hareket ettirildiği EGMT Aralığı tarafından temsil edilen takvim aralığını ileri almalıyız.

İlerlemiş yönlerin hesaplanmasında izlenen yöntem ister orantı ister logaritma yöntemi olsun, bu şekilde bulunan takvim tarihi - SINIRLAMA TARİHİ olarak adlandırılır - takvim zamanındaki en uygun başlangıç noktasını oluşturur. Sınırlama Tarihi (LD), takvim zamanının yılını, ayını ve gününü içermelidir.

Gezegenlerin doğum günündeki efemeristeki konumları, LD'deki büyük ilerleme konumlarını temsil ettiğinden, efemeristeki gezegenlerin doğumu takip eden gündeki konumları, ayın ve günündeki ana ilerleme konumlarını temsil eder. LD bir sonraki takvim yılında; Birbirini takip eden her gün, ilgili takvim yılında LD'nin ayı ve gününde gezegenlerin büyük ilerleme konumlarını gösteren efemerlerde.

Belirli bir takvim yılının ayı ve günü için göründükleri gibi büyük ilerlemeye göre gezegenlerin konumlarını gösteren efemeris tarihine Binbaşı denir.

İlerleme Tarihi. Ve onu bulmak için, takvim zamanında temel veya başlangıç noktası olarak Sınırlama Tarihini ve ilerleme zamanında ona eşdeğer olan temel veya başlangıç noktası olarak doğum gününü kullanırız. Bu nedenle, Büyük İlerleme Tarihini bulmak için, doğum gününden (ana ilerleme zamanı), Sınırlama Tarihinden bu yana geçen yaşam yılları (takvim zamanı) kadar gün sayarız.

İlerlemiş MC'yi bulmak için, doğum haritasına MC, Güneş'in doğumdan bu yana ilerlediği derece ve dakika sayısını ekleyin. İlerlemiş Yükselen'i bulmak için, doğum enlemine göre evlerin bir tablosunu alın ve yalnızca Yükselen üzerindeki dereceleri ve dakikaları tespit edin. ilerlemiş MC zaten bulundu. Diğer ilerlemiş ev başlangıç çizgileri istenmez, ancak istenmişlerse, ilerlemiş MC ve Asc'ye karşılık gelen evler tablosundan alınabilirler.

MC ve Asc. diğer ev bardaklarından farklı olarak benzersiz konumlardır. MC, bir amplifikatör görevi gören astral beden boyunca ince bir mavi çizgiyi işaretler; iken Asc. elektromanyetik enerjinin dış dünyaya ulaştığı bir topraklama kablosu görevi gören ağır bir hat. Çok kapsamlı deneyim, yalnızca doğum haritasında değil, aynı zamanda ilerleme yoluyla da bu iki konumun gezegenlerin tarzından çok sonra hareket ettiği inancına yol açar.

Araştırma departmanımız tarafından ele alınan olayların zamanına kadar ilerlemiş yönleri olan binlerce doğum haritasında, bununla birlikte, doğum haritasındaki diğer ev başlangıçlarının yönlerini dikkate almayı veya ilerlemeyi asla gerekli bulmadık. Asc dışındaki evlerin sivri uçları. ve MC

Bir doğum haritasının ev çizgileri, astral bedendeki bir bölme ile diğeri arasındaki bölme zarlarının haritasını çıkarır. Ev çizgileri tarafından haritalanan bu astral zarlar, gezegenler gibi hareket etmezler. Sonuç olarak, biz doğum haritasının evleri üzerinden Yükselen, MC ve gezegenleri ilerletirken, Hermetik Sistemde tüm ev başlangıç çizgilerini ilerletmek anlamında ilerlemiş bir harita yoktur.

İlerlemiş yönler üzerinde çok sayıda araştırma çalışması yaptık ve bunların her zaman gezegenlerin ilerlediği veya yönettikleri doğum haritasındaki evler açısından işe yaradığını gördük.

MC'nin, Güneş'in ilerleme ile hareket ettiği mesafeyle aynı mesafede ilerlemesinin nedeni, bunun, ortalama zaman ile gerçek veya görünen güneş zamanı arasındaki farktan dolayı bir hatayı önlemesidir; büyük ilerleme tarihinde doğum.

Aşırı durumlarda bu tutarsızlık, ilerleyen MC ve Yükseliş'te yaklaşık 7½ derecelik bir hataya neden olur; bu da yaklaşık 7½ yıla eşdeğerdir. Ancak ilerlemiş gezegenlerin zamanlamasında böyle bir hata 8 günden az olacaktır. Ortalama olarak, orta yaş için ilerlemeleri hesaplarken, tutarsızlık belki 2 ila 12 dakika arasındadır. Bu, pratik amaçlar için yeterince yakın olan gezegensel ilerlemelerin zamanlanmasında bir ila üç günlük bir hataya neden olacaktır. Ama MC ve Asc.'nin ilerlemiş yönlerinin zamanlamasında, hata bir ila üç yıl arasında olacaktır ve bu tolere edilemez.

Küçük İlerlemeler

Küçük ilerlemeler, bir astrolojik ay boyunca gezegenlerin hareketlerinin, insan hayatındaki bir astrolojik yıl boyunca astral bedende meydana gelen küçük yapısal değişikliklere neden olan enerjiyi salma oranı ile ölçülür.

Bu, doğumdan sonra Ay zodyakın her derecesinden geçerken gezegenlerin hareketleri ve konumlarının doğumdan sonra her gün astral bedende meydana gelen küçük yapısal değişiklikleri gösterdiği anlamına gelir; Ay zodyak boyunca bir burç hareket ederken gezegenlerin hareketleri ve konumlarının, bir aylık yaşam boyunca astral bedendeki küçük yapısal değişiklikleri temsil ettiğini; ve Ay tüm zodyak çemberi boyunca hareket ederken gezegenlerin hareketleri ve konumlarının, tüm yıl boyunca orantılı olarak yayılan astral beden içindeki yapısal değişiklikleri gösterdiği.

KURAL: Ay'ın doğumda zodyaktaki konumundan, efemeriste astrolojik aylar kadar -Ay'ın doğumda işgal ettiği zodyakın derecesi ve dakikası üzerinden ardışık geçişleri- tamamlanan yaşam yılları kadar ileri sayın. . Gezegenlerin konumları, MC ve Asc. takip eden astrolojik ay boyunca, doğum gününü takip eden yaşam yılı için Küçük İlerlemeleri oluşturacaktır. MC, Güneş'in Küçük İlerleme ile ilerlediği aynı sayıda derece ilerler. Güneş doğumda olduğu gibi MC'den zodyak olarak her zaman aynı sayıda derece olduğundan, MC Güneş'in konumundan Küçük İlerleme ile kolayca bulunur; Güneş'in küçük konumundan MC'ye olan zodyak mesafesini ekleyerek veya ondan çıkararak

doğumda. İlerleyen Asc. bulunan MC kullanılarak doğum enlemi için evlerin bir tablosundan tespit edilebilir.

Gezegenlerin ilerlemesiyle oluşan açılar, MC ve Asc. Yaşamın her yılı için bir astrolojik ay oranında, kesinlikle Küçük-İlerleme konumları arasında algılanamaz etkiler üretir. Ancak, Küçük-İlerlemiş gezegenler ile gezegenlerin açıları ve doğum haritasının açıları veya büyük-ilerlemiş gezegenlerin ve açıların konumları arasında oluştuklarında, astral bedende yaşamın küçük koşullarını ve olaylarını çeken yapısal değişiklikler üretirler. .

geçişler

Geçişler, bir astrolojik yıl boyunca, insan hayatındaki bir astrolojik yıl boyunca astral bedende meydana gelen önemsiz yapısal değişikliklere neden olan enerjiyi serbest bırakan gezegenlerin hareketlerinin oranı ile ölçülür.

Bu, efemeriste gösterilen gezegenlerin günden güne konumlarının, o günlerde astral bedende küçük yapısal değişiklikler meydana getirdiği anlamına gelir.

KURAL: Gezegenlerin evlerden geçişlerine, özellikle daha yavaş hareket eden gezegenlerin köşeli evlerden geçişlerine dikkat edilmelidir. Geçiş yapan gezegenlerin özellikle doğum haritası veya büyük ilerleme gösteren gezegenlerle birleşim yönü ve daha sonra, daha yavaş hareket eden gezegenler tarafından bu şekilde yapılan karşıtlıklar gözlemlenmeye değerdir. Yalnızca doğum haritası konumlarına ve Ana İleri Düzey konumlara yapılan yönler

not edilmeli; Küçük İlerleme pozisyonlarına veya diğer Geçiş pozisyonlarına geçiş yönlerine dikkat edilmez.

Çok kapsamlı araştırma çalışmalarımızda, yıldız hücrelerine sağlanan enerjinin hacmi dışında, Büyük-İlerleyen yönler, Küçük-İlerleyen yönler ve Geçiş yönleri tarafından uygulanan etkilerde herhangi bir farklılık fark edemedik. olay ilgi gördü.

Birçok insanın geçiş yapan gezegenlerin yol açtığına inandığı olaylar, daha ağır geçici yıldız antenleri oluşturan büyük ilerlemeli yönlerle gerçekten çakışıyor. Bu tür koşullar altında, yalnızca Büyük İlerlemeye yardımcı olan ve böyle bir Büyük-İlerleme yönü olmadığında çalışmayan geçiş, genellikle olayı çekmek için tam sorumlulukla akredite edilir.

Olayları Tahmin Etme

Toplanan Kuvvetlerden etkilenmediği sürece, her gelişmiş yön, ilgili gezegenlerin ev yöneticileri tarafından belirtildiği gibi, kendi yaşam bölümleri açısından işleme eğilimindedir. Yani, gelişmiş yönler birbirini iptal etmez, ancak her biri kendi olay tipini çeker. Bununla birlikte, çok sık olarak, olayın talihi veya talihsizliği, görünümün uyumu veya uyumsuzluğu ile gösterilmez, ancak bir Toplayıcı Kuvvet olarak hareket eden o sırada baskın gelişmiş veçheden güçlü bir şekilde etkilenir.

Belirtilen ana olay, ilerlemiş yönün yaklaşık bir dahilinde olduğu süre boyunca beklenebilir.

mükemmel yönün derecesi. Aynı etki küresi, alt majör-ilerlemiş yönler (Ay'ın majör-ilerlemiş yönleri), minör-ilerlemiş yönler ve transit yönler için etkilidir. Bir olayın üç tür ilerlemeden herhangi birinin ilgisini çekmesi için, başka herhangi bir ilerleme türünün ona katkıda bulunması gerekli değildir. Ancak, büyük-ilerlemiş bir açının mükemmelden belirtilen mesafe içinde olduğu süre boyunca, büyük-ilerlemiş Ay veya küçük-ilerlemiş bir gezegen veya her ikisi veya birkaç küçük-ilerlemiş veçhe nedeniyle, birkaç kısa dönem meydana gelecektir. ana-gelişmiş açıda yer alan veya beklenen olayı yöneten evi etkileyen gezegenlerden biriyle açı, olay için çalışan düşünce hücrelerine olağandışı aksesuar enerji verilir.

Bir majör-gelişmiş yönün işaret ettiği olay, onun talihine veya talihsizliğine, düşünce hücrelerine yardımcı enerji veren alt majör yönün veya minör-ilerlenmiş yönün uyumu veya uyumsuzluğundan çok fazla etkilenmez. Ana-ilerlemiş yönler tarafından belirtilen daha geniş koşullar kalıbı içinde, her bir alt-ana yön, bir alt-büyük olay veya koşul açısından işlemeye meyillidir ve her önemli küçük-ilerlemiş yön, bir küçük açısından işlemeye eğilimlidir. olay veya koşul.

Astroloji, kaçınılmaz olan olayları öngörmez. Düşünceleri ve davranışları etkileyen ve çevre üzerinde fizik dışı güç uygulayan düşünce hücresi faaliyetlerini belirli olayları olası kılacak şekilde haritalandırır. Çaba, ortadan kaldırma yoluyla olmalıdır.

olası olayları ve bunlardan birinin veya birkaçının gerçekleşeceği dönemleri mümkün olduğunca az alternatife indirgemek. Bunu yapmanın iyi bir yolu şu şekildedir:

1. İlgili iki gezegenden birinin özelliklerini taşımayan tüm olayları ve etkilenen evlere ait olmayan tüm olayları ortadan kaldırın.

GÜNEŞ: Güneş'in herhangi bir gelişmiş yönü canlılığını, önemini ve otoritesini etkiler.

AY: Ay'ın herhangi bir gelişmiş yönü zihinsel tutumu, ev hayatını ve günlük işleri etkiler.

MERCURY: Merkür'ün herhangi bir ilerlemiş yönü, zihinsel ilgileri, ifadenin kolaylığını veya doğruluğunu etkiler ve beyin aktivitesini arttırır.

VENÜS: Venüs'ün herhangi bir gelişmiş yönü, duyguları, sosyal ilişkileri ve sanatsal beğeniyi etkiler.

MARS: Mars'ın herhangi bir gelişmiş yönü çekişme, acele ve artan enerji harcamasını beraberinde getirir.

JÜPİTER: Jüpiter'in herhangi bir gelişmiş yönü, bireyi bolluk, artan iyimserlik ve neşe ile etkiler.

SATURN: Satürn'ün ilerlemiş herhangi bir yönü iş, sorumluluk ve ekonomi veya kayıp getirir.

URANÜS: Uranüs'ün herhangi bir ilerlemiş yönü, ani bir şey aracılığıyla, bir insan aracılığıyla etki eder ve yaşama değişiklik getirir.

NEPTÜN: Neptün'ün herhangi bir gelişmiş yönü hayal gücünü arttırır, duyarlılığı arttırır ve şemaları çeker.

PLUTO: Plüton'un herhangi bir ilerlemiş yönü, gruplar aracılığıyla, süptil güç yoluyla etkiler ve zorlama veya işbirliği getirir.

2. Uygun doğum haritası gezegensel gücünün eksikliğinden veya uygun doğum haritası veçhelerinin eksikliğinden veya uygun doğum haritası ev faaliyetinin eksikliğinden dolayı olası olmayan tüm olayları ortadan kaldırın.

3. Bireyin eğitim ve öğretiminin ve düşünce hücrelerinin edindiği alışkanlık sistemlerinin olanaksız kıldığı tüm olayları ortadan kaldırın.

4. Toplanan Kuvvetlerden etkilendiği şekliyle kalıba uymayan olayları kalan olaylardan eleyin.

5. Bireyin yaşının ihtimal dışı kıldığı ve ilgili iki gezegene ait çevresel faktörlerin meydana getirmek için mevcut olmadığı, hala kalan birkaç olayı ortadan kaldırın.

Bu eleme sürecinden sonra bile, herhangi biri görünüşte gerçekleşebilecek birkaç alternatif olay olabilir. Ancak, en olası olayı tespit etmenin kaçınılmaz geleceği önceden haber vermek değil, gerçekte ne olduğunu etkileyebilmek olduğu bakış açısına göre, bu şekilde bulunan kalıntı oldukça tatmin edici olmalıdır; biri olmamalı çünkü

birkaç farklı olayı kolaylaştıran veya diğer birkaç farklı olayı saptıran adımlar atmak istememek, eğer bu çabayla olay gerçekten meydana geldiğinde çok daha şanslı hale getirilirse.

-

son notlar

1 Baskısı tükenmiş, bkz.*Astroloji: 30 Yıllık Araştırma*Doris Chase Doane tarafından.

2 a.g.e.

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 2

Güneş ve Açıların Büyük İlerlemeleri

Seri Ders Numarası 111

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

Doğum Enlemi için Yükselen Düzeltme

Evler tablosunda verilen doğuma en yakın enlem için ev doruk noktası ile doğuma en yakın enlem için ev doruk noktası arasındaki (a) °s ve 'ler cinsinden farkı bulun.

Tabloda verilen doğuma en yakın enlem ile en yakın enlem arasındaki °s ve 's cinsinden farkı (c) bulun. Dalton, AP, AA ve RC tablolarında bu her zaman 1°'dir (60')

(d) Tabloda verilen gerçek doğum enlemleri ile en yakın enlem arasındaki °s ve 's cinsinden farkı bulun.

Orantılı olarak, her terimi 's'ye indirgeyin, ardından (a) ile çarpın. (d) ve ürünü (c)'ye bölün. Bu (b) enlem düzeltmesini verir.

Logaritmalara göre, günlükten. (d) günlüğü çıkarın. (c) ve bu şekilde bulunan farka günlük ekleyin. (a). Sonuç günlüktür. (b), enlem düzeltmesi. Dalton'un, AP, AA ve RC tablolarının günlüklerini kullanmada. (c) her zaman 1.3802'dir.

Gerçek doğum enlemi tabloda verilen en yakın enlemden küçük olduğunda: Tablo enlemle azalan gösteriyorsa düzeltme eklenir. Tablo enlemle artan ' gösteriyorsa, düzeltme çıkarılır.

Gerçek doğum enlemi tabloda verilen en yakın enlemden büyük olduğunda: Tablo enlemle azalan gösteriyorsa düzeltme çıkarılır. Tablo enlemle artan ' gösteriyorsa, düzeltme eklenir



Branşlar: Doğum Haritası 1a
2 Ocak 1920, 17:32 EST. 74W. 40:43K.

24 Kasım 1949 için dış çemberdeki büyük ilerlemeler.

artan yarım kare Satürn*r*, 25 Haziran 1924

Güneş sesquisquare Satürn*r*, 15 Ocak 1935 MC

muhalefeti Mars*p*, 4 Ağustos 1940. Merkür

kavuşum Güneş*p*, 27 Kasım 1953. MC kavuşumu

Ay*r*, 18 Eylül 1973. Asc. altmışlık Mars*p*, 7

Temmuz 1977.



Branşlar: Doğum Haritası 316
17 Aralık 1920, 01:30 MST. 105W. 39 45N

24 Nisan 1934 için dış çemberdeki büyük ilerlemeler.

Güneş kare kare Neptün*r*, 5 Nisan 1924. Doç.

yarı-sekstil Jüpiter*r*, 19 Haziran 1925. MC

altmışlık Satürn*r*, 6 Ağustos 1928. Doç. Mars

üçgen*p*, 9 Ağustos 1929. Merkür kavuşumu

MC*p*, 2 Mart 1937. Merkür kavuşumu Güneş*p*,

23 Mayıs 1951.

Bölüm 2

Güneş ve Açıların Büyük İlerlemeleri

IT, Einstein'ın, atom enerjisini serbest bırakmanın ve kullanmanın keşfine yol açan pratik ve mantıksal sonuçlarına eşlik eden Özel Görelilik Teorisiydi. Ve bu aynı Özel Görelilik Teorisi, hem iç düzlem enerjilerinin nasıl çalıştığını hem de bunların bireyin yararına daha fazla çalışmasını sağlamak için neler yapılabileceğini gösteren pratik ve mantıksal sonuçlarını takip etti.

Üniversite bilim adamları, iç düzlemdeki zaman, mesafe ve yerçekiminin dünyadakinden kökten farklı özelliklere sahip olduğunu kesin olarak kanıtladığından, iç düzlem havasının, havanın yeryüzünde işlediği aynı yasalara göre işlemesini beklemeli miyiz? Einstein'ın Mantıksal sonuçlarına taşınan Özel Görelilik Kuramı, iç düzlem havasının bireyi yalnızca iç düzlem yapısına göre değil, astral bedeninde yapısal değişiklikler getiren belirli zaman-uzay ilişkileri yoluyla etkilediğini gösterir.

Astrolojik enerjiler, iç düzlem hava durumunu oluşturur. Ancak bu iç düzlem havasının bir bireyi nasıl etkilediği herhangi bir teoriye bağlı değildir; zaman olarak bile,

Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

iç düzlemin uzaklık ve yerçekimi özellikleri üniversite bilim adamları tarafından deneysel olarak belirlendi, dolayısıyla iç düzlem havasının özellikleri ve bireyleri, grupları, şehirleri, ulusları ve dünya olaylarını nasıl etkilediği deneysel olarak ve istatistiksel çalışmalarla belirlendi. astrolojik araştırma sürecinde gerçekleştirilir.

İç düzlem havasının göze çarpan etkilerinden biri, bir kişi, yaratık veya önemli bir olay doğduğunda, iç düzlemdeki havanın daha sonra doğan şeyin iç düzlem yapısıyla örtüşme eğiliminde olduğu bir zamanda doğmasıdır. . Bu nedenle, doğum haritasında gösterildiği gibi, doğum anındaki iç düzlem hava durumu, bir bireyin belirli tipte yetenekler geliştirme eğilimini gösterir. Her ne olursa olsun, böyle bir yatkınlık yayına işaret eden gezegen konumları ve açıları, Doğum Haritası Sabitleri olarak adlandırılır. 30 farklı mesleğin istatistiksel olarak belirlenmiş Doğum-Tablo Sabitleri referans kitabında belirtilmiştir.*Meslek Nasıl Seçilir*[1].

Doğumda iç düzlemdeki hava koşulları tarafından belirtilen yatkınlıklar, uygun düşünce hücrelerinin, ilerlemiş yönler tarafından haritalanan iç düzlem hava koşullarından orantılı ek enerji aldığı dönemler dışında, hiçbir zaman olay veya hastalık olarak tezahür etmez.

İç düzlem hava durumu, sonsuz çeşitlilikteki kombinasyonlarında astrolojik titreşimlerden oluşur. Gelişmiş açılarla haritalananlar, gezegensel titreşimlerin belirli düşünce hücresi gruplarına ulaşmasını ve aktif hale getirmesini sağlar. Bu düşünce hücrelerinin, oluştuklarında kendilerine verilen ve gezegenlerin doğum haritasında onları haritalayan yönleriyle belirtildiği gibi arzuları vardır. Bu tür arzular

ilerlemiş bir yön tarafından haritalanan iç düzlem hava durumu yoluyla onlara ulaşan gezegen enerjisi tarafından geçici olarak değiştirilir. Ve böylece düşünce hücrelerine ulaşan ek enerji, onlara sadece bireyin düşünce ve davranışlarını etkileme gücü vermekle kalmaz, aynı zamanda onlara arzu ettikleri türden olayları hayatına çekmelerini sağlayan psikokinetik aktivite de verir.

Şimdiye kadarki en önemli iç düzlem hava durumu, büyük ilerlemeli yönlerle haritalanmıştır. Binlerce insanın hayatını kapsayan Işık Kilisesi istatistiksel araştırması, yaşamın her önemli olayının, olayın doğasına özgü gezegenleri içeren ve doğum haritasını yöneten büyük-ilerlemiş bir yönün mevcut olduğu dönem boyunca gerçekleştiğini gösterir. etkilenen yaşam bölümünü yöneten ev. Eğer hayatın birden fazla bölümü olaydan belirgin bir şekilde etkileniyorsa, meydana geldiği anda, yaşamın bu çeşitli bölümlerini yöneten her evin yöneticisini içeren her zaman büyük ilerlemeli yönler vardır.

Bireyin yatkın olduğu belirli bir olayı, durumu veya hastalığı deneyimleme olasılığının bulunduğu hayatındaki dönemler, belirli büyük ilerlemeli yönlerle belirtilir. Verilen olay, durum veya hastalık ile her zaman örtüştüğü bulunan, düzlem içi hava koşullarını haritalayan bu gelişmiş yönlere, İlerlemiş Sabitler denir. 20 farklı olayın istatistiksel olarak belirlenmiş İlerleme Sabitleri referans kitabında belirtilmiştir.*Ne Zaman ve Hangi Olaylar Olacak?*[2], ve hem Doğum Haritası Sabitleri hem de

160 farklı hastalığın İlerlemiş Sabitleri Kurs XVI'da belirtilmiştir,*yıldız şifa*,

Bir gezegenin hem doğum haritası konumu hem de ilerlemiş konumu, gezegensel enerjinin alınması için terminaller olarak hareket eder. Gerçekte ilerlemiş görünümde yer alan her terminal, tam hacimde ilerlemiş görünümün enerjisini alır. Fakat ilerlemiş açı, büyük-gelişmiş bir gezegenden doğum haritası yerine kadar değilse - ki bu durumda sadece iki terminal vardır - her ilerlemiş veçhenin, ilerlemiş veçhe ile doğrudan ilgili olmayan iki başka terminali vardır. İlerlemiş açıyla doğrudan ilgili olmayan bu iki terminalin her biri, rezonans ilkesi aracılığıyla, doğrudan dahil olan her bir terminal tarafından alınanın yarısı kadar enerji alır.

Genel olarak bir majör-ilerlemiş yönün dört terminali olduğunu anlamak önemlidir, çünkü araştırmamız, bir olayın veya hastalığın her bir Majör-İlerlemiş Sabitinin, her zaman, Ay'dan dördünden birine göre daha ağır olan küçük-ilerlemiş bir veçhe ile güçlendirildiğini belirlemiştir. olayın meydana geldiği veya hastalığın geliştiği andaki terminaller; ve bir olayın veya hastalığın her bir güçlendirilmiş Ana-İlerleme Sabiti, olayın meydana geldiği veya hastalığın geliştiği anda Ay'dan dört terminalinden birine olandan daha ağır bir geçiş yönü tarafından her zaman salınır. Ve bağımsız bir minör-ilerlemiş veçhe, her zaman olayın meydana geldiği zaman minör-ilerlemiş veçheden etkilenen doğum haritasına veya majör-ilerlemiş terminallerden birine bir transit veçhe ile serbest bırakılır.

Pluto'nun bir efemerisinin, yönlerinin dahil edilmesine izin vermek için mevcut olmasından önce,

Güneş veya Mars'ın gelişmiş yönlerinden etkilenen olaylar ara sıra, görünüm mükemmelden bir buçuk derece kadar iken meydana geldi. Ancak, Ocak 1948'de yayınlanan L. Astrological Report No. 61'in C.'sinde istatistiksel olarak belirtildiği gibi, *Yükselen Yıldız*[3], bu durumlarda bazen zodyak yönü bir derece sınırının oldukça üzerindeyken, aynı zamanda önemli gezegeni içeren ve bir derece sınırını aşmayan ilerlemiş bir paralel görünüm vardı.

Gezegenler mükemmel ilerlemiş açıya ne kadar yakından yaklaşırlarsa, astral bedendeki geçici yıldız anteninin alma, radyo modası ve doğrudan ve dolaylı terminallerindeki düşünce hücrelerine iletme yeteneğine sahip olduğu enerji miktarı o kadar fazla ve daha yeteneklidir. bunlar etkileyen olaylar haline gelir.

Küçük-ilerlemiş yönlerin ana-ilerlemiş yönün dört terminalinden herhangi birine güçlendirme etkisinden dolayı, transit yönlerinin ana-ilerlemiş yönün dört terminalinden herhangi birine tetikleyici etkisine ve içinden geçtiği fiziksel çevreye. olaylar gelmelidir, büyük ilerlemeli yönlerin çektiği önemli olaylar nadiren tam olarak ilerlemiş yönün mükemmel olduğu tarihte gelir. Ancak diğer şeyler eşit olduğunda, ana-ilerlemiş yönün mükemmel olduğu tarihe yaklaşmaya, görünümün daha uzak olduğu zamana göre daha yatkındırlar. Bu nedenle, hayatın içine çekilecek önemli olayların zamanı ve niteliği -ihtiyati tedbirlerle önlenmedikçe- önceden tahmin edilebilmesi için, her büyük ilerleme yönünün mükemmel hale geldiği zamanın bilinmesi önemlidir.

Büyük ilerlemeler, bir astrolojik yaşam yılı boyunca astral bedende meydana gelen başlıca yapısal değişikliklere neden olan enerjiyi serbest bırakan bir görünür güneş günü sırasında gezegenlerin hareketlerinin oranı ile ölçüldüğünden, gezegenlerin hareketleri ve konumları her dört doğumdan sonraki dakikalar, doğumdan sonraki her gün astral bedende meydana gelen yapısal değişiklikleri gösterir; doğumdan sonraki her iki saatte bir gezegenlerin hareketleri ve konumları, doğumdan sonraki yaşamın her bir ayı boyunca bu şekilde gösterilen yapısal değişiklikleri yayar; ve doğumdan sonraki her gün gezegenlerin hareketleri ve konumları, yaşamın karşılık gelen yılı ve zamanı boyunca çekilen yapısal değişiklikleri ve olayları gösterir.

Efemeris'te verilen öğlen konumları (veya bir gece yarısı efemeris kullanılıyorsa gece yarısı konumları), doğumdan önce veya sonra, takvim zamanının bazı yıl, ay ve günü için ana-ilerlemiş konumlarını temsil etmelidir. Ve ortalama olarak, gezegenlerin doğum gününde ilerlemiş konumları, gezegenlerin yılın herhangi bir günü için ilerlemiş konumlarından daha yakın veya mükemmel ilerlemiş açılar yapmaktan daha uzak olmadığı için, takvim tarihi, gezegenin efemeris konumlarına karşılık gelir. Doğum gününde gezegenler, takvim tarihini hesaplamak için en uygun başlangıç noktasıdır - herhangi bir büyük ilerleme yönü mükemmeldir. Oluşturucusu takvim tarihini aradı ve böylece SINIRLANDIRICI TARİH'i buldu.

Sınırlama Tarihini Bulma

Sınırlama Tarihi (kısaltılmış LD), büyük ilerlemeye karşılık gelen takvim zamanındaki tarihtir.

efemeris'te gösterildiği gibi doğum gününde gezegenlerin konumları. Saatleri 2'ye bölerek ve sonuç aylarını çağırarak ve dakikaları 4'e bölerek ve sonuç günlerini çağırarak EGMT Doğum Aralığını takvim zamanının aylarına ve günlerine dönüştürün.

EGMT Doğum Aralığı eksi ise, bu şekilde bulunan takvim aralığını doğum yılı ve ayına ekleyin. EGMT Doğum Aralığı artı ise, bu şekilde bulunan takvim aralığını doğum yılı, ayı ve gününden çıkarın. Bu şekilde bulunan LD, tüm önemli gelişmelerin ve konumların hesaplandığı takvim başlangıç noktasıdır. Gezegenlerin doğum haritası konumları bir EGMT Aralığı için hesaplandığından, LD'yi bulmak için en uygun zaman haritanın dikildiği zamandır. Ancak, gezegenlerin, yerlerin bulunmasında doğumdan önceki veya sonraki bir EGMT Aralığı kullanılacaksa, bu LD'nin bulunmasında kullanılmamalıdır. Bunun yerine, doğum günündeki EGMT Aralığı tespit edilmelidir;*LD için her zaman doğum günündeki EGMT Aralığından hesaplanmalıdır.*B. of L. öğrenci boşluklarında LD'nin yazılacağı bir boşluk belirlenir. Doğum yılı, doğumdan önceki yıl veya doğumu takip eden yıl olabilir. Bunu yazarken, yalnızca ayın ve ayın gününü değil, aynı zamanda düştüğü yılı da eklediğinizden emin olun.

Örnek 1: Grafik la, 2 Ocak 1920, EGMT Aralığı artı 10h 32m Sınırlama Tarihi nedir?

10 bölü 2 ay olarak 5 verir. 32 bölü 4 gün olarak 8 verir. Aralık artı olduğu için, 5 ay, 8 gün 2 Ocak 1920'den çıkarılmalıdır. Bu, 24 Temmuz 1919'u LD olarak verir. Bu, gezegenlerin yerlerinin olduğu anlamına gelir.

3 Ocak 1920 (doğumdan bir gün sonra) için efemerlerde verilenler, 24 Temmuz 1920 için ana ilerleme konumlarıdır. Harita. D. 1920 takvim yılı için 3 Ocak 1920'dir.

Örnek 2: 17 Aralık 1920 tarihli Grafik 316, eksi 3h 30m'lik bir EGMT Aralığına sahiptir. Sınırlama Tarihi nedir?

3'ün 2'ye bölünmesi 1 ay verir ve geriye kalan 60 dakikadır. 60m artı 30m 90m verir. 90 bölü 4 gün olarak 22½ verir. Aralık eksi olduğundan, bu 1 ay, 22½ gün 17 Aralık 1920'ye eklenmelidir. Bu, 9 Şubat 1921'i LD olarak verir Bu, gezegenlerin doğum günü, 17 Aralık'taki konumlarının olduğu anlamına gelir. , 1920, 9 Şubat 1921 için ana ilerleme konumlarıdır; ve 18 Aralık 1920 için efemeriste gösterilen konumları, 9 Şubat 1922 için büyük ilerleme konumlarıdır. Benzer şekilde, 28 Aralık 1920 için efemeristeki gezegenlerin konumları, onların ana- 9 Şubat 1932 için pozisyonlar ilerledi. Bu da Harita anlamına geliyor. 1932 için D. 28 Aralık 1920'dir.

Örnek 3: Henry Ford Bölüm 5, (Seri Ders 107), Kurs XI'in doğum haritası,*Burç Tanımlamak*EGMT Aralığı artı 7h 56m'ye sahiptir. Sınırlama Tarihi nedir?

7 bölü 2, 3'ü ay olarak verir, kalan 60m'dir. Bunlar 56m'ye eklendiğinde 116m 116 bölü 4 gün olarak 29 verir. Aralık artı olduğu için, bu 3aylık 29d, doğum tarihi olan 30 Temmuz 1863'ten çıkarılmalıdır. Bu, 1 Nisan 1863'ü verir, çünkü LD 31 Temmuz 1863, büyük ilerleme konumlarını temsil eder ve Map.D'dir. 1 Nisan 1864 için; ve 1 Ağustos 1863, temsil eder

1 Nisan 1865 için büyük ilerlemeli pozisyonlar. ve bu nedenle Map.D. 1865 için.

Büyük İlerleme Tarihini Bulma

Hem LD hem de Büyük İlerleme Tarihi, her zaman efemeristeki doğum tarihinden itibaren hesaplanmalıdır. Efemeriste doğumdan önceki veya sonraki günün kullanılması, büyük ilerlemelerin hesaplanmasında en yaygın hata kaynağıdır. Büyük İlerleme Tarihi (kısaltılmış Map.D.), Sınırlama Tarihinin ayı ve günü için, ancak bazı takvim yılı için gezegenlerin büyük-ilerlemiş konumlarını gösteren efemeris günüdür. Map.D'yi bulmak için. herhangi bir takvim yılı için, doğum gününden itibaren, Sınırlama Tarihinden bu yana geçen tam yıllar kadar gün sayın. Bu şekilde bulunan efemeris günü, gerekli Map.D'dir. Örnek 1, 2 ve 3 işlemi göstermektedir.

Midheaven Sabitini Bulma

Bölüm 1'de (Seri Ders 19) açıklandığı gibi, MC ilerler —büyük ilerleme, küçük ilerleme ve transit ilerleme yoluyla- tam olarak aynı sayıda burç, ° ve ' Güneş'in aynı süre boyunca zodyak boyunca ilerlediği kadardır. zaman. MC ve Asc tarafından yapılan ilerleme yönleri olarak. Son derece önemlidir -Güneş tarafından yapılanların yanında önem taşırlar- Midheaven Sabitini bularak her bir haritada bir dizi hesaplama işini azaltmanız tavsiye edilir.

Midheaven Sabiti (kısaltılmış MCC), doğum haritasında MC ile Güneş arasındaki mesafedir.

işaretlerde, °s ve ' artı veya eksi olarak ifade edilir, böylece ° işaretine eklendiğinde ve 'MC tarafından işgal edildiğinde cebirsel toplam, Güneş tarafından işgal edilir, ° ve ' işaretini verir. Sadece doğum haritası MC veya Güneş tarafından işgal edilen daha küçük zodyak boylamı, doğum haritası MC veya Güneş tarafından işgal edilen daha büyük zodyak boylamından çıkarılarak ve işaretlerin önüne, °s ve 'ler yerleştirilerek bulunur ve böylece uygun artı bulunur. veya eksi işareti.

Daha sonra, MC ilerleme yoluyla nerede olursa olsun - majör, minör veya transit - cebirsel olarak ° ve MM'yi işgal eder ve sonuç, ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen işaret, ° ve' olur. Ve ilerlemiş Güneş nerede olursa olsun, MCC'den önceki işareti değiştirin ve onu cebirsel olarak, ° ve ' ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen işaretine ekleyin ve sonuç, ilerlemiş MC tarafından işgal edilen işaret, ° ve ' olur.

Örnek 4: Çizelge la'da Güneş 11 Oğlak 16'dır ve MC, 5 Koç 45'tir. 10S 11° 16' değerinden 1S 5° 45' çıkarın ve 9S 5° 31' verir. Güneş'in konumunu bulmak için, bulunan fark MC'ye eklenmelidir, MCC artı 9S 5° 31'.

Örnek 5: Harita 316'da Güneş 25 Yay 08 ve MC 16 Yengeç 45'tir. 9S 25° 08' den 4S 16° 45' çıkarın ve 5S 8° 23' verir. Güneş'in konumunu bulmak için, bulunan fark MC'ye eklenmelidir, MCC artı 5S 8° 23'.

Örnek 7: Henry Ford şemasında Bölüm 5 (Seri Ders 107), Kurs XI, *Burç Tanımlamak* Güneş 7 Aslan 06 ve MC 12 Başak 00. 6S'den 12° 00'

5S 7° 06' çıkarın ve 1S 4° 54' verir. Güneş'in konumunu bulmak için, bulunan fark MC'den çıkarılmalıdır, MCC eksi 1S 4° 54'.

İlerleme Sorunları

Harita kurma, büyük ilerlemeler, küçük ilerlemeler ve transit ilerlemelerle ilgili hesaplamalar, temel olarak, dilbilgisi okulunda öğretildiği gibi, doğrudan orantılı problemlerin çözümüdür. Her problemde (a) : (b) :: (c) : (d).

Bu şekilde problemleri orantısal olarak çözerken, araçların çarpımı uçların çarpımına eşit olduğundan, iki iç terim verildiğinde, biri diğeriyle çarpın ve ürünü dış terime bölün. İki dış terim verildiğinde, birini diğeriyle çarpın ve ürünü iç terime bölün. Sonuç cevaptır.

Orantısal olarak bu problemlerden herhangi biri dört farklı şekilde çözülebilir. Doğru orantı ile çözülebilir, logaritma ile çözülebilir, sürgülü hesap cetveli ile çözülebilir veya Işık Kilisesi Hesap Makinesi ile çözülebilirler.

Saat ve dakika ile °s ve 'leri içeren matematiksel orantıları ele alırken, logaritmaların kullanımı emeği büyük ölçüde azaltır. Bu kitapta ele alınan orantıdaki her problem ya doğrudan orantı ya da logaritma ile çalışılabilir. Her iki yöntemde de oranın her bir terimini belirtmek için kullanılan harf aşağıdaki gibidir:

(a) efemeris günlük kazancıdır veya sabit bir zaman veya mekan aralığındaki kazançtır.

Yalnızca bir gezegen veya konum hareket ettiğinde, bir gezegen doğum haritası konumuyla açı yapmak için hareket ettiğinde olduğu gibi, efemeris günlük kazancı (a) gezegenin günlük hareketidir. Her iki gezegen veya konum doğrudan hareket halindeyken veya her iki gezegen veya konum geri hareket halindeyken, daha yavaş hareket eden gezegenin efemeris günlük hareketini daha hızlı hareket eden gezegenin efemeris günlük hareketinden çıkarın. Sonuç (a) efemeris günlük kazancıdır. Bir gezegen veya konum doğrudan hareket halindeyken diğeri geri hareket halindeyken, iki günlük hareketi ekleyin. Toplamları (a) efemeris günlük kazancıdır.

(b) belirli bir zaman veya mekan aralığındaki kazançtır.

(c) sabit zaman veya uzay aralığıdır.

(d) seçilmiş bir zaman veya uzay aralığıdır.

İlerleme halindeki sorunları çözmek için doğrudan orantı kullanıldığında, takvim zamanı ile hemen çalışmak daha uygundur. Ancak logaritma kullanırken, problemi önce ilerleme süresi (EGMT Aralığı) açısından çalışmak ve sonra bulunan sonucu takvim zamanına dönüştürmek daha uygundur. Çoğu efemeridin arkasında bulunan gibi günlük orantısal logaritmalar, her zaman 1440 dakika (24 saat) olan orantı (c) cinsinden bu tür sorunları çözmek için oluşturulmuştur ve tablo tarafından halledilir.

Belirli bir EGMT Aralığı sırasında kaç tane °s ve bir gezegenin hareket ettiğini bulmak için neredeyse evrensel olarak doğum haritalarının oluşturulmasında kullanılan bu tür logaritmaların avantajı, (b) teriminin logaritmasının yalnızca eklenerek elde edilebilmesidir.

(a) ve (d) terimlerinin logaritmaları; ve (d) teriminin logaritması, sadece (a) teriminin logaritmasını (b) teriminin logaritmasından çıkararak elde edilebilir.

Bir gezegenin doğum haritasındaki konumunu belirtmek için harfi kullanmak bir gelenek haline geldi.*r*gezegenden sonra, büyük gelişmiş bir gezegeni belirtmek için harfi kullanmak*p* gezegenden sonra, küçük ilerlemiş bir gezegeni belirtmek için harfi kullanmak*m*gezegenden sonra ve harfi kullanmak için transit ilerlemiş bir gezegen belirlemek için*t*gezegenden sonra.

Gezegenlerin Ana-İlerlemiş Konumlarını Bulmak

Belirli bir Takvim Tarihi

Verilen tarihin LD'nin en yakın ay ve gününden olduğu ay ve gün cinsinden artı veya eksi takvim aralığını bulun Ardından Haritayı bulun. D. verilen takvim tarihinin bu ay ve gün sayısı kadar uzakta olduğu LD için efemeriste. Takvim aralığını o takvim yılındaki LD'den EGMT Aralığına (ana ilerleme süresi) her ayın 2 saate ve her gün 4 dakikaya eşit olacak şekilde dönüştürün. Takvim aralığı artı ise, bu şekilde bulunan EGMT Aralığı artıdır; takvim aralığı eksi ise, bu şekilde bulunan EGMT Aralığı eksidir. Haritada bu EGMT Aralığını kullanın. D. sanki o efemeris gününde bu EGMT Aralığı için gezegenlerin doğum haritası konumlarını buluyormuş gibi efemerlerde.

Örnek 8: Harita la için 24 Kasım 1949'da gezegenlerin büyük ilerleme konumlarını bulun. Örnek I'de LD'nin 24 Temmuz 1919 olduğu bulunur. 11mo 24d'den 7mo 24d'yi çıkarmak, 4mo'luk bir artı takvim aralığı verir. çarpma

4'e 2 artı 8h EGMT Aralığı verir. 1919'u (LD) 1949'dan çıkarmak 30 verir. 2 Ocak 1920'ye (doğum tarihi) 30 gün eklemek Harita olarak 1 Şubat'ı verir. D. 1 Şubat 1920'deki gezegen konumlarını kullanmak ve artı 8 saatlik EGMT Aralığı için konumlarını hesaplamak, sayfa 35'te gösterildiği gibi, 24 Kasım 1949'daki ana-ilerlemiş konumlarını verir.

Örnek 9: Harita 316 için 24 Nisan 1934'te gezegenlerin ana ilerleme konumlarını bulun. Örnek 2'de LD'nin 9 Şubat 1921 olduğu bulundu. 4mo 24d'den 2mo 9d'yi çıkarmak, artı 2mo 15d takvim aralığını verir. . 2'yi 2 ile çarpmak 4 saat verir. 15'i 4 ile çarpmak 60m veya 1h verir. Böylece bir artı 5h EGMT Aralığı vardır. 1921'i (LD) 1934'ten çıkarmak 13'ü verir. 17 Aralık 1920'ye (doğum tarihi) 13 gün eklemek Harita olarak 30 Aralık 1920'yi verir. D. 30 Aralık 1920'deki gezegen konumlarını kullanmak ve artı 5 saatlik EGMT Aralığı için konumlarını hesaplamak, 36. sayfada gösterildiği gibi, 24 Nisan 1934'teki ana-ilerlemiş konumlarını verir.

Binbaşı, Küçük veya Transit Aşamalı MC'yi Bulmak Verilen Tarih

Önce, verilen takvim tarihinde ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen işareti, ° ve ' bulun. MCC'den önceki işareti değiştirin ve MCC'yi, ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen, ° ve ' işaretine cebirsel olarak ekleyin. Sonuç, kesin olarak ilerlemiş MC'dir.

Örnek 10: 24 Kasım 1949'da çizelge la için majör-ilerlemiş MC'yi bulun. Örnek 4'te bu çizelge için MCC artı 9S 5° 31' olarak gösterilmiştir. Güneş'te büyük ilerleme kaydetti

24 Kasım 1949, 11 Kova 41'dir. 11S 11° 41' değerinden 9S 5° 31' çıkarmak, 2S 6° 10' verir. Böylece ilerlemiş MC 6 Boğa 10'dur.

Örnek 11: 24 Nisan 1934'te çizelge 316 için majör-ilerlemiş MC'yi bulun. Örnek 5'te bu çizelgenin MCC'si artı 5S 8° 23' olarak gösterilmiştir. 24 Nisan 1934'te büyük ilerleme gösteren Güneş, 8 Oğlak 44'tür. 10S 8° 44' değerinden 5S 8° 23' çıkarmak, 5S 0° 21' verir. Böylece ilerlemiş MC, 0 Aslan 21'dir.

Majör, Minör veya Transit Aşamalı Artış Bulma. üzerinde Verilen Tarih

Evlerin bir tablosunda, içinde ilerlemiş MC'nin meydana geldiği iki sütun arasına bakın ve (a) en yakın ve en yakın Asc arasındaki °s ve 'leri bulun. doğuma en yakın enlem için verilmiştir.

(c) en yakın ve en yakın arasındaki °s ve 'leri bulun Tabloda verilen MC. Dalton, AP, Raphael ve RC tablolarında bu her zaman 1°'dir (60').

Tabloda verilen gerçek MC ve MC arasındaki °s ve 'leri (d) bulun.

Orantılı olarak her terimi 's'ye indirgeyin, ardından (a) ile çarpın (d) ve ürünü (c) ile bölün. Bu (b), Asc mesafesini verir. en yakın Asc'dandır. tabloda verilen en yakın enlem için tabloda verilmiştir.

Logaritma ile, log için. (a) günlük ekleyin. (d) ve bu şekilde bulunan toplamdan günlüğü çıkarın. (c). Sonuç günlüktür. (b), Asc mesafesi. en yakın Asc'dandır. tabloda verilen en yakın enlem için tabloda verilmiştir.

Gerçek MC, tabloda verilen MC'den küçükse, (b)'yi en yakın Asc'den çıkarın. masada. Gerçek MC, tabloda verilen MC'den büyükse, (b)'yi en yakın Artan'a ekleyin. masada.

Bu Asc verir. tabloda verilen enlem için. Doğum enlemi tam olarak tabloda verilenle aynı değilse,*Latitude için düzeltme*34. sayfada verilmiştir.

Örnek 12: Büyük ilerlemeli Asc'yi bulun. grafik la için 24 Kasım 1949. Örnek 10'da bu tarih için majör ilerlemeli MC'nin 6 Boğa 10 olduğu gösterilmiştir. AP ve Raphael'in tabloları Asc'yi verir. 6 Boğa için 15 Aslan 39 ve Yükselen olarak. 7 Boğa için 16 Aslan 24. Fark (a) böylece 45'. 6 Boğa 10', 6 Boğa'dan 10' fazla olduğundan, (d) 10'. (c) 60'. Orantısal olarak, 45'i 10'la çarpmak 450'yi verir. 450'nin 60'a bölünmesi 7½' verir. Logaritma ile, log toplamı. (a) 1.5051 ve günlük. (d) 2.1584, 3.6635'tir. Günlük çıkarma. (c) 3.6635'ten 1.3802, günlük olan 2.2833'ü verir. (b) 7½'. Asc'a. 15 Aslan 39 olan 6 Boğa için, 8' ekliyoruz (½'yi 1 olarak kabul ederek), bu tablo kesin doğum enlemi için olduğu gibi, ilerlemiş Yükselen'i verir. 15 Aslan 47' olarak.

Örnek 13: Büyük ilerlemeli Asc'yi bulun. 24 Nisan 1934'teki çizelge 316 için. Örnek 11'de bu tarih için majör-ilerlemiş MC 0 Aslan 21 olarak gösterilmektedir. Dalton'un tablosu Asc'ı verir. 0 Aslan için 40 enleminde 25 Terazi 38 ve Yükselen. 1 Aslan için 26 Terazi 27. Fark (a) 49'. 0 Aslan 21, 0 Aslandan 21' fazla olduğundan, (d) 21'dir. (c) 60'. Orantısal olarak, 49 ile 21 çarpıldığında 1029 elde edilir. 1029'un 60'a bölünmesi 17 verir. Logaritmalarla, log toplamı. (a) 1.4682 ve log. (d) 1.8361, 3.3043'tür. Günlük çıkarma. (c) 3.3043'ten 1.3802 log verir.

1.9241, günlük olan. (b) 17'. Asc'a. 25 Terazi 38 olan 0 Aslan için, ilerlemiş Yükselen'i veren 17' ekliyoruz. 25 Terazi 55 olarak tabloda verilen enlem için.

Ancak gerçek doğum enlemi 39° 45' olduğu için (d) 15' enlem farkı için yapılacak bir düzeltme vardır. 0 Aslan sütununun altında tablo, enlem 39 için 25 Terazi 52 ve enlem 40 için 25 Terazi 38, (a) 14' fark verir. (c) 60'. Sayfada verilen talimatları izleyerek 34, orantısal olarak, (a) 14'ü (d) 15 ile çarpmak 210'u verir. 210'u 60'a bölmek (b) 3½' verir. Logaritmalarla, log çıkarma. (c) günlükten 1.3802. (d) 1.9823, .6021'i verir. Günlük ekleme. (a) 2.0122 ila .6021, günlük olan 2.6143'ü verir. (b) 3½'.

Gerçek enlem tabloda verilen en yakın enlemden daha küçük olduğundan ve enlemle 'ler azaldıkça, 3½' düzeltmesini 25 Terazi 55'e ekleriz, bu (½'yi 1 olarak kabul edersek) ilerlemiş Artan'ı verir. 25 Terazi 59 olarak.

Bir Büyük İlerleyen Takvim Tarihini Bulma

Gezegenler Arası Görünüm Mükemmel

Haritayı Bulun. D. Efemeris zamanına en yakın efemeriste açı mükemmeldir.

(a) Haritada gösterildiği gibi, bir gezegenin diğer gezegenin °s ve ' cinsinden günlük kazancını bulun. D. efemeris içinde.

(b) °s ve 'nin görünüşünün mükemmelden olduğunu bulun.

İstihdamda (c) oranı 12 ay veya 365 gündür. Logaritma kullanırken (c) 24h EGMT Aralığıdır.

(d) oranını kullanırken, takvim yılında LD'den takvim zamanının ayları ve günleridir, gezegenlerin boşluğu (b) kapatması ve mükemmel yönü oluşturması gerekir.

Logaritma kullanırken (d), Harita.D'deki EGMT Aralığının saat ve dakika sayısıdır. (b) boşluğunu kapatmak ve mükemmel açıyı yapmak için gezegenlere ihtiyaç vardır. Bu EGMT Aralığı daha sonra her 2 saatin 1 aya ve her 4 dakikanın 1 güne eşit olduğu oranda eşdeğer artı veya eksi takvim aralığına dönüştürülmelidir. Her iki yöntemde de görünüş, efemeriste verilen konumlardan önce oluşturulmuşsa, bu şekilde bulunan takvim aralığını takvim yılında LD'den çıkarın. Görünüm, efemeriste verilen konumlardan sonra oluşuyorsa, bu şekilde bulunan takvim aralığını takvim yılında LD'ye ekleyin. Bu, takvim tarihine görünümün mükemmel olduğunu verir.

Orantılı olarak, (d)'yi bulmak için (b)'yi (c) ile çarp ve böl (a).

Logaritma ile, (d)'yi bulmak için logu çıkarın. (a) günlükten.(b).

Örnek 14: Harita la için LD değeri 24 Temmuz 1919 olarak bulundu. Güneş hangi tarihte Uranüs ile kavuşuyor?*r*büyük ilerleme ile?

Uranüs*r*29 Kova 03. 1920 efemerisine dönersek, 19 Şubat 1920'de, 29 Kova 34'te Güneş'i buluruz ve böylece (b) 31' mükemmel yönü geçmiş olur. 18 Şubat ile 19 Şubat 1920 arasında, Güneş (a) 61' hareket ediyor.

Orantılı olarak, (b) 31'i (c) 12 ile çarpmak 372 verir. 372'yi (a) 61'e bölmek (d) takvim aralığını 6 6/61 ay veya 6ay 3d olarak verir.

Logaritmalarla, logu çıkarın. (a) 61', kütükten 1.3730. (b) 31', 1.6670 ve log veriyor. günlük olan .2940. (d) 12h 12m. 12'yi 2'ye bölmek 6mo verir. 12'yi 4'e bölmek 3 gün verir.

2 Ocak 1920'deki doğum gününden itibaren efemerlerde ileriyi sayarsak, 19 Şubat'ın 48 gün sonra olduğunu buluruz. LD'ye 48 yıl eklendiğinde, 24 Temmuz 1919, Harita için takvim yılı olarak 1967'yi verir. D. 19 Şubat 1920. Görünüm, 19 Şubat 1920'de efemeriste verilen konumlardan önce oluşturulduğundan, Temmuz'dan 6mo 3d takvim aralığını çıkarıyoruz.
24, 1967. Bu, Güneş kavuşumu Uranüs'ün ilerlemiş tarihini verir.*r*21 Ocak 1967 olarak.

Güneşi İlerlemek

Diğer gezegenlerin önemli derecede gelişmiş yönlerinin tarihlerini bulma örnekleri Bölüm 3 ve 4'te (Seri Dersler 112 ve 113) bulunacaktır. Kesinlik için, Güneş'i içeren her bir ilerleme durumunun mükemmel olduğu takvim tarihi, yukarıda belirtilen şekilde belirlenmelidir. Ancak Güneş'in günlük hareketi yalnızca 57' ila 61' arasında değiştiğinden, aylık yaklaşık büyük ilerlemesi bunun 1/12'si veya yaklaşık 5'; ve 1' ilerleme bu nedenle yaklaşık 6 günlük takvim zamanına eşittir. Bu nedenle, hassasiyete gerek olmadığında, Güneş'in gelişmiş yönlerini orantılı olarak çalışmak daha uygundur.

Örnek 6: Büyük ilerleme gösteren Güneş'in çizelgede Venüs ile yarım kare yaptığı tarihi bulun*r*. Venüs 28 Akrep 18'dir. Bu nedenle Güneş'in yarım kare yapmak için 13 Oğlak 18'e ulaşması gerekir. Örnek 1'de, bu haritanın LD'sini 24 Temmuz 1919 olarak bulduk. 4 Ocak 1920'de efemeris Güneş 12 Oğlak 51'i gösteriyor. Bu nedenle açıyı yapmak için 27' hareket etmesi gerekiyor. 27'yi 5'e bölmek (ayda Güneş seyahati) 5mo verir. Kalan 2'yi 6 (Güneş'in 1' içinde seyahat ettiği günler) ile çarpmak bize 12d verir.

2 Ocak 1920'nin doğum gününden itibaren efemerlerde ileriyi sayarsak, 4 Ocak'ı 2 gün sonra buluruz. LD'ye 2 yıl eklendiğinde 24 Temmuz 1919, Harita için takvim yılı olarak 1921'i verir. D. Görünüm, efemeriste verilen konumlardan sonra oluştuğu için, 5mo 12d'yi 24 Temmuz 1921'e ekleriz ve bu, Güneş'in yarı karesi Venüs'ün tarihini verir.*r*6 Ocak 1922 olarak.

Haritada Güneş'in gerçek seyahati ne zaman. D., 61' kullanılır, orantı veya logaritma ile elde edilen daha kesin tarih 3 Ocak 1922'dir. Logaritmalarla ayrıntılı olarak çözülen problem Bölüm 1'in 3. sayfasında verilmektedir (Seri Ders 19).

Verilen bir Asc için MC'de İşareti, ° ve 'bulma.

Evler tablosu kesin doğum enlemini vermiyorsa, sayfa 34'te açıklanan Enlem Düzeltmesini bulun.

Gerçek enlem tabloda verilen en yakın enlemden küçük olduğunda: Tabloda ' ile azalan gösteriliyorsa

enlem, düzeltme çıkarılır. Tablo 'nin enlemle arttığını gösteriyorsa, düzeltme eklenir.

Gerçek doğum enlemi tabloda verilen en yakın enlemden büyük olduğunda: Tablo enlemle azalan gösteriyorsa düzeltme eklenir. Tablo enlemle artan ' gösteriyorsa, düzeltme çıkarılır.

Bu Asc verir. tabloda verilen en yakın enlem için.

Tabloda en yakın ve bir sonraki en yakın MC arasındaki (a) °s ve 'leri bulun. Dalton, AP, Raphael ve RC tablolarında bu her zaman 1°'dir (60').

(c) En yakın ve bir sonraki en yakın Asc arasındaki °s ve 'leri bulun. tabloda verilmiştir.

Gerçek Asc arasındaki °s ve 'leri (d) bulun. tabloda verilen enlem ve en yakın Asc için düzeltildi. tabloda verilen bu enlem için.

(b) gerçek MC'nin tabloda verilen en yakın MC'ye olan mesafesidir.

Orantılı olarak (b)'yi bulmak için (a)'yı (d) ile çarpın ve ürünü (c)'ye bölün. Logaritma ile günlük ekleyin. (a) günlüğe kaydetmek. (d) ve bunların toplam çıkarma günlüğünden. (c).

Örnek 15: Çizelge 1a'da, Artış ilerlediğinde MC'de hangi işaret, ° ve ' bulunur. Neptün r ile kavuşum yapar? İlerlemiş Asc bağlacı yapmak için. 10 Leo 55'e taşınmalı. New York için ev tablosuna baktığımızda en yakın Asc'ı buluyoruz. 11 Aslan 08, 30 Koç 00 ile

MC Bir sonraki en yakın Asc. 10 Aslan 24. Fark (c) 44'. 10 Aslan 55 ve 11 Aslan 08 arasındaki fark (d) 13'. Orantısal olarak, (a) 60'ı (d) 13 ile çarpmak 780'i verir. 780'i (c) 44'e bölmek 18' verir. Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) 1.3802 günlüğe kaydedilir. (d) 2.0444 log verir. 3.4246. Günlük çıkarma. (c) 3.4246'dan 1.5149, log olan 1.9097'yi verir. (b) 18'.

Asc olarak görünüm tamamlandığında en yakın Asc'den daha azdır. tablolarda verilen 18', 30 Aries 00'dan çıkarılmalıdır. Bu, ilerlemiş MC 29 Aries 42'yi verir.

Örnek 16: Çizelge 316'da, Artış ilerlediğinde MC'de hangi işaret, ° ve ' bulunur. Pluto r ile üçgen açı yapar mı? Plüton ile üçgen açı yapmak için*r*Asc. 8 Akrep 04'e taşınmalıdır. Dalton'un ev tablosu, 7 Akrep 40 Yükselen'deyken MC'de 15 Aslan 00'ı gösterir. lat. Yükselişte 40 ve 8 Akrep 01. lat. 39. Çizelge 316 gibi lat için dikilmiştir. 39:45, (d) 15' enlem için yapılacak bir düzeltme var. (a) 21', 7 Akrep 40 ve 8 Akrep 01 arasındaki fark. (a) 21' ile (d) 15' çarpımı 315 verir. 315'i (c) 60' bölü 5' enlem düzeltmesini verir. Bu 5'i 8 Akrep 04'ten çıkarmak, 8 Akrep 04'ün Yükselişte olduğunu gösterir. lat. 39 :45, 7 Akrep 59 Yükselişte. lat. 40, en. tabloda verilmiştir. Bu nedenle, tablo Yükseliş'te 7 Akrep 59'u gösterdiğinde, MC'deki ° ve ' işaretini bulmamız gerekir. lat. 40.

Latince. 40 tablo en yakın Yükselen olarak 7 Akrep 40'ı göstermektedir. ve bir sonraki en yakın 8 Akrep 27. Fark (c) 47'. 7 Akrep 40 ile 7 Akrep 59 arasındaki fark (d) 19'. Orantısal olarak, (a) 60'ı (d) 19 ile çarpmak şunu verir:

1140. 1140'ı (c) 47'ye bölmek 24' verir. Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) 1.3802 günlüğe kaydedilir. (d) 1.8796 log verir. 3.2598. Günlük çıkarma. (c) 3.2598'den 1.4863, günlük olan 1.7735'i verir. (b) 24'.

Asc olarak görünüm tamamlandığında en yakın Asc'den daha fazladır. tabloda verilen 24', 15 Leo 00'a eklenmelidir. Bu, ilerlemiş MC 15 Leo 24'ü verir.

Takvim Tarihini Majör, Minör veya Transit-İlerleyen MC

İlerlemiş MC'nin işaretini, ° ve ' yi MCC'ye cebirsel olarak ekleyin Sonuç, aranan takvim tarihinde ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen, ° ve ' işaretidir. Böylece, ° ve ' işareti Asc tarafından işgal edildiğinde. bir açı yaptığında, bu Asc için MC üzerindeki işaret, ° ve '. yukarıda açıklandığı gibi tespit edilebilir. Ve bir açı yaptığında ilerlemiş MC tarafından işgal edilen işaret, ° ve ' belirlendiğinde - bir doğum haritası gezegenine bir açı yaptığında olduğu gibi - bu kullanılabilir. Her iki durumda da, MC'den, MM'yi cebirsel olarak ekleyerek ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen ° ve ' işaretini bulun. Bu, Asc'nin ilerlediği kesin tarihtir. veya MC açıyı yapar,

Örnek 17: Çizelge la'da majör-ilerleyen Asc hangi tarihte. Neptün r ile kavuşum yap? Örnek 15'te, 29 Aries 42 ilerlemiş MC'deyken açının mükemmel olduğunu bulduk. Örnek 4'te bu çizelge için MCC'nin artı 9S 5° 31' olduğunu bulduk. 9S 5° ekleme

31' ila 1S 29° 42', Güneş'in 11S 5° 13' büyük ilerlemeli konumunu verir. 26 Ocak 1920'de efemeris Güneş'e 5 Kova 15'i verir. Bu, gerekli konumun 2' ötesindedir ve Güneş, büyük ilerleme ile her 6 günde 1' oranında hareket ettiğinden, bu, 12 güne eşdeğerdir. takvim yılında LD 24 Temmuz'dan 12 Temmuz'u vererek çıkarılır. 26 Ocak doğumdan 24 gün sonra olduğu için, LD, 1919 yılına 24 yıl ekleriz. kavuşum Neptün*r* 12 Temmuz 1943.

Örnek 18: Grafik 316'da majör-ilerleyen Asc hangi tarihte? Pluto r ile üçgen açı yap? Örnek 16'da, 15 Aslan 24 MC'deyken açının mükemmel olduğunu bulduk. Örnek 5'te bu çizelge için MCC'yi 5S 8° 23' olarak bulduk. 5S 8° 23' ila 5S 15° 24' eklenmesi, Güneş'in ana-ilerlemiş konumunu 10S 23° 47' olarak verir. 14 Ocak 1921'de efemeris Güneş'e 23 Oğlak 49'u verir. Bu, gerekli konumun 2' ötesindedir ve Güneş, her 6 günlük büyük ilerleme için 1' oranında hareket ettiğinden, bu, 12 güne eşdeğerdir. Takvim yılında LD 9 Şubat'tan çıkarılarak (Ocak ayındaki 31 gün dikkate alınmadan) 27 Ocak'ı verir. 14 Ocak doğumdan 28 gün sonra olduğu için LD, 1921 yılına 28 yılı ekleriz. Plüton üçgeni*r* 27 Ocak 1949.

Majör, Minör İlerlemiş Zodyak Hareketini Bulma
veya Transit MC veya Artan.

Evlerin bir tablosunda en yakın Asc'yi bulun. Hareketi doğuma en yakın enlem için belirlenecek olana. Asc farkı Ardışık enlemler arasındaki hareketler o kadar küçüktür ki, hareketi en yakın enlem için kullanmak yeterince kesindir.

(a) En yakın ve bir sonraki en yakın Asc arasındaki °s ve 's farkını bulun. içinde ilerlediği iki sütunda verilen Asc. bulunan.

Tabloda aynı iki sütunda verilen en yakın ve bir sonraki en yakın MC arasındaki °s ve 's cinsinden farkı (c) bulun. Dalton, AP, Raphael ve RC tablolarında bu her zaman 1°'dir (60').

(d) Güneş'in günlük hareketini Haritadaki efemeriste verilen °s ve ' cinsinden bulun. D., MED veya Transit Tarihi. Bu aynı zamanda ilerlemiş MC tarafından aynı ilerlemiş aralık sırasında kat edilen °s ve 'lerin sayısıdır. Haritadaki MC'nin günlük hareketidir. D., MED veya Transit Tarihi.

Orantılı olarak, (a)'yı (d) ile çarpın ve ürünü (c)'ye bölün. Bu (b) verir. Logaritma ile günlük ekleyin. (a) günlüğe kaydetmek. (d) ve toplam çıkarma günlüğünden. (c). Bu günlük verir. (b). (b) böylece bulunan °s ve ' Asc'dir. Güneş tarafından hareket ettirilen aynı majör, minör veya transit ilerleme aralığı sırasında hareket eder. Asc'nin günlük hareketidir. haritada. D. MED veya Transit Tarihi.

Bir Unsurun Dahil Olduğu Takvim Tarihini Bulma

Major-Progressed MC veya Asc. mükemmel

MC veya Asc'nin günlük hareketinden. haritada. D. ve gezegenin Haritadaki günlük hareketi. D., (a) birinin diğeri üzerindeki kazancını °s ve 's cinsinden bulun. Görünüm, ilerlemiş MC veya Artan'dan geliyorsa. bir doğum haritası pozisyonuna, (a) MC veya Asc'nin günlük hareketidir.

(b) °s ve 'nin görünüşünün mükemmelden olduğunu bulun. (b)'yi bulmak için önce, ilerlemiş MC veya Artan tarafından işgal edilen, ° ve ' işaretini bulun. haritada. D. Ardından, Haritada ilerlemiş gezegen tarafından işgal edilen ° ve ' işaretlerini bulun. D. °s ve 'lerden daha büyük olan °s ve 'lerden daha az çıkarılan °s ve 'ler °s'yi verir ve 'nin görünüşü mükemmeldendir.

(c) 12 aylık takvim zamanı veya 24 saatlik EGMT Aralığıdır.

(a), (b) ve (c)'nin bu şekilde tespit edilmesiyle, görünümün mükemmel olduğu tarih tam olarak gezegenler arasındaki büyük-ilerlemeli bir yönün mükemmel olduğu tarihin bulunmasında olduğu gibi bulunur.

Örnek 19: Çizelge la'da, majör-ilerleyen Güneş hangi tarihte ilerlemiş Yükselen'in karşıtlığını yapar? 20 Şubat 1920'de efemeris Güneş 0 Balık 34'ü gösterir. Örnek 4'te bulunan MCC 9S 5° 31' değerini 12S 0° 34' değerinden çıkarmak, bu Harita için ilerlemiş MC'yi verir. D. 25 Boğa 03. Yükselen. 25 Boğa 03 MC üzerinde olduğu zaman New York için evlerin tablosundan çalışıldığı gibi 0 Başak 31. İlerleyen Güneş, İlerlediğinden daha hızlı hareket eden Yükselen. bu nedenle (b) 3' mükemmel karşıtlığı geçmiştir. 20 Şubat'taki Güneş ve dolayısıyla MC 60' hareket ediyor. Asc. MC 60' hareket ederken 48' hareket ediyor. Güneşin Yükselen üzerindeki kazancı (a). 48' ve 60' veya 12' arasındaki farktır.

Orantılı olarak, (b) 3'ü (c) 12 ile çarpmak 36 verir. 36'yı (a) 12'ye bölmek 3mo verir. Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 2.0792. (b) 2.6812 log verir. (d) günlük olan .6020. 6h. 6'yı 2'ye bölmek 3mo verir. Takvim yılında LD 24 Temmuz'dan 3 ay çıkarılması 24 Nisan'ı verir. 20 Şubat doğum gününden 49 gün sonradır.

2 Ocak 1919'da LD yılına 49 yıl ekliyoruz. Progressed Sun muhalefettir Asc.*p*24 Nisan 1968.

Örnek 20: Tablo 316'da, büyük ilerlemeli Merkür, büyük ilerlemeli Yükselen ile altmışlık açıyı ne zaman yapar? Harita. D. 1930 için doğumdan 9 gün sonra veya 26 Aralık 1920'dir. Bu tarihte Merkür'ün efemeris konumu 22 Yay 23'tür. Güneş'in 26 Aralık 1920'deki konumu 4 Oğlak burcudur.
27. Örnek 5'te bu çizelgenin MCC'sini artı 5S 8° 23' olarak bulduk. 10S 4° 27' değerinden 5S 8° 23' çıkarmak, Haritada ilerlemiş MC'yi verir. D. 26 Yengeç 04. Dalton'un ev tablosu Asc'ta 22 Terazi 19'u gösteriyor. lat. 40, 26 Yengeç 00 MC Asc üzerindeyken. MC 60' hareket ederken 50' hareket eder. Böylece 26 Yengeç 04 MC'deyken 22 Terazi 22 Yükselen'dedir. lat. 40. Örnek 13'te açıklandığı gibi, Asc'yi veren eklenecek bir 3' düzeltmesi daha vardır. lat. 39 :45 22 Terazi 25 olarak.

Asc olarak Haritada. D. 22 Terazi 25 ve Merkür 22 Yay 23, mesafe yönü mükemmelden (b) 2'.

26 Aralık'ta Güneş ve dolayısıyla MC, 61' hareket ediyor. Ne kadar uzakta olduğunu bulmak için Asc. MC 61' hareket ederken hareket eder, daha önce açıklandığı gibi, (a) 50 ile (d) 61'i çarpın. Bu 3050'yi verir. Ardından, Artan'ın günlük hareketini veren (c) 60'a bölün. (b) 51' olarak. 26 Ocak 1920'de Merkür'ün günlük hareketi 1° 31'. Böylece günlük kazanç 40' olur.

Orantılı olarak, (b) 2'yi (c) 12 ile çarpmak 24'ü verir. 24'ü (a) 40'a bölmek (d) 24/40mo veya 18d'yi verir. Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.5563. (b) 2.8573, log olan 1.3010'u verir. (d) 1sa 12m. Bunu 72m'yi 4'e bölmek 18d verir. Merkür, Yükselen'den daha hızlı hareket ettiğinden. en

Görünüm, Haritadan sonra oluşur. D. Bu nedenle 18d 9 Şubat 1930'a eklenmelidir. İlerleyen Merkür 60'lık Yükselen'dir. *p*, 27 Şubat 1930.

-

son notlar

1 Baskısı tükenmiş, bkz.*Astroloji: 30 Yıllık Araştırma*Doris Chase Doane tarafından.

2 a.g.e.

3 Mildred Schuler tarafından yayınlanan öğrenci dergisi. Artık baskıda değil.

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 3

Ay'ın Önemli Gelişmeleri

Seri Ders Numarası 112

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

Majör, Minör veya Transit-İlerlemeli MC veya Asc'nin Sapmasını Bulma. Herhangi Verilen için Takvim Tarihi

İlk önce ilerlemiş MC veya Artan'ın işaretini, ° ve' sini bulun. Verilen takvim tarihi için. Herhangi bir ev doruk noktası, Güneş'in aynı ° ve ' işaretindeyken yaptığı eğimle aynı eğime sahip olduğundan, o zaman, belirtilen işaret, ° ve 'deyken Güneş'in eğimini bulun. Aranan sapma budur.

Major-ilerlemiş Asc. 19 Ocak 1925 tarihli 317 numaralı harita, 18 Yay 29'dur. Bu yere yakın Güneş için efemerislere baktığımızda, 10 Aralık 1920'de onu 18 Yay 09 ve 11 Aralık 1920'de buluyoruz. , biz onu 19 Yay 10 buluyoruz ve böylece günlük (c) 61' zodyak boylamına göre hareket ediyoruz. 18 Yay 09 ile 18 Yay 29 arasındaki fark (d) 20'. Güneş her gün (a) 5' sapma ile artıyor. (a) 5'i (d) 20 ile çarpmak 100'ü verir. 100'ü (c) 61'e bölmek, (b) 2'yi verir ve Güneş'in 10 Aralık'taki 22S 55 sapmasına eklenecek ve ana-ilerlemeli sapmayı verir. artan 19 Ocak 1925'te 22 S 57 olarak.

19 Ocak 1951 tarihli 317 numaralı haritanın majör-ilerlemiş MC'si 26 Terazi 36'dır. Bu yere yakın Güneş için efemerislere baktığımızda, 19 Ekim 1920'de 25 Terazi 48 ve Ekim'de .20, 1920, onu 26 Terazi 48 buluyoruz ve böylece günlük olarak (c) zodyak boylamına göre 60' hareket ediyor. 26 Terazi 48 ile 26 Terazi 36 arasındaki fark (d) 12' dir. Güneş her gün (a) 22' sapma ile artıyor. (a) 22'yi (d) 12 ile çarpmak 264'ü verir. 264'ü (c) 60'a bölmek (b) 4' verir ve Güneş'in 20 Ekim'deki 10 S 20 sapmasından çıkarılacak, ana-ilerlemeli sapmayı verir. MC, 19 Ocak 1951, 10 S 16 olarak.

115 No'lu Dersin 162. sayfasındaki “Ay ve Gezegenlerin Küçük İlerlemesi” tablosu bu hesaplamayı kolaylaştırır.



Branşlar: Doğum Haritası 317

4 Temmuz 1920, 17:00 CST. 90W. 30N.

LD 19 Ocak 1920. MM eksi 2S 14° 50'.

Dış çemberdeki ana ilerlemeler 19 Ocak 1932 içindir.

17 Şubat 1925	artan paralel Venüs*p*. Ay
11 Mayıs 1932	kavuşumu Merkür*r*. Ay
29 Eylül 1933	altmışlık Mars*r*. Ay
11 Temmuz 1934	kavuşumu Satürn*p*. Ay
16 Ekim 1937	üçgeni Ay*r*. Ay kare Güneş*p*
10 Mayıs 1938	. MC paralel Uranüs*r*.
2 Ocak 1951	



Branşlar: Doğum Haritası 2a

12 Nisan 1920, saat 3:00 MST. 108W. 40N.

LD 12 Mayıs 1920. MM eksi 7S 12° 06'.

Dış çemberdeki ana ilerlemeler 21 Mayıs 1959 içindir.

MC 1959, 22 S 53'tür. MC 1960, 22 S 48'dir.

Artan. 1959, 08 N 41'dir. 1960, 09 N 18'dir.

20 Ekim 1920	Ay karşıtlığı Jüpiter*r*. Ay
7 Kasım 1922	kare MC*r*. Ay kavuşumu
21 Mart 1925	Venüs*p*. Ay kavuşumu
29 Nisan 1926	Güneş*r*. Ay altmışlık
6 Nisan 1927	Plüton*r*. Ay kare Uranüs
26 Mart 1929	*p*.

Bölüm 3

Ay'ın Önemli Gelişmeleri

İlerlemiş bir gezegenin doğumda sahip olduğu gücün (astrodinler) yalnızca yarısını taşımasından ziyade, söz konusu gezegenin bir doğum haritası gezegeni olup olmamasının etkisi aynıdır. ilerlemiş bir gezegenin veçhesini almak veya ilerlemiş bir gezegenin bir doğum haritası gezegenine veya başka bir ilerlemiş gezegene veçhe yapmasıdır. Bu nedenle, bir gezegen bir görünüm yaptığında veya aldığında, "bir görünüm yapmak veya ondan bir görünüm almak" ifadesini tekrarlamak yerine, onun görünümle ilgili olduğunu söylüyoruz.

Her gezegen, hem doğum haritasında hem de ilerlemeye göre belirli bir tür iç düzlem hava durumunu haritalar. Bu tür iç düzlem hava durumu, düşünce hücrelerinin arzularını, onu haritalayan gezegenin karakteristiği olan bir tarzda etkiler. Bu nedenle, ilerlemiş bir açıdan dahil olan her gezegenden, düşünce hücrelerinin, gezegenin karakteristik yaşam koşullarını ve olaylarını getirmeye çalışmak için açıdan kazandıkları her türlü psikokinetik gücü kullanmalarını bekleyebiliriz.

Bakış açısına dahil olan gezegenler tarafından belirtilen iç düzlem hava tipinin yanı sıra, her bir açı, elverişli veya elverişsiz olan veya kendisini haritalayan görünümden farklı olan özel bir eğilimi olan hava durumunu gösterir. Bu

ayırt edici eğilim, Bölüm 2'de (Seri Ders 87), Ders VIII'de verilen yönün anahtar kelimesi ile belirtilir.*Horary Astroloji*.

İlerlemiş bir görünüm tarafından belirtilen iç düzlem hava durumu, esas olarak, ilerlemiş yönün terminallerini içeren doğum haritası evleri ve ilgili gezegenler tarafından yönetilen doğum haritası evleri tarafından haritalanan düşünce hücrelerini etkiler. Bir evin haritasını çıkardığı düşünce hücreleri, yaşamın belirli bir bölümüyle ilişkili olduğundan, ilgili evler, esas olarak ilerleme yönünden etkilenen yaşam bölümlerini gösterir.

Güneşi İçeren İlerleyen Yönler

Güneşi içeren herhangi bir gelişmiş yön, canlılığı, önemi ve otoriteyi etkiler.

Güneş tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak Bireyin kalıcılığı ve önemi ile ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Güç Dürtüleri olarak ifade ederler, karakterin en köklü özelliklerini haritalandırırlar, özellikle başkaları üzerinde otorite kurma gücü vermede, genel olarak erkeklerle ilişkileri göstermede ve canlılık veren elektrik enerjilerinin hükümdarı olarak önemlidirler. Onlar sadece başkaları üzerinde güç kullanma yeteneğini değil, aynı zamanda bu yetkiyi kullananların saygısını ve güvenini kazanma yeteneğini de ifade eder.

Güç ve enerji aynı şey değildir. Enerjinin güç olabilmesi için etkin bir şekilde yönlendirilmesi gerekir. Hakim olma yeteneği

ısrarla yönlendirilen arzu veya irade yoluyla koşullar, öncelikle astral bedenin Bireyselliğinde veya Güneş dinamik yapısında bulunur.

Güneş'i içeren gelişmiş yönler çok önemlidir çünkü Güç düşünce hücrelerinin faaliyeti Bireyin gücünü çok büyük ölçüde belirler. Yetkili kişilerle iyi geçinme yeteneğini ve kendisine ilişkin kendi takdirini veya başkalarının ona duyduğu saygıyı gösterirler. Sadece Güneş'i içeren gelişmiş bir yön olduğunda onur alır.

Ay'ı İçeren İlerlemiş Yönler

Ay'ı içeren herhangi bir gelişmiş yön, zihinsel tutumu, ev yaşamını ve günlük işleri etkiler.

Ay tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak bilinçdışı zihin ve ev hayatı ile ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Aile İçi Dürtüler olarak ifade ederler, bilinçaltına en açık ve alıcı yolların haritasını çıkarırlar, özellikle ruh hallerini, ev hayatını, sıradan insanlarla ilişkileri, genel olarak kadınlarla ilişkileri etkilemeleri ve yönetici olmaları açısından önemlidirler. fiziksel yapının gücünü ve dolayısıyla sağlığı etkileyen manyetik enerjinin

Büyük ilerleme gösteren Ay, on iki evin hepsinden geçer ve 27.3 yıl içinde diğer gezegenlere tüm olası görünümleri verir. Düşünce hücreleri enerji için çok açık bir yol olduğu için, ortalama iki buçuk yıldan daha kısa bir sürede her evden geçişi, şeyleri getirme eğilimindedir.

içinde bulunduğu evin yönettiği yaşam bölümü ile ön plana çıkmaktadır.

Popülerlik, bir şekilde Ay'ı ilgilendiren yönlerden etkilenmeye yatkındır. Zihniyet ile ilgili olduğu için, geçici ruh hali, ilerlemiş bir görünüm yaptığı gezegen tarafından belirtilir.

Merkür İçeren İlerleyen Yönler

Merkür'ün dahil olduğu herhangi bir ilerlemiş yön, zihinsel ilgileri, ifadenin kolaylığını veya doğruluğunu etkiler ve serebral aktiviteyi arttırır.

Merkür tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak algı ve entelektüel çaba ile ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Entelektüel Dürtüler olarak ifade ederler. Merkür habercidir. Gelişmiş bir açıdan dahil olduğu gezegen, düşünme eğilimini etkiler; ve açıya dahil olan Merkür ve diğer gezegen tarafından işgal edilen evlerin haritaladığı yaşam bölümleri, düşünce konusu olma eğilimindedir. Böylece, Venüs'le bir açı, düşünceleri neşeye, Mars'la bir açı, düşünceleri çekişmeye, Jüpiter'le bir açı, düşünceleri iyimserliğe ve genişlemeye, Satürn'le bir açı ise, düşünceleri ciddi meselelere, ihtiyat ve güvenliğe çevirir. .

Merkür ile ilgili uyumsuz ilerlemiş açılar işlerken, açıyı yaşayan kişinin veya onun uğraştığı diğer kişilerin hataları yoluyla talihsizliği çekme eğilimi vardır. Büro hataları,

Harfleri adreslemedeki hatalar, değişiklik yapmadaki hatalar, kasıtlı veya yanlışlıkla yanlış yazılmış belgeler ve yanlış bir şey söyleme, ortaya çıkan yaygın zorluklardır.

Öte yandan, Merkür'ü içeren uyumlu gelişmiş yönler, yazma ve konuşmada kolaylık ve karşılaştırmalı hatadan özgürlük sağlar. Ayrıca seyahatten yanadırlar; Bununla birlikte, kısa bir yolculuk için üçüncü evin yöneticisini içeren bir ilerleme yönü ve uzun bir yolculuk için dokuzuncu evin yöneticisini içeren bir ilerleme yönü olmalıdır.

Venüs'ü İçeren İlerlemiş Yönler

Venüs'ü içeren herhangi bir gelişmiş yön, duyguları, sosyal ilişkileri ve sanatsal takdiri etkiler.

Venüs tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak duygu ile ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Sosyal Dürtüler aracılığıyla ifade ederler ve çektikleri şeyler sosyal ilişkiler yoluyla hayata geçer. Müziğe, dansa, sanata veya duyguların ifade edildiği diğer ortak alanlara yönelik bir çekim olabilir; ya da duygusal doğa, halihazırda kurulmuş olan bu tür temaslara karşı daha duyarlı hale gelebilir. Beşincinin hükümdarı ya da yedincinin hükümdarı büyük bir ilerlemeye dahil olmadıkça, ne bir aşk ilişkisi ne de evlilik beklenebilir; ancak Venüs'ü içeren gelişmiş bir yönün, mevcut olan bu tür duygusal konular üzerinde kesin bir etkisi vardır.

Eğer Venüs uyumsuz ilerlemiş bir açıya dahil olursa, yalnızca yanlış anlamaların gelişme eğilimi olmaz, aynı zamanda birey, hayali küçümsemelere veya muhalefete karşı alışılmadık derecede hassas olma eğilimi gösterir. Bunu fark edebilir ve kendini anlaşmazlığı görmezden gelmek için eğitebilirse, çok daha iyi durumda olacaktır.

Venüs uyumlu bir şekilde ilerlediği zaman, sevgiyle ilgili konular sorunsuz bir şekilde ilerler ve tutum canlı ve zevk arama eğilimi gösterir, birçok mutlu olayı ve neşeli ifadeyi çeker. Venüs iç düzlem havası, insanlığın yaşadığı tüm iyi talihin yaklaşık dörtte birini etkiler.

Mars'ı İçeren İlerleyen Yönler

Mars'ı içeren herhangi bir gelişmiş yön, çekişme, acele ve artan enerji harcamasını beraberinde getirir.

Mars tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak enerji ile ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Saldırgan Dürtüler aracılığıyla ifade ederler. Psikokinetik enerjinin enfeksiyonu, kazayı veya savaşı kendine çekmesi, zihinsel yaratmaya, iyileştirmeye ve cerrahiye, mekanik çalışmaya veya bir şeyin inşasına yönlendirilip yönlendirilmediği, faaliyet verilen düşünce hücrelerinin uyumsuz veya uyumlu olmasına bağlıdır. Mars enerjisi ancak kontrol edilebildiği ölçüde faydalıdır; ve en elverişli yönler altında bile kazanılan şey, inisiyatif ve çekişme pahasınadır. Mars'ın getirdiği herhangi bir avantaj için savaşmak gerekir.

Mars sosyal bir gezegendir ve yönleri etkili olsa da başkalarıyla çatışmalar gelişme eğilimindedir. birey hisseder

daha az itaatkar ve normalden daha aktif ve saldırgandır. Görünüm olumlu ise, muhalefete rağmen hedefini kazanma yeteneği verir. Ancak durum olumsuz ise, başkalarının düşmanlığından ciddi şekilde zarar görür.

Mars aynı zamanda mekanik bir gezegendir ve gelişmiş yönleri makinelerle, keskin aletlerle ve çeşitli ajanslarla olan ve kaza sonucu yaralanmalara neden olabilecek ilişkileri etkiler. Makineler, Mars'ın dahil olduğu olumsuz yönler altında sorun çıkarır ve cerrahi operasyonlar ve kazalar, yalnızca Mars'la ilgili bazı büyük ilerlemeler mevcut olduğunda gerçekleşir.

Acele genellikle bu tür kazalara katkıda bulunan bir faktördür. Dürtü ve aşırı efor, Mars eğilimleridir ve ateş ve enfeksiyon, yalnızca Mars'ı içeren ilerlemiş bir yön varken çekilir. Mars iç düzlem hava durumu, insanlığın yaşadığı tüm sorunların yaklaşık dörtte birini etkiler. Mars'ın altında, iç düzlem havası sabrı geliştirin ve sakin olun.

Jüpiter'i İçeren İlerleyen Yönler

Jüpiter'i içeren herhangi bir gelişmiş yön, bireyi bolluk, artan iyimserlik ve neşe ile etkiler.

Jüpiter tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak iyi arkadaşlıkla ilgili tipteki düşünce öğelerinden oluşur.

Dini Teşvikler aracılığıyla ifade ederler ve hayata çektikleri şeyler işten ve işten kaynaklanmaz.

zorluk, ancak iyi dostluk ve himayeden. Jüpiter satıcılık gezegenidir ve düşünce hücreleri tarafından çekilen şeyler, esas olarak başkalarının iyilikseverliğinden ve iyi niyetinden kaynaklanır. Genişlemeye meyilli bir iyimserlik verirler ve din ve ticaret düşüncelerine meylederler. Jüpiter bir iş gezegenidir ve tüccarlar, bankacılar, din adamları, avukatlar ve doktorlarla olan ilişkiler, düşünce hücrelerinin faaliyetlerinden özellikle etkilenir.

Gezegenlerin en şanslısı olan düşünce hücreleri, psikokinetik güçlerini Bolluk getirmek için kullanır. Getirdikleri bu tür sıkıntılar bile, bir şeyin fazlalığından, örneğin fazla gıdadan veya sağlığa zarar veren gıdanın aşırı zenginliğinden, maliyeyi etkileyen aşırı harcamalardan, krediyi etkileyen aşırı genişlemeden veya aşırı cömertlikten, dikkatsizlikten kaynaklanır. veya savurganlık. Jüpiter iç düzlem hava durumu, insanlığın yaşadığı tüm iyi talihin yaklaşık yarısını etkiler.

Satürn'ü İçeren İlerleyen Yönler

Satürn'ün dahil olduğu herhangi bir ilerlemiş yön, iş, sorumluluk ve ekonomi veya kayıp getirir.

Satürn tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak güvenlikle ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Güvenlik Dürtüleri aracılığıyla ifade ederler ve hayata çektikleri şeyler sorumluluktan, azimden, ağır ağır emekten, sistemden, organizasyondan, zorluktan veya kayıptan kaynaklanır. Eğer görünüş uyumlu ise yapılan iş

orantılı kazanç üretken; ancak uyumsuzsa, harcanan emeğin karşılığı yetersizdir.

Satürn bir iş gezegenidir, ancak izlediği yöntem her zaman kısıtlayıcıdır ve dolayısıyla Jüpiter'in uyguladığı yöntemin tam tersidir. Kazançları, ekonomi, sistem, düzen, kurnazlık ve diğer kişilerin en düşük rakamdan satın alma zorunluluğundan yararlanarak elde edilir. Satürn'ün dahil olduğu gelişmiş yönler altında satış yaparken, temyiz bir pazarlık sunularak yapılmalıdır; ve Satürn'ün dahil olduğu uyumlu bir açıyı satın almak, bir pazarlığı çekmek için en iyi etkidir.

Gezegenlerin en talihsizi olan düşünce hücreleri, psikokinetik güçlerini Yoksulluk getirmek için kullanır. Getirdikleri ıstıraplar, sağlığı etkileyen yetersiz beslenme, evi etkileyen ölüm veya hastalık veya mali durumu etkileyen kayıp gibi bir şeyin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Satürn iç düzlem hava durumu, insanlığın yaşadığı tüm sıkıntıların ve kayıpların yaklaşık yarısını etkiler. Satürn'ün iç düzlem havası altında çenenizi yukarıda tutun ve neşeyi geliştirin.

Uranüs İçeren İlerleyen Yönler

Uranüs'ü içeren herhangi bir gelişmiş yön, ani bir şey aracılığıyla, bir insan aracılığıyla etki eder ve yaşama değişiklik getirir.

Uranüs tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak, özgünlükle ilgili tipteki düşünce öğelerinden oluşur.

Bireyci Dürtüler aracılığıyla ifade ederler ve hayata çektikleri şeyler, bazı yollarla aniden ortaya çıkar.

insan failliği ve bir şekilde geçtikten sonra yaşamı daha yüksek bir zihinsel düzeyde bırakan bir değişikliği başlatır. Hayata yeni kişiler ve yeni koşullar getirmeye, hayattan eski ortakları ve eski koşulları çıkarmaya ve hayatı derinden etkileyen yeni fikirler getirmeye meyillidirler.

Uranüs radikal gezegendir. Kendine ait bir kodu var ve geleneklere tamamen kayıtsız. Böylece, düşünce hücreleri aktif olduğunda, alışılmamış bağlılıklar veya alışılmamış görüşler gelişir. Diğer tüm düşünce hücrelerinden daha fazla, ani güçlü bağların oluşmasına ve bunların kırılmasına eğilimlidirler. Bir bağlılığı kırmak çoğu zaman bir diğerini oluşturmakla çakışır. Yine de, Uranüs'ü içeren gelişmiş bir görünüm altında oluşan bir bağlılık, yalnızca görünüm, mükemmelliğin etkin bir derecesi içindeyken sürmeye uygundur.

Uranüs'ün astroloji ve okült bilimler üzerinde özel bir egemenliği vardır, ancak hem Neptün hem de Plüton da bu tür çalışmalara meyilli. Uranüs'ün ilerlemiş yönü güçlü olduğunda, hayatı sanki bir bölüm bitmiş ve tamamen yeni bir bölüm başlamış gibi böler. Ve bu tür değişiklikleri meydana getiren araç, genellikle açık bir gökyüzünden bir yıldırım gibi, her zaman insandır. Gezegen, İnsan burcunu yönetir ve getirdiği bu tür iyilikler, düşünce hücrelerinin faaliyeti tarafından çekilen bir kişi aracılığıyla gelir ve çektiği talihsizlikler, bir kişinin yaşam üzerinde aşırı bir etkide bulunmasından veya başka bir kişinin dikkatsizlik.

Otomobiller ve radyo setleri gibi elektrik gerektiren yeni icatlar ve araçlar, bu gezegeni içeren uyumsuz gelişmiş yönler altında devre dışı kalma eğilimindedir. ve bir

Düşünce hücrelerinin çektiği herhangi bir olayla ilgili tuhaf olan şey, ne kadar elverişli olursa olsun, aynı zamanda küçük bir kayıp olması ve ne kadar aleyhte olursa olsun, onlara küçük bir kazanç eşlik etmesidir.

Neptün'ü İçeren İlerlemiş Yönler

Neptün'ün dahil olduğu herhangi bir gelişmiş açı, hayal gücünü arttırır, hassasiyeti arttırır ve şemaları çeker.

Neptün tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak idealizmle ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur.

Ütopik Dürtüler aracılığıyla ifade ederler ve hayata çektikleri şeyler fazla çaba harcamadan gelir, çünkü Neptün çok çalışmayı sevmez. Olumlu eylemden çok olumsuzluğa, büyük duyarlılığa ve gündüz düşlerine meyleder. Aynı zamanda sıra dışıdır, ancak Uranüs'ten daha az belirgindir. Düşünce hücresi aktivitesi, zihni ileri görüşlere ve okültizm, psişik meseleler ve astrolojiye ilgi duymaya yöneltir. Ancak bir astrolog yapmak için diğer düşünce hücrelerinin, Neptün tarafından haritalananların gerekli astrolojik aritmetiği nasıl ele alacağını öğrenmek konusundaki isteksizliğini yenecek kadar aktif olması gerekir.

Neptün'ün dahil olduğu uyumlu gelişmiş yönler, tatillere, gezilere ve alışılmadık derecede hoş deneyimlere yol açar. Genellikle ecstasy benzeri bir duygu mevcuttur. Ancak daha olumlu yönleri bile, duygusal ilişkiler üzerinde kendine özgü bir ayırıcı niteliğe sahiptir. Ayrılma, Uranüs'ün neden olduğu gibi ani değil, oldukça kademeli. Genellikle orada

gönüllü bir vazgeçiştir. Yine de romantik bağlar da kurulabilir.

Neptün'ün uyumsuz düşünce hücresi etkinliğinin çektiği olumsuz olaylar, genellikle bireyin oluşturduğu gerçekleştirilemez ideallerle veya başkaları tarafından ondan yararlanmak için teşvik edilen kasıtlı terfi planlarıyla ilgilidir. Kendine güvenen erkekler, Neptün'ün dahil olduğu ağır ıstıraplarla temsil edilir; ve daha az ağır rahatsızlıklar, başarısız olan iyi niyetli terfi planlarını gösterir. Sağlıkla ilgili olarak, Neptün'ün ilerlemiş yönleri tüm zehirlenme vakalarında mevcuttur ve adrenalin ve kortin salgılanmasını baskılayarak enfeksiyonu kolaylaştırır.

Neptün abartma eğilimindedir ve bireyin çaba harcamadan inanılmaz bir fayda sağladığı nadir durumlar dışında, gelişmiş yönleri altında yaklaşan şey her zaman sonradan olduğundan daha büyük görünür. Büyük çekiliş ve piyango kazançları neredeyse her zaman Neptün açıları altındadır. Ancak çoğu zaman vaat edilen büyük faydalar, gerçekleştiğinde küçük faydalara dönüşüyor. Büyük endişe ve korkuya neden olan tehdit altındaki felaketler, ya gelmezler ya da vardıklarında önemsizdirler.

Neptün düşünce hücresi aktivitesi altında hayal gücü aktiftir ve uyumsuz yönler altında çekilen projeler ve planlar başarısız olma eğilimindedir. Daha iyi açılardan başlayanlar bile beklenenden çok daha az verim sağlıyor. Genellikle Neptün tarafından vaat edilenler yaklaşık %90 oranında indirimli olmalıdır.

Plüton İçeren İlerleyen Yönler

Plüton'un dahil olduğu herhangi bir gelişmiş yön, gruplar aracılığıyla, süptil güç yoluyla etkiler ve zorlama veya işbirliği getirir.

Plüton tarafından haritalanan veya yönetilen astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak işbirliği ile ilgili türdeki düşünce öğelerinden oluşur. Çektikleri olaylar, bireyi başka bir grubun muhalefetiyle karşılaşacağı kesin olan bir tür grup etkinliğine katılmaya çekme güçleri bakımından benzersizdir.

Evrensel Refah Dürtüleri aracılığıyla ifade ederler ve hayata çektikleri şeyler gruplar aracılığıyla gelir. Plüton düşünce hücrelerinin psikokinetik güçlerini hayata geçirmek için kullandıkları gruplar, amaç için başkaları üzerinde bencil bir avantaja sahip olabilir veya insanlığa fayda sağlayabilir. Daha iyi yanıyla Pluto, Evrensel Refah için çalışma dürtüsünü verir. Ancak olumsuz tarafı, çeteleşme ve haraççı olma eğilimindedir.

Bu nedenle, Plüton'u içeren gelişmiş yönler güçlü olduğunda, fiziksel düzlemde veya iç dünyadaki diğerleriyle güçlerini birleştirirken ayrımcılığı kullanmak bir bireye yakışır. Uyumsuz ilerlemiş yönler altında, bir kişi suçlu yeraltı dünyasına dahil olabilir, adam kaçıranların hedefi olabilir veya görünmez şantajcılar tarafından bir araç olarak kullanılabilir. Yine de daha uyumlu gelişmiş yönler altında, evrensel iyilik için önemli olan bir çabada başkalarıyla el ele verme fırsatı olabilir.

Uranüs ve Neptün'den daha az olmayan Pluto, okült arayışlara ilgiyi teşvik etme eğilimindedir; ve özellikle iç düzlemdeki zekalarla bağlantı kurma gücüne sahiptir. onun altında

düşünce hücresi aktivitesi, birey bazı ruhsal işler yapma fırsatına ve arzusuna sahip olabilir.

Uranüs veya Neptün'ü içeren ilerlemiş açılar gibi, Plüton'u içeren ilerlemiş açılar da sinir sisteminin hassasiyetini arttırır ve psişik deneyimlere yönelir. Birey, her iki düzlemdekilerin düşüncelerine karşı alışılmadık derecede hassas hale gelir.

MC'yi İçeren İlerleyen Yönler

MC'yi içeren herhangi bir ilerleme durumu, onuru, işi ve tanıtımı etkiler.

MC tarafından haritalanan astral formdaki düşünce hücreleri, esas olarak yükseltici olarak görev yapanlardır. İster doğum haritası MC, ister ilerlemiş MC olsun, onların faaliyetleri, halkın durumunu etkileyen yaşam olaylarını kendine çekiyor. Bu şekilde tanıtımı etkileyen olayın türü, açıya dahil olan gezegenin özellikleri tarafından belirlenir ve böylece tanıtımı etkileyen yaşam bölümü bu gezegenin yönettiği evler tarafından belirtilir. İş veya onur, bu gezegenin yönettiği evlerin belirttiği yaşam bölümlerini de etkiler.

Asc İçeren İlerleyen Yönler

Asc'yi içeren herhangi bir gelişmiş yön. sağlığı, kişiliği ve kişisel ilişkileri etkiler.

Asc tarafından haritalanan astral formdaki düşünce hücreleri. başlıca, kişiliğin astral enerjisinin dış dünyaya ulaştığı bir topraklama kablosu görevi görenlerdir. Doğum haritasının olup olmadığı Asc. veya ilerlemiş Asc.,

etkinlikleri, sağlık konularında ve kişiliğin kendisiyle doğrudan temasa geçen diğerlerini nasıl etkilediği konusunda çok önemlidir; ve ilerlemiş açıda yer alan gezegen tarafından belirtilen şeylerin veya insanların sağlığı, kişiliği nasıl etkilediği ve kişisel hayata nasıl değişiklikler getirdiği.

İlerlemiş açıya dahil olan gezegen, özellikleriyle sağlığın ve kişiliğin nasıl etkileneceğini belirler ve yönettiği evler, kişiliği etkileyen ve kişilikten etkilenen yaşamın bölümlerini gösterir.

Ay'ın Başlıca İlerlemiş Yönleri Sadece Çekiyor Alt Ana Olaylar

Uzun gözlemler, ortalama olarak Ay'ın yaptığı gelişmiş bir açının, diğer on bir pozisyondan biri tarafından yapılan benzer bir gelişmiş yönün çektiği kadar önemli bir olayı sadece 1/7 oranında çektiğini gösterdiğinden, büyük-ilerlemiş yönleri belirtmek gelenekseldir. Ay tarafından alt ana-ilerlemiş yönler olarak yapılmıştır. Bununla birlikte, doğum haritasındaki Ay'ın diğer on bir konumundan herhangi biri tarafından yapılan gelişmiş açılar, ortalama olarak, diğer doğum haritası gezegenlerine yapılanlar kadar olayları çekmek için güçlüdür.

Hareketi Majör, Minör veya Transit-Progressed MC veya Artan.

MC ve Asc. aynı zodyak işaretinde, ° ve ' ve aynı sayıda ° ve ' zodyak boylamında hareket ederken Güneş'in sahip olduğu sapma ile aynı harekete sahiptir.

Güneş'in, ilerlemiş MC veya Yükselen tarafından işgal edilen zodyak'ın yaklaşık olarak aynı işareti, ° ve ' olduğu tarihe bir efemeri çevirin.

(a) Güneşin o tarihteki günlük hareketini °s ve 'ler cinsinden sapmaya göre bulunuz.

(c) Zodyak boylamına göre o tarihte Güneş'in °s ve 's cinsinden günlük hareketini bulun.

(d) °s ve 's MC veya Asc'yi bulun. Harita üzerinde zodyak boylamına göre hareket eder. D., MED. veya Geçiş Tarihi, Bölüm 2'nin 61-62. sayfalarında açıklandığı gibi (Seri Ders 111).

Orantılı olarak, (a)'yı (d) ile çarpın ve ürünü (c)'ye bölün. Bu (b) verir. Logaritma ile günlük ekleyin. (a) günlüğe kaydetmek. (d) ve toplam çıkarma günlüğünden. (c). Bu günlük verir. (b). (b) bu şekilde bulunan °s ve 's MC veya Asc'dir. Güneş tarafından hareket ettirilen aynı majör, minör veya transit ilerleme aralığı sırasında sapma ile hareket eder. MC veya Asc'nin düşüşüyle günlük harekettir. haritada. D., MED. veya Transit Tarihi.

Örnek 21: Çizelge 317'de majör-ilerlemeli Yükselen'in sapma ile hareketi nedir? haritada. D. 1925? Bu çizelge için Sınırlı Tarih 20 Ocak 1920'dir. Harita. 1925 için D. 9 Temmuz 1920'dir. İlerleyen Asc. bu Harita için. D., Bölüm 2'nin 51. sayfasında (Seri Ders 111) verilen kurala göre hesaplanan 18 Yay 29'dur.

Güneş'in 18'e yakın olduğu tarih için efemeriye baktığımızda Yay 29, 10 Aralık 1920'de, 22 S 55'lik bir sapma ile 18 Yay 09'u ve 11 Aralık 1920'de 19 buluyoruz. Yay 10, 23 S'lik bir düşüşle

00. Sapma ile günlük hareket (a) 5'. Zodyak boylamına göre günlük hareket (c) 61'.

Şimdi (d)'yi bulmak için Bölüm 2'nin 61-62. sayfalarında açıklanan hesaplamayı yapmalıyız (Seri Ders 111). Bu problemde, enlem 30 için bir ev tablosuna bakarız ve en yakın ve bir sonraki en yakın arasındaki farkın Asc olduğunu buluruz. 18'den Yay 29'a (a) 48' dir. Aynı sütundaki en yakın ve bir sonraki en yakın MC arasındaki fark (c) 60'. Haritada Güneş'in Günlük Hareketi. D. (9 Temmuz 1920) 57'. (a) 48'i (d) 57 ile çarpmak 2736 verir. 2736'yı (c) 60'a bölmek (b) 46' değerini Asc mesafesi olarak verir. Güneş Harita üzerinde 57' hareket ederken hareket eder. D. Böylece 46' ana problemin (d)'si olur.

Orantısal olarak, (a) 5'i (d) 46 ile çarpmak 230 verir. 230'u (c) 61'e bölmek (b) 4' verir. Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) 2.4594 oturum açmak için. (d) 1.4956, 3.9550'yi verir. Günlük çıkarma. (c) 3.9550'den 1.3730, log olan 2.5820'yi verir. (b) 4'. 4' böylece majör-ilerlemiş Asc'nin düşüşüyle günlük harekettir. haritada. 1925 için D.

Örnek 22: Grafik 317'de, Haritada ana-ilerlemiş MC'nin sapma ile hareketi nedir. D. 1951 için mi? Bu çizelge için Sınırlı Tarih 19 Ocak 1920'dir. Harita. D. 1951 için 4 Ağustos 1920'dir. Bu Harita için geliştirilmiş MC. D., Bölüm 2'nin 50. sayfasında (Seri Ders 111) verilen kurala göre hesaplanan 26 Terazi 36'dır.

Güneş'in 26 Terazi 36'ya yakın olduğu tarihe baktığımızda 19 Ekim 1920'de 25 Terazi 48, 9 S 58 sapma ile ve 20 Ekim 1920'de 26 Terazi 48 buluyoruz. Birlikte

10 S 20 sapma. Sapma ile günlük hareket (a) 22'. Zodyak boylamına göre günlük hareket (c) 60'.

Haritada. D. (4 Ağustos 1920) Güneş'in günlük hareketi 57'. MC, Güneş'in hareket ettiği hızla hareket ettiğinden, MC'nin (d) günlük hareketi de 57' dir.

Orantısal olarak, (a) 22'yi (d) 57 ile çarpmak 1254'ü verir. 1254'ü (c) 60'a bölmek (b) 21' değerini verir. Logaritmalarla, log ekleme. (a) 1.8159 günlüğe kaydedilir. (d) 1.4025, 3.2184'ü verir. Günlük çıkarma. (c) 3.2184'ten 1.3802, günlük olan 1.8382'yi verir. (b) 21'. 21', bu nedenle, Haritadaki ana-ilerlemiş MC'nin düşüşüyle günlük harekettir. D. 1951 için.

Paralel Bir Yönün Bulunduğu Takvim Tarihini Bulma Major-Progressed MC veya Asc içeren. mükemmel

°s cinsinden sapmayı bulun ve ilerleme tarafından işgal edilen ' MC veya Asc. haritada. D. Eğer açı bir doğum haritası gezegenine ise, doğum haritasındaki sapmayı bulun; ama eğer ilerlemiş bir gezegen içeriyorsa, haritada gezegen tarafından işgal edilen eğimin ° ve ' değerini bulun. D.

MC veya Asc'nin düşüşüyle günlük hareketten. haritada. D. ve Haritadaki sapma ile gezegenin günlük hareketi. D., (a) birinin diğeri üzerindeki kazancını °s ve 's cinsinden bulun. Görünüm, ilerlemiş MC veya Artan'dan geliyorsa. bir doğum haritası pozisyonuna, (a) MC veya Artan sapma ile günlük harekettir.

(b)'yi bulun, °s ve 'lerin paralel yönü Haritada mükemmelden. D.

Ardından, Bölüm 2'nin 54-55. sayfalarında (Seri Ders 111) açıklandığı gibi, gezegenler arasındaki büyük ilerlemenin mükemmel olduğu takvim tarihini buluyormuş gibi problemi tam olarak çalışın.

Örnek 23: Tablo 317'de Artış'ın ilerlediği tarihi bulun. Venüs s ile paralellik kurar. Haritada. D. 1925 için (efemeris tarihi 9 Temmuz 1920) Venüs 22 N 58 sapmadır. 66. sayfada bunu aynı Haritada bulduk. D. İlerlemiş Asc. sapma 22 S 57'dir. Böylece açı (b) Haritada mükemmelden 1' dir. D. 9 Temmuz 1920'deki efemeris, Venüs'ün eğimini günde 9' oranında azalttığını gösteriyor. Örnek 21'de Asc'nin günlük hareketinin olduğunu bulduk. sapma ile 4' dir. Venüs'ün eğimi azalıyor ve Yükseliyor. (Aynı zodyak derecesinde Güneş'in gösterdiği gibi) sapmada artıyor, 9' ila 4' ekliyoruz, bu da günlük kazancı (a) 13' olarak veriyor.

Orantılı olarak, (b) 1'i (c) 12 ile çarpmak 12'yi verir. 12'yi (a) 13'e bölmek (d) takvim aralığını 12/13 ay veya 28 gün olarak verir. Logaritmalarla, logu çıkarın. (a) günlükten 2.0444. (b) 3.1584 ve log olan 1.1140'ı verir. (d) 1h 51m veya 111m. 111'i 4'e bölmek 28 gün verir.

Bu 28 günü 19 Ocak 1925'e eklemek (9 Temmuz 1920, Harita D'dir), ilerlemeli Artış verir. paralel Venüs*p*17 Şubat 1925.

Örnek 24: 317 numaralı çizelgede MC'nin paralel Uranüs r olduğu tarihi bulun. Uranüs*r*10 S 15 sapma var. Haritada. D. 1951 için (4 Ağustos 1920) sayfa 66'da ilerlemiş MC'nin 10 S 16 sapmaya sahip olduğunu bulduk. Fark (b) 1'. Örnek 22'de günlük

Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

MC'nin bu Harita D'deki sapma ile hareketi (a) 21' olacaktır.

Orantısal olarak (b) 1'i (c) 12 ile çarpmak 12'yi verir. 12'yi (a) 21'e bölmek (d) takvim aralığını 12/21 ay veya 17 gün olarak verir. Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.8361. (b) 3.1584, günlük olan 1.3223'ü verir. nın-nin (b) 1sa 9dk veya 69 dakika. 69'u 4'e bölmek 17 gün verir.

İlerledikçe MC, Haritadaki görünümü geçti. D., 19 Ocak 1951'den 17 günü çıkarıyoruz. Böylece büyük-ilerlemiş MC paralel Uranüs'tür.*r*2 Ocak 1951.

Büyük İlerlemiş Ay Tarafından Yapılan Yönleri Hesaplama

Önemli iç düzlem havasının türü ve uyumu ya da uyumsuzluğunun, uygun önlemlerin alınabilmesi için yeterince önceden bilinmesi için, Ay tarafından yapılanlar dışındaki tüm önemli gelişmeler hesaplanmalı ve tablolaştırılmalıdır. önümüzdeki yılların sayısı. Ve Ay tarafından yapılan büyük ilerleme yönleri, en az bir yıl önceden hesaplanmalı ve tablo haline getirilmelidir, böylece diğerinin büyük ilerlemeli yönleri tarafından gösterilen iç düzlem hava durumuna ekleyebilecekleri yardımcı enerjiye göre yeterli önlem alınabilir. gezegenler ilerlediğinde Ay, bu diğer büyük-ilerlemiş yönlerden birinin bir terminaline bir görünüm verir.

Bir yıllık bir süre için Ay'ın büyük gelişmiş yönlerini hesaplamayı kolaylaştırmak ve tüm sapmalar dahil olmak üzere doğum haritası pozisyonlarına ek olarak bazı önemli yönleri yanlışlıkla gözden kaçırmamak için, haritaya hem burçları hem de burçları yazmak iyi olur. , °, ve ' ve sapma

majör-ilerlemiş MC ve majör-ilerlemiş Asc. art arda iki Harita için hesaplanmıştır. İlerlemiş Ay hesaplamalarının yapılacağı D'ler. Bu Haritaların her biri. D'ler, belirli bir takvim yılı içindeki Sınırlama Tarihini temsil eder. İlerlemiş MC veya Artan'ın işareti, ° ve ' arasındaki fark. bir Harita üzerinde. D. ve sonraki Harita. D., ilgili yıl boyunca ilerlemiş zodyak hareketini ve MC veya Artan'ın düşüşü arasındaki farkı temsil eder. bir Harita üzerinde. D. ve sonraki Harita. D., ilgili yıl içindeki ilerleme hareketini sapma ile temsil eder. Birbirini takip eden iki Harita arasındaki gezegenlerin her birinin zodyak hareketi ve meyliyle hareketi. D'ler hareketlerini ilgili yıl boyunca ilerleme ile gösterirler. Ve Haritadaki efemerlerdeki gezegenlerin konumları gibi. D. ilgili takvim yılı içinde LD için konumlarını göster, hesaplamalar Harita ile başlamalıdır. D. ve LD tarafından belirtilen yıl içindeki takvim tarihi

Ay'ın bir yıl boyunca büyük ilerleme gösteren yönlerinin hesaplanmasında, bir takvim yılı içinde LD ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırır ve hesaplamaları, oluşturdukları ardışıklıkta birbiri ardına çizelgelemeden önce, Ay'ın yaptığı tüm yönleri gösterir. takip eden takvim yılının LD'sine kadar. Böylece açılar bir Harita ile başlar. D. ve aşağıdaki Harita ile bitirin. D., bu iki Harita arasındaki tüm gezegenlerin günlük hareketi. D, verilen yıl boyunca onların ana ilerlemesidir. Ay'ın günlük hareketi çok büyük olduğu için, ilerlemiş yönlerini logaritmalarla hesaplamak orantıdan çok daha kolaydır. Ancak, burada her iki yöntem de gösterilecektir.

12 Mayıs 1959 takvim tarihiyle, bu tarih için çevresinde büyük ilerleme pozisyonlarını içeren 68. sayfadaki Tablo 2a'yı kullanarak başlayacağız. Harita. D. (efemeristeki tarih) 21 Mayıs 1920'dir. 21 Mayıs 1920'de Ay'ın günlük hareketi (a) 14° 36' dir. Günlük. Ay'dan doğum haritasına kadar tüm açılar için kullanılacak olan bunun değeri .2159'dur. 14° 36' 12'ye bölme, Ay'ın aylık hareketini büyük ilerlemeyle 1° 13' veya 30 günde 73' olarak verir.

1. Ay paralel Neptün*p*: Ay, her gün (a) 2° 51' meyli küçülüyor. Bunun 1/12'si 14', aylık ilerleme miktarı. Neptün*p*18 N 00 eğime sahip. Ay 18 N 01 eğime sahip. Fark (b) 1'. 30 günün 1/14'ü 2 gündür.

Logaritmalarla, log çıkarma. 2° 51' (a) .9254 günlükten. (b) 3.1584, günlük olan 2.2330'u verir. (d) 8m. 8'i 4'e bölmek 2 gün verir. Her iki yöntemle de bulunan 2 günü 12 Mayıs 1959'a ekleyerek Ay paralel Neptün'ü verir.*p* 14 Mayıs 1959.

2. Ay kavuşumu Asc.*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay (b) 19' 15 Aslan 49'a hareket etmelidir. 30 günün 19/73'ü 8 gündür.

Logaritmalarla, log çıkarma. 14° 36' (a) .2159 günlükten. (b) 1.8796, (d) 31m'nin logu olan 1.6637'yi verir. 31'i 4'e bölmek 8 gün verir. Her iki yöntemle de bulunan 8 günü 12 Mayıs 1959'a eklemek, Ay'a bağlı Artış verir. *r*20 Mayıs 1959.

3. Ay'a 60'lık Venüs*p*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 2° 52'lik bir boşluğu kapatması gerekir. 1° 13' Venüs hareketini 14° 36' konumundan çıkarmak, Ay'ın hareketi günlük kazancı verir (a) 13° 23'. Bunu 12'ye bölmek, aylık kazancı şu şekilde verir:

1° 07'. 2 ayda kazanç 2° 14'. Bu 38' bırakır. 1° 07' 67' dir. 30 günün 38/67'si 17 gündür.

Logaritmalarla, log çıkarma. 13° 23' (a) .2536 günlükten. 2° 52' (b) .9228, günlük olan .6692'yi verir. (d) 5h 08m. 5'i 2'ye bölmek, 60m kalanla 2mo verir. Bu kalanı 08m'ye eklemek 68m verir. 68 metreyi 4'e bölmek 17 gün verir. Her iki yöntemle de bulunan 2 ay 17 günü 12 Mayıs 1939'a ekleyerek Ay'a altmışlık Venüs verir*p*29 Temmuz 1959.

4. Ay kare kare MC*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay (b) 3° 47' 19 Aslan 17'ye hareket etmelidir. Ayda 1° 13'de bu, 8' kalanla 3 ay sürer. 30 günün 8/73'ü 3 gündür.

Logaritmalarla, log çıkarma. 14° 36' (a) .2159 günlükten. (b) .8023, günlük olan .5864'ü verir. (d) 6h 13m. 6'yı 2'ye bölmek 3mo verir. 13'ü 4'e bölmek 3d verir. Her iki yöntemle de bulunan 3 ay, 3 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Moon sesquisquare MC'yi verir.*r*15 Ağustos 1959.

5. Ay kare kare Uranüs*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay (b) 3° 51' hareket etmelidir. 3 ayda 3° 39' hareket eder. Ek 12'yi taşımak 30 günün 12/73'ünü veya 5 günü alır.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2159. (b) .7947, günlük olan .5788'i verir. (d) 6h 20m. 6'yı 2'ye bölmek 3mo verir. 20'yi 4'e bölmek 5d verir. Her iki yöntemle de bulunan 3 ay, 5 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay sesquisquare Uranüs'ü verir.*r*17 Ağustos 1959.

6. Ay karesi Satürn*p*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 4° 30' lik bir boşluğu kapatması gerekir. Satürn 2' hareket ediyor ve

Ay 14° 36' hareket ediyor. Fark, günlük kazanç (a) 14° 34'. Bunu 12'ye bölmek, aylık kazancı 1° 13' veya 73' olarak verir. 4 ayda 4° 52' hareket eder. 22'yi taşımak için çok ileri gitti, 22/73 30 gün veya 9 gün sürer. Böylece açı yapmak 3 ay 21 gün sürer.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2168. (b) .7270, günlük olan .5102'yi verir. (d) 7h 25dk. 7'yi 2'ye bölmek, geriye kalan 60m ile 3mo verir. 25m'ye 60m eklemek 85m verir. 85'i 4'e bölmek 21d verir. Her iki yöntemle de bulunan 3 ay, 21 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay sesquisquare Satürn'ü verir.*p*3 Eylül 1959.

7. Ay yarım kare Satürn*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay (b) 4° 50' hareket etmelidir. 4 ayda Ay 4° 52' hareket eder. 2'yi taşımak için çok ileri gitti, 30 günün 2/73'ünü veya 1 günü alır. Böylece açıyı 3mo, 29d'de yapar.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2159. (b) .6960, günlük olan .4801'i verir. (d) 7h 57m. 7'yi 2'ye bölmek, 60 kalanla 3 ay verir. 57m'ye 60m eklemek 117m verir. 117'yi 4'e bölmek 29d verir. Her iki yöntemle de bulunan 3 ay, 29 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay sesquisquare Satürn'ü verir.*r*11 Eylül 1959.

8. Ay kare kare Uranüs*p*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 5° 01'lik bir boşluğu kapatması gerekir. Uranüs 1' ve Ay 14° 36' hareket ediyor. Fark, günlük kazançtır (a) 14° 35'. Bunu 12'ye bölmek, aylık kazancı 1 ° 13' veya 73' olarak verir. 4 ayda Ay 4° 52' hareket eder. Diğer 9'u taşımak 30 günün 9/73'ünü veya 4 günü alır.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2164. (b) .6798, günlük olan .4634'ü verir. (d) 8h l5dk. 8'i bölerek

2, 4 ay verir. 15'i 4'e bölmek 4d verir. Her iki yöntemle de bulunan 4 ay, 4 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay sesquisquare Uranüs'ü verir.*p*16 Eylül 1959.

9. Ay kare Mars*p*: Ay'ın açıya ulaşabilmesi için (b) 6° 29' lik bir boşluğu kapatması gerekir. Mars 9' geri hareket ediyor ve Ay 14 ° 36' hareket ediyor. Günlük kazancı bulmak için (a) 14° 45' veren iki hareketi toplarız. 12'ye bölmek, aylık kazancı 1° 14' veya 74' olarak verir. 5 ayda kazanç 6° 10'. Bu 19' bırakır. 30 günün 19/74'ü 8d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. 14° 45' (a) .2114 günlükten. (b) .5684, günlük olan .3570'i verir. (d) 10h 33m. 10'u 2'ye bölmek 5mo verir. 33'ü 4'e bölmek 8d verir. Her iki yöntemle de bulunan 5 ay, 8 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay kare Mars'ı verir.*p*20 Ekim 1959.

10. Ay kare Güneş*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay (b) 6° 41' hareket etmelidir. 5 ay sonra Ay 6° 05' hareket edecek. Bu 36' bırakır. 30 günün 36/73'ü 15 gün verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2159. (b) .5552, günlük olan .3393'ü verir. (d) 10h 59m. 10'u 2'ye bölmek 5mo verir. 59'u 4'e bölmek 15d verir. Her iki yöntemle de bulunan 5 ay, 15 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay kare Güneş'i verir.*r*27 Ekim 1959.

11. Ay karesi Artan.*p*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 6° 48' lik bir boşluğu kapatması gerekir. Asc. (bkz. tablo) 1° 41' ve Ay 14° 36' hareket ediyor. Fark (a) 12° 55'. Bunu 12'ye bölmek, ayda 1° 05' kazanç sağlar. 6 ayda kazanç 6° 30' olacaktır. Bu 18' bırakır. 1° 05' 65' eşittir. 30 günün 18/65'i 8 gün verir (kazanç ayda 1° 05' den az olduğundan logaritmalar kadar kesin değildir).

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2691. (b) .5477, günlük olan .2786'yı verir. (d) 12h 38m. 12'yi 2'ye bölmek 6 ay verir. 38'i 4'e bölmek 9d verir. 12 Mayıs l959'a kadar bulunan 6 ay, 9 gün eklendiğinde, Artan Ay karesini verir.*p*21 Kasım 1959.

12. Ay paralel Venüs*p*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 1° 42'lik bir boşluğu kapatması gerekir. Ay 2° 51' küçülüyor ve Venüs 22' artıyor. Kazancı bulmak için (a) 3° 13' veren bu iki hareketi toplarız. 3° 13'ü 12'ye bölmek, ayda 16 kazanç sağlar. 6 aydaki kazanç 1° 36'. Bu 6' bırakır. 30 günün 6/16'sı 11 gün verir (kazanç ayda 16' dan biraz fazla olduğundan logaritmalar kadar kesin değildir).

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .8728. (b) 1.1498, günlük olan .2770'i verir. (d) 12h 41m. 12'yi 2'ye bölmek 6mo verir. 41'i 4'e bölmek 10d verir. 12 Mayıs 1959'a 6 ay, 10 gün eklendiğinde, Ay paralel Venüs'ü verir.*p*22 Kasım 1959.

13. Ay paralel Yükselen.*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 1° 55' (Artan) meyilli hareket etmesi gerekir.*r*16 5 06). Sapma ile Ay (a) 2° 51' hareket eder. Bunu 12'ye bölmek ayda 14' verir. 8 ayda Ay 1° 52' hareket eder. Bu, 30 günün 3' 3/14'ünü bırakır ve 6 gün verir (Ay günde 14'ten fazla hareket ettiğinden logaritmalar kadar kesin değildir).

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .9254. (b) 1.0977, günlük olan .1723'ü verir. (d) 16h 08m. 16'yı 2'ye bölmek 8mo verir. 8'i 4'e bölmek 2d verir.

12 Mayıs 1959'a kadar bulunan 8 ay, 2 gün eklendiğinde, Ay paralel Yükselen'i verir.*r*14 Ocak 1960.

14. Ay Üçgeni Merkür*r*: Bu açıya ulaşmak için Ay (b) 9° 50' hareket etmelidir. 8 ayda Ay 9° 44' hareket eder. Bu 6' bırakır. 30 günün 6/73'ü 2 gün verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2159. (b) .3875, günlük olan .1716'yı verir. (d) 16h 10m. 16'yı 2'ye bölmek 8mo verir. 10'u 4'e bölmek 2d verir. Her iki yöntemle de bulunan 8 ay, 2 gün 12 Mayıs 1959'a eklendiğinde, Ay'ın Merkür üçgenini verir.*r*14 Ocak 1960.

15. Ay'a altmışlık Merkür*p*: Bu açıya ulaşmak için Ay'ın (b) 9° 04' lik bir boşluğu kapatması gerekir. 14° 36' Ay'ın hareketinden 2° 09' Merkür'ün hareketini çıkarmak, günlük kazancı (a) 12° 27' verir. Bunu 12'ye bölmek Ay'ın aylık kazancını 1° 02' olarak verir. 9 ayda Ay 9° 18' kazanır ki bu da 14' fazla olur. 1° 02' 62' dir. 30 günün 14/62'si 7 gün verir. 9 aydan 7 gün çıkarıldığında 8 ay 23 gün elde edilir (Ay ayda 1° 02' den az bir değer kazandığı için logaritmalar kadar kesin değildir).

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2850. (b) .4228, günlük olan .1378'i verir. (d) 17h 28m. 17'yi 2'ye bölmek, 60m kalanla 8mo verir. 28m'ye 60m eklemek 88m verir. 88'i 4'e bölmek 22d verir. 12 Mayıs 1959'a 8 ay 22 gün eklenmesi Ay'a altmışlık Merkür verir.*p*4 Şubat 1960.

-

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

4. Bölüm

Gezegenlerin Başlıca Gelişmeleri

Seri Ders Numarası 113

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

Uçak İçi Hava Durumunuzu Önceden Bilin

Uygun ihtiyati tedbirlerin dayandırılacağı bilgiye sahip olmak için, önümüzdeki birkaç yıl için tüm önemli ilerlemelerinizi her zaman kronolojik sırayla hesaplamalı ve kaydetmelisiniz. Özelliklerin ne zaman mükemmel olacağına dair bu kayıt uygun bir yerde tutulmalı ve sık sık danışılmalıdır.

Bu yönlerin her biri kendi bir derece etkili küre içine girmeden önce, aynı zamanda bir derece mükemmellik içinde geldiği kesin tarihi de hesaplamalı ve belirlemelisiniz. Mükemmel görünümden bir derecede, bu şekilde belirtilen iç düzlem hava durumu, görünüm mükemmel olduğu zamankinin yarısı kadar güçlüdür, görünüm mükemmel olana kadar gücü artar, sonra görünüm mükemmelliği bir derece geçinceye kadar azalır. yine tepe gücünün yarısına sahiptir. Mükemmelden bir derece önce veya sonra, etkisi ihmal edilebilir. Ancak tüm süre boyunca bir derece mükemmellik içindedir, ihtiyati tedbirler alınmalıdır.

Her önemli ilerlemenin bir derece etkili küre içinde olduğu dönemde, dört terminalinden birini oluşturan küçük ilerlemeli yönler gücünü güçlendireceği zaman, bir veya iki ay öncesinden haberdar olmalısınız. bir derece mükemmellik içinde oldukları zaman - ve o zaman büyük-ilerlemiş yönün karakterine sahip bir olayı çekmeyi daha olası hale getirir. Böyle bir güçlendirici enerji varken, özel önlemler alınmalıdır.



Branşlar: Doğum Haritası 318
24 Kasım 1920, 18:00 CST. 95W. 39N.
LD 24 Mayıs 1920. MM eksi 2S 23° 57'.

Dış çemberdeki ana ilerlemeler 24 Mayıs 1941 içindir.

25 Haziran 1933	Venüs Satürn Üçgeni*p*. Venüs
29 Eylül 1936	kavuşumu Mars*r*. Güneş
27 Kasım 1937	karşıtlığı Doç.*r*. Merkür kare
29 Ağustos 1938	Uranüs*p*. Venüs
19 Ağustos 1939	sesquisquare Jüpiter*r*. Mars
8 Nisan 1941	karşıtlığı Neptün*r*.



Branşlar: Doğum Haritası 3a
28 Haziran 1920, 12:23 CST. 89W. 40:40K.
LD 22 Mart 1920. MCC eksi OS 5° 32'.

Dış çemberdeki ana ilerlemeler 22 Mart 1937 içindir.

1 Ocak 1924	Merkür Uranüs ile kavuşum*r.*
31 Aralık 1934	Güneş kare kare Uranüs*r.*
22 Mart 1935	Satürn kare Ay*r.* Güneş yarım
24 Ağustos 1936	kare Satürn*r.* Venüs üçgen Ay
5 Haziran 1947	*r.* Merkür kavuşumu Jüpiter*r.*
28 Kasım 1977	

4. Bölüm

Gezegenlerin Başlıca Gelişmeleri

İlerlemiş bir görünümde yer alan gezegenler tarafından belirtilen iç düzlem hava türünden YAN, her bir görünüm, etkilediği düşünce hücrelerinin kullanılmasına neden olma eğiliminde olan hava durumunu gösterir. veçhenin anahtar kelimesi ile belirtilen ayırt edici eğilime doğru hayata gelen düşünceleri, davranışları ve olayları etkilemek için psikokinetik güçleri. Venüs veya Jüpiter'i içeren kavuşum, paralel ve kavuşumsuz olumludur, Mars veya Satürn'ü içeren olumsuzdur ve bu dört gezegenden birini içermeyen nötrdür. Herhangi iki gezegen arasındaki üçgen, altmışlık ve yarısekstil olumludur, ancak karşıtlık, kare, yarım kare ve seskikare elverişsizdir. Bu nedenle, ilerlemiş yön, iç düzlem enerjisinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu olumlu olarak gösterir.

Ancak bu şekilde etkilenen düşünce hücrelerinin, psikokinetik güçlerini hayata şanslı ya da talihsiz olayları getirmek için kullanıp kullanmayacakları, nasıl hissettiklerine bağlıdır. Doğum haritası uyumu ya da uyumsuzluğu ya da doğumlarından beri kendilerine verilen uyum ya da uyumsuzluk yoluyla, olumlu ya da olumsuz olan olayları ve koşulları arzulamak için yeterince güçlü bir şekilde koşullandırıldılarsa, iç düzlem hava durumunun etkisi gelişmiş bir yön tarafından haritalanır. olmayabilir

bu arzuyu değiştirmek için yeterince güçlü olun. Ve bu durumda, iç düzlemdeki hava, düşünce hücrelerinin, ilerleme yönü tarafından yaygın olarak belirtilenin tersine talihli bir olayı hayata geçirmesini sağlamak için enerjiyi sağlayabilir.

Her gezegen tipinin düşünce hücreleri, yapıcı düşünceler ve davranışlar yoluyla veya yıkıcı düşünce ve davranışlar yoluyla karakteristik olarak ifade edebilir. Enerjilerinin yapıcı düşünce ve davranışlarına kanalize edilmesi, onların yıkıcı düşünce ve davranışlarını etkileme güçlerini azaltır. Ve bireyin başına gelenler, genellikle, gezegene özgü düşüncelerin zihnine girdiği ölçüde ve gezegeni içeren herhangi bir gelişmiş veçhe altında, uyumlu olsun, olmasın, gezegene özgü eylemlerin olduğu ölçüde, yaptıklarından belirgin bir şekilde etkilenir. tarafsız ya da uyumsuz, yapıcı ifadesinin tipik olduğunu görmek bilgeliğin bir parçasıdır.

Onunla çakışan olayın veya durumun kaderini veya talihsizliğini belirleyen şeyin, bir bakış açısıyla haritalanan iç düzlem hava durumu olmadığını akılda tutmak önemlidir. Bunun yerine, iç düzlem hava koşullarından yeni enerji alan düşünce hücrelerinin arzularıdır. Ve eğer ahenkli düşünce ve duyguyla onlara yeterince uyum eklenebilirse, herhangi bir iç düzlem havası veya dış düzlem koşuluna rağmen, talihli olaylar için çalışacaklardır. Düşünce hücrelerinin arzularını yenilemek için zihinsel panzehirleri, dönüştürme ve toplama güçlerini uyumlu bir şekilde kullanmanın ayrıntıları Bölüm 8 (Seri Ders 110), Kurs XI, *Burç Tanımlamak*.

Ancak düşünce hücrelerinin psikokinetik gücü, ortalama olarak, hayata gelen olayları belirleyen etkinin sadece yarısı kadardır. Fiziksel çevre genellikle eşit derecede önemlidir. Fiziksel çevre öyle olabilir ki, ilerlemiş bir görünüm oluştuğunda düşünce hücreleri istedikleri olayı hayata geçirmek için sadece biraz psikokinetik enerji harcamaya ihtiyaç duyarlar ya da herhangi bir miktarda psikokinetik enerji istedikleri olayı getiremeyecek kadar olabilir. hayat. Olan şey, arzu ettikleri şey için çalışan düşünce hücrelerinin psikokinetik gücünün münhasır sonucu değildir ve fiziksel çevrenin münhasır sonucu değildir. Fiziksel çevrenin bu güce karşı direncini taşıyan psikokinetik gücün cebirsel toplamıdır. Bu nedenle önlem alırken, Eğer düşünce hücrelerinin arzu ettiği şey aynı zamanda bireyin arzu ettiği şeyse, fiziksel ortamı düzenlemek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır, böylece arzu ettikleri olayı veya koşulu hayata geçirmek için minimum psikokinetik enerji kullanmak zorunda kalacaklardır. Ancak düşünce hücrelerinin arzu ettiği şey, bireyin arzu etmediği şeyse, fiziksel çevreyi, ne kadar psikokinetik enerji verirlerse getirsinler, arzu ettikleri olay veya koşulu hayata geçiremeyecekleri şekilde düzenlemek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. .

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler Güneş

Aksi belirtilenden daha şanslı bir olayı çekmek için, ilerlemiş açı tarafından haritalanan yıldız havasının her iki ucundaki astral bedendeki düşünce hücrelerinin, gezegen tarafından üretilen enerjiyi alması gerekir.

bu enerjiyi uyumsuz açı tarafından haritalanan hava üzerinden gelen gezegensel enerjiyi hissettiklerinden daha canlı hissedecekleri kadar büyük ve ahenkli gönüllü düşünce ve hisler. Ve Güneş terminaline ulaşmak ve onun düşünce hücrelerini uyumlu bir şekilde etkilemek için, bu düşünce ve duygular, haysiyet, cesaret, sakin özgüven, kontrol ve dayanıklılık düşünceleriyle ilişkilendirilmelidir.

Güneş'i içeren olumsuz gelişmeler olduğunda, bireyin işleri şekillendirme gücü, bu kontrol eden düşünce hücreleri arasında karıştırılan uyumsuzluk tarafından zayıflama tehlikesi altındadır. Ve bu düşünce hücreleri sinir akımlarıyla yakından ilişkili olduğundan ve vücudun elektriksel canlılığını sağladığından, eğer buna izin verilirse, etkilerini yaşamın başka bölümlerine genişleten Toplayıcı Güçler haline gelebilirler. Güneş'i içeren yön.

Eğer açı negatif bir gezegeni içeriyorsa, pozitif olan ve dolayısıyla haysiyet, özsaygı, cesaret, kontrol ve dayanıklılık düşünceleriyle uyumlu bir şekilde ilişkilendirildiğinde, güneş dinamiğinin hayati enerjisinin tükenmesini önleme eğiliminde olan düşünceler ve eylemler geliştirilmelidir. yapı. Ancak açı, olağandışı genişleme ve harcama eğiliminde olan bir gezegeni içeriyorsa, akılda haysiyet, özsaygı, cesaret ve dayanıklılık düşünceleriyle uyumlu bir şekilde tutulması gereken düşünceler, kasıtlı kontrol ve sakin güven olmalıdır.

Erkek cinsiyle ilgilenmeye, siyasi etkilere, makamdaki bir üsttekilerin tutumlarına, onur ve özsaygıyı etkileyen şeylere ve özellikle yaşamın bölümlerini etkileyen şeylere olağandışı özen gösterilmelidir.

Güneş'in ve açıya dahil olan diğer gezegenin bulunduğu evler.

Umursama derken, korkuyu kastetmiyorum. İnsan deneyimlerinin en feci olanlarından biri, ortaya çıkabilecek ve buna rağmen devam edebilecek herhangi bir koşulla yüzleşmek konusunda isteksiz olmaktır.

Sadece, aynı tür şeyleri başarılı bir konuya getirmek için geleneksel olandan çok daha fazla öngörü, beceri ve inisiyatif gerektiğini kastediyorum. Belki de böyle bir inceleme, bazı girişimlerden vazgeçme veya bir şeyi daha ileri götürmeden bir kayıp olarak silme kararını getirecektir.

Güneş'in doğal bir zihinsel panzehiri yoktur, ancak Dini düşünceler, Güç düşünceleriyle birlikte tutulduklarında alışılmadık derecede güçlüdür. Bu şekilde akılda tutulmak üzere seçilen düşünceler ne olursa olsun, aynı zamanda güç, güven ve ortaya çıkan her türlü durumla başa çıkma yeteneği düşünceleri, bir coşku parıltısıyla tutulmalıdır. Alınan gezegensel uyumsuzluğa karşı koymak için güvenilmesi gereken onların uyumudur.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler ay

Çünkü doğum haritasında Ay ve ilerlemiş Ay tarafından haritalanan astral bedendeki düşünce hücreleri, yapının gücünü belirleyen ve sinir akımlarını etkileyen elektromanyetik formun manyetik enerjileri ile doğrudan temas halindedirler. Ay ile ilgili yönler alışılmadık derecede önemlidir. Fırsat verilirse, kişinin etkilerine hissederek yanıt vermesi yoluyla, diğer geçici yıldız antenlerine ulaşan kolayca Toplanma Kuvvetleri haline gelirler.

ve onların üzerinden astral bedenin diğer bölümlerine akmak, yaşamın birçok bölümü üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

Ay'ın haritasını çıkardığı dinamik yıldız yapısını esas olarak oluşturan düşünce hücrelerinin kökenleri ev yaşamıyla ilgili deneyimlere dayanmaktadır. Zayıflara ve çaresizlere, sıkıntıda olanlara sempati ve evin korunması ve aileye bakma ile ilgili dürtüler ve daha geniş bir anlamda her yerde daha az şanslı olan insanlara özen gösterilmesi, hatta bitki ve hayvanlara özen gösterilmesi. , astral beden içindeki Ay dinamik yapısının düşünce hücrelerine doğrudan ulaşan duygu türüdür. Bu nedenle, amacı bu yıldız hücrelerine gezegenlerden gelen uyumsuz enerjinin yerini değiştirecek kadar uyumlu enerji vermek olan herhangi bir düşünce, bu tür sempatik duygularla ilişkilendirilmelidir.

Genel olarak uyumlu düşünme ve duygu, çünkü bir terminalde Ay dinamik yapısına sahip olan geçici yıldız anteni, alıma çok açık olduğundan, bu tür bir arzu ve başkalarının refahına hizmet etme çabası ile ilişkilendirilirse, uyumsuzluğu düzeltme eğilimindedir. Ay'ı içeren ilerlemiş açı. Ancak bu amaç için en etkili düşünce ve duygular, doğal panzehir olan Mars'ın yönettiği Agresif tiptedir.

Mars düşünce ve duygularını uygularken, bunların yıkıcı eğilimlerden çok yapıcı eğilimleri ifade etmesine özen gösterilmelidir. Ay'ı içeren ilerlemiş bir açıdan alınan enerjiler olumsuzluğa, alıcılığa ve duyguya yönelir. Agresif düşünceleri başarılı bir şekilde uygulamak için olumlu duygu

yapıcı çalışma, başkalarının korunması ve refahı ile bağlantılı olarak sürdürülmelidir.

Tahriş, öfke ve diğer uyumsuz düşünceler, yalnızca Yurtiçi düşünce hücrelerine artan uyumsuzluk ekler. Olumsuzluk ve hayal kırıklığı hissi de aynı şekilde. Ancak olumlu ama yapıcı bir tutum sergilenirse ve çabalar zayıf veya daha az şanslı olanlara yardım etmeye veya onları korumaya yönelikse, bu uyumlu düşünce enerjileri Evsel düşünce bileşimini yıldız hücrelerinin çalışacağı bir bileşime dönüştürecektir. şanslı olayları çekmek için iç düzlem.

Ay'ın sağlığı, kadınlarla ilişkiler, halkla ilişkiler, zihnin tutumu ve Ay'ın ve açıya dahil olan diğer gezegenin ev konumunun gösterdiği şeylere ilişkin olumsuz gelişmelerde özel dikkat gösterilmelidir.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler

Merkür

Merkür'ün yanı sıra Güneş ve Ay'ı içeren gelişmiş yönler, elektromanyetik form ve sinir akımları ile yakın temasta olan yıldız hücrelerine enerji katar. Sinir akımları büyük ölçüde Merkür'ün yönettiği nesnel düşünceler tarafından yönlendirilir. Ve bu düşüncelerin doğal işlevi, sinir sisteminin elektrik enerjilerini, böylece dikkat çeken düşüncelere karşılık gelen frekansta geçici olarak ayarlamaktır. Bu nedenle, Merkür'ün enerjileri, yalnızca geçici evrenin uçlarındaki düşünce hücrelerini etkilemek için değil, Güneş veya Ay'ınkiler kadar güçlü bir şekilde Toplanma Kuvvetleri olarak hareket eder.

görünüşe göre haritalanmış yıldız anteni, aynı zamanda mevcut olabilecek diğer geçici yıldız antenlerinin terminallerine girme yollarını bulmak ve enerjilerini eklemek için.

Merkür'ü içeren ileri düzey yönler, düşünmeye yoğunluk ve hacim verme eğilimindedir. Bu düşünce belirli bir süre boyunca çok yoğun olduğunda veya hoş olmayan koşullarla ilgili olduğunda, sinir sisteminde büyük bir gerginliğe neden olur ve geçici yıldız hava uyumsuz enerjisinin terminallerindeki düşünce hücrelerine talihsiz olayları çekmelerini sağlayan geçici hava uyumsuz enerjisi verir. hayat.

Merkür'ün işgal ettiği ev ve açıya dahil olan diğer gezegenin işgal ettiği ev, o gezegenin doğası ile birlikte düşünme türünü belirler. Genellikle aynı düşünce dizisi veya benzer bağlamdakiler tekrar tekrar düşünülür. Zihinsel enerjiyi bu şekilde boşa harcamak yerine, mevcut sorun ne olursa olsun iyice düşünülmeli ve ardından dikkat başka bir şeye çevrilerek reddedilmelidir.

İyi fikirler ve değerli keşifler genellikle Merkür'ü içeren olumsuz bir ilerleme yönü altında gelir ve olumlu bir ilerleme yönü altında yapılabileceği gibi, çalışma, yazma veya diğer zihinsel uğraşlarda iyi bir ilerleme, Merkür'ü içeren olumsuz bir ilerleme yönü altında yapılabilir. Ancak fikirler dile getirilirse, yazı yayına sunulursa veya başka kişilere güvenilirse, anlaşmazlığın etkisi çabucak ortaya çıkar.

Merkür'ü içeren olumsuz bir ilerleme altında, yalnızca hoş olan ve bir amaca doğru ilerleyen düşüncelere izin verilmelidir. Büro ve diğer hatalar ve

küçük hatalara karşı önlem alınmalı ve imzalanan herhangi bir belgenin tam anlamı konusunda özel dikkat gösterilmelidir. Başkalarına söylenenler de yanlış yorumlanabilir.

Doğal panzehir ve dolayısıyla böyle bir zamanda Entelektüel faaliyetlerle ilişkilendirilecek en iyi düşünce türü Dini düşüncelerdir. Bu, kişinin dine dönmesi gerektiği anlamına gelmez; ancak Jüpiter'in her şeyin istendiği gibi olacağına dair iyimserliği ve güveni geliştirilmelidir. İnsan zekasının elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra insan zekasından daha yüksek bir güce güvenmek, Merkür'ün en güçlü biçimde etkilediği düşünce hücrelerine uyum katan bir tutumdur.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler Venüs

Venüs'ü içeren ilerlemiş yönler, duygulanımlarla ilgili düşünce hücrelerine enerji ekler ve eğer bu enerji uyumsuzsa, bu şekilde psikokinetik güç verilen düşünce hücreleri, var olanlar aracılığıyla hayal kırıklığına ve kedere neden olan olayları hayata getirir veya karşı karşıyadır. arzu edilen, bir bağlılık bağı olmalıdır.

Venüs'ü içeren elverişsiz bir ilerleme altında, gerçek veya hayali, küçümsemeler ortaya çıkma eğilimindedir. Belki de kimsenin üzerinde kontrol sahibi olmadığı olaylar, şimdilik keder ve duygu uyandıran koşullara neden olacaktır. Birey böyle bir dönemde küçümsemelere ne kadar az dikkat ederse o kadar iyidir. Kasıtlı olsun ya da olmasın ve kaçınılmaz koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Venüs'ün uyumsuzlukları duygusal tedirginlik üzerinde gelişir. En iyi prosedür,

bu nedenle, Satürn tarafından yönetilen Güvenlik düşüncelerinin ve ayrıca Güneş tarafından yönetilen Yeterince Güç düşüncelerinin yardımını istemektir.

Koşulların soğuk bir değerlendirmesini yapan ve mantığın egemenliği altında olan ve duygudan oldukça uzak olan Güvenlik düşünceleri, Venüs'ün Sosyal düşüncelerinin doğal panzehiridir. Yani astral bedendeki Sosyal düşünce hücrelerine son derece faydalı bir bileşik oluşumunda en kolay şekilde girerler. Ve ne kadar az duyguya izin verilirse, o kadar az talihsizlik yaşanacağının farkına varmak, bu Güvenlik düşüncelerini uygulamanın kolay bir yoludur. Soğuk bir akılla bu duygu fethinde zevk hissedilmelidir.

Venüs, sanat, müzik ve sosyal hazların yanı sıra neşe ve neşe gezegeni olduğu için, hatırı sayılır bir kararlılığa sahip olan ve duygusal incinmeyi gözden kaçırmak için Güç düşüncelerinin dayanıklılığını ve özsaygısını ortaya çıkarabilen kişi, çoğu zaman hatta Dönüşüme tabi olan Venüs'ü içeren ciddi şekilde elverişsiz ilerlemiş yönler (bkz. Bölüm 8 (Seri Ders 110), Kurs XI, *Burç Tanımlamak*) ve böylece onlardan çok fayda elde edin.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler
Mars

Mars'ı içeren ilerlemiş bir açı, bir kaza meydana geldiğinde ve bir enfeksiyon bulaştığında ve acele ve çekişme gezegeni olduğu için, tehlike ve enfeksiyona en az maruz kalan ve acele ve çekişmeden daha fazla kaçınıldığı için her zaman mevcuttur. , sebep dahilinde, daha iyi.

Çoğu zaman, böyle bir anlaşmazlık altında, kendini koruma önlemlerinin gerekli olduğu bir şekilde bir kavga verilir.

Mars'ın olumsuz bir gidişat içinde olması nedeniyle hasta bir kişinin ameliyat olmaması gerektiğini söyleyemeyiz. Nadiren değil, böyle bir operasyon hayat kurtaracak tek önlemdir. Ve Mars'la ilgili olumlu ya da olumsuz bir ilerleme durumu, cerrahi bir operasyon sırasında her zaman mevcuttur. Mars'la ilgili olumsuz bir duruma sahip bir kişinin savaşmayı reddetmesi gerektiğine dair genel bir kural da koyamayız, çünkü haklarının ihlalini önlemenin tek yolu bu olabilir. Ancak koşullar operasyonun ertelenmesine izin veriyorsa ve birey çok büyük bir fedakarlık yapmadan bir kavgadan kaçınabiliyorsa, bu tür güçlükleri çözmek için daha elverişli gelişmiş yönleri beklemek daha iyidir.

Mars'ın dahil olduğu olumsuz gelişmelerde tehlikeden kaçınmak daha iyidir; ama eğer tehlike gelirse, çoğu zaman olduğu gibi, onunla cesaretle, kararlılıkla ve sakinlikle yüzleşmek, onun etkisini azaltmanın en iyi yoludur. Makineler ve mekanik düzenekler, normalden daha kolay bozulabilir veya bozulabilir. Yangın tehlikeleri artar ve çok büyük enerji harcamaları tehdit eder.

Acele, dürtü ve çok büyük faaliyetlere karşı korunmalıdır. Ancak Mars Sosyal bir gezegen olduğundan, insanlarla ilişkiler daha da yaygın olarak bir zorluk kaynağıdır. İzlenecek tek doğru yolun çekişme olduğuna sükûnetle karar verilmedikçe, gücendiren ya da çekişmeye yol açacak şeyleri söylememeye ya da yapmamaya özen gösterilmelidir.

Agresif düşünceler o kadar spontane bir şekilde zihne geleceğinden, onlarla başka düşünceleri ilişkilendirmek için özel bir çaba gerekli değildir. Evsel düşünceler doğal panzehirdir ve onları uygulamanın en iyi yolu, zayıf ve sıkıntıda olanlara yardım etmek için mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde ilgilenmektir. Bu annelik tutumu ve ondan kaynaklanan eylemler, yeterince teşvik edilirse, içlerinde zevk hissedilirse, daha şanslı bir bileşik oluşturmak için astral bedendeki Saldırgan düşüncelerle birleşecek olan düşünce öğelerini oluşturacaktır. Başkalarına yardım etme gibi düşünceler ne kadar uyumsuz çekişme düşüncelerinin yerini almaya meylederse, gelişmiş yön tarafından çekilecek olan olaylar o kadar olumlu olur. Mars'ın altında, iç düzlem havası sabrı geliştirin ve sakin olun.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler
Jüpiter

Kendini beğenmişlik, savurganlık, akılsız iyimserlik, aşırı cömertlik, maliyeti hesaba katma isteksizliği ve yersiz ticari genişleme, Jüpiter'in dahil olduğu olumsuz bir ilerlemenin çekme eğiliminde olduğu başlıca şeylerdir.

Bütün bunlar, durumun dikkatli bir şekilde analiz edilmemesi, şansa veya başkalarının görüşlerine veya başkalarının iyi niyetlerine güvenmekten kaynaklanmaktadır. Bazen kişinin dini görüşlerini sunamayacak kadar büyük bir coşkusu bile zorluklara neden olabilir.

Ancak Jüpiter'i içeren gelişmiş bir yönün getirdiği uyumsuzluk ne olursa olsun, temelde Zeka eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Jüpiter'in ve açıya dahil olan diğer gezegenin ev konumu, yaşamın bölümlerini gösterir.

başlıca etkilenen; ancak genel olarak, Jüpiter bir İş gezegeni olduğu için, finans konusuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Ve en çok ihtiyaç duyulan dikkat türü, girilen her işlemi, özellikle de ilerleme yönü tarafından belirtilenleri, en muhafazakar yöntemlerle dikkatlice analiz etme ve değerlendirme zevkini geliştirmektir.

Entelektüel düşünceler, Jüpiter'in ilerlemiş yönleri tarafından aktivite verilen düşünce öğelerinin doğal panzehiridir; Aklı ve özeni faaliyetlere tatbik etmekten zevk almak, onları talihli olayları cezbedecek bir bileşime dönüştürmenin en iyi yöntemidir.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler
Satürn

Satürn'ün dahil olduğu olumsuz bir ilerleme altındaki düşüncelerin eğilimi, olayların karanlık tarafına bakmaktır. Geçici yıldız anteninin uç noktalarındaki düşünce hücreleri tarafından alınan gezegensel titreşimler ağır, suratsız, ben merkezlidir ve yüzdürme ve esneklikten yoksundur; bu hücrelere istek, sorumluluk ve kayıp çekmek için içsel düzlemden çalışmalarına neden olan bir duygu vermek.

Bu titreşimler olumsuzdur ve bu olumsuzluğu düzeltmek ve korku, çekingenlik ve endişe eğiliminin gelişmesini önlemek için, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık düşüncelerine sahip olarak Güneş'in Güç düşünceleri geliştirilmelidir. Ancak daha da fazla yararı, Satürn'ün Güvenlik düşüncelerinin doğal panzehiri oldukları için, Sosyal düşünceleri teşvik etmek için bilinçli bir çaba gösterilmelidir.

Çıkarları, olumsuz korku yerine olumlu eylem yoluyla korumak, Satürn'ün dahil olduğu rahatsızlıklarda sıklıkla gereklidir. Yani, görünümün bir derece etkin küre içinde olduğu süre boyunca, Satürn'ün dahil olduğu olumsuz bir ilerlemeden etkilenen yaşam bölümlerini faaliyete sokmak genellikle akıllıca değildir; daha ziyade şimdilik diğer ve daha az uyumsuz çıkarlara yönelmek.

Satürn düşünceleri ısrarla mevcut olduğundan, kişiliği ağırlaştırdığından, geliştirilebilecek diğer düşünce ve duygularla ilişki kurmalarını sağlamak için özel bir çabaya gerek yoktur. Yine de sosyal temaslar ve diğer Venüs etkinlikleri, Venüs'ün kaygısızlığı ve neşesi deneyimlenmedikçe hiçbir değeri yoktur. Görünüşte her şey alt üst olurken ve hatta sosyal sıkıntılar ve maddi kayıplar söz konusu olduğunda, insanlarla kaynaşmak, dans etmek, şarkı söylemek, sinemaya gitmek, eğlenmek ve sanattan ve sanattan keyif almak büyük bir metanet gerektirebilir. müzik. Ancak Satürn mavilerini uzaklaştırmak için daha iyi bir şey yoktur ve Güvenlik düşünce bileşenlerine, onları iyi talihi çeken dinamik bir yıldız bileşimine en kolay şekilde dönüştürecek şekilde mutlu düşünce öğeleri eklemek için daha iyi bir şey yoktur.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler Uranüs

Uranüs, Merkür'ün oktavı olarak, sinir akımları yoluyla elektromanyetik forma doğrudan erişime sahiptir; ve uyumsuzlukları, sinir sisteminde alışılmadık derecede yüksek gerilime ve elektromanyetik enerjinin tükenmesine neden olur. İçinde

özellikle, hipnotik etki, zihinsel etki veya yanlış yere güven yoluyla yaşam üzerinde tamamıyla çok fazla kontrol sahibi olan, özellikle böyle zamanlarda genellikle kazanan insanların dış etkilerine kapı açar.

Bu kabul edilirse, Uranüs'ü içeren gelişmiş açılar altında yapılan bağlanmaların nadiren kalıcı olduğu ve bu etkinin getirdiği bu tür talihsizliklerin bir şekilde bir insan gücünden kaynaklandığı kabul edilirse, bireyin zorluklara karşı korunmasını sağlayacaktır. Uranüs'ün dahil olduğu gelişmiş açılar altında gerçekleşen ani ve beklenmedik olandır.

Radyolar, otomobiller ve karmaşık makineler gibi yeni icatlar, özellikle bir şekilde elektriğe bağlı olanlar, Uranüs'ün dahil olduğu elverişsiz ilerlemeler altında devre dışı kalma eğilimindedir. Böyle bir ilerleme sırasında yapılan tüm ekler belirli çekincelere tabi olmalıdır. Yine de astrolojide ve okült bilimlerde mükemmel ilerleme, bu gezegenin dahil olduğu ağır olumsuz ilerleme yönleri altında bile yapılabilir. Uranüs'ü içeren bir yön, yeni bilgiler edinmeyi desteklemektedir; ve bu tür yeni bilgilerin bir sonucu olarak bakış açısı sıklıkla değişir.

Olumsuz bir Uranüs için doğal panzehir, olumsuz Merkür ile aynıdır. Uyumsuz bir Merkür'ü etkisiz hale getirmek için Dini düşüncelerin uygulanması konusunda söylenenler, Uranüslü bir düşünce bileşimini daha şanslı bir eğilime dönüştürmek için eşit güçte geçerlidir.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler Neptün

Neptün'ün dahil olduğu olumsuz bir ilerleme, aşağıdakilerle aynı Güvenlik düşüncelerinin geliştirilmesini gerektirir.

oktavı Venüs için yazılmıştır. Ancak buna ek olarak, çok daha olumsuz ve hassas olduğu için, Güç düşünceleri daha da fazla dikkate alınmalıdır. Cesaret, dayanıklılık, pozitiflik ve kararlılık, Neptün'ün titreşimlerinin teşvik ettiği küçülen duyarlılığı ve hayal gücünü dengelemek için özellikle gereklidir.

Bu tür uyumsuzluk, bireyin zararına çalışan şemaları cezbetme eğilimindedir. Hayali avantajlar alışılmadık derecede çekici görünür ve kayıplara neden olabilir. Öte yandan, hayali tehlikeler rahatsız edebilir ve onları kovmak için yeterli Güç düşüncelerini gerektirebilir. Psişik konular, yeni alışkanlıklar, hatta ilaçlar kişiyi köleleştirme eğiliminde olabilir ve zehir sağlığı etkileyebilir; yine de Neptün'ü içeren oldukça olumsuz gelişmelerde bile müzikte, kurgu yazılarında veya dramatik çalışmalarda iyi ilerleme kaydedilebilir.

Bu ek düşüncelerle, Venüs'ün dahil olduğu olumsuz ilerlemeler altında söylenenler, Neptün'ün dahil olduğu olumsuz gelişmeler için eşit güçte geçerlidir.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler

Plüton

Görünüşe göre Ay'ın Yurtiçi düşünceleri, toplumu bir bütün olarak kucaklamak için oktav ifadesinde, Pluto'da genişletildi. Ay'ın oktavı olarak, Plüton'un titreşimleri sinir akımlarına hazır erişime sahiptir ve diğer gezegensel etkilerden daha kolay bir şekilde organizmayı her iki düzlemin zekaları tarafından yayılan düşüncelere ayarlar.

Pluto'nun daha iyi yanı, Soul Mates ile ilgisi var; ve ayrılık nedeniyle zayıflık ile olumsuz tarafında. Olumsuz bir ilerleme sırasında olağandışı ayrımcılık gereklidir

Pluto'nun faaliyeti, her iki uçağın da suç dünyası ile temasından kaçınılması, kaçırılması veya görünür veya görünmez haraççıların aracı haline gelmesi, özel olarak korunmalıdır. Bu tür şeyler bazen fark edilmeden az da olsa mevcuttur. Niteliği şüpheli gruplarla ilişki kurmaktan ve zorlamaya yol açabilecek durumlardan kaçınılmalıdır.

Saldırgan düşünceler, doğal panzehirler olarak, Plüton'un dahil olduğu olumsuz gelişmeler altında, Ay'ın dahil olduğu olumsuz gelişmeler için savunulan şekilde tam olarak aynı şekilde uygulanmalıdır.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler MC

MC'yi içeren ilerlemiş bir görünüm, gezegen tarafından haritalanan dinamik yıldız yapısı ile bu yayın istasyonu arasında geçici bir yıldız anteni oluşturur. Alınan başlıca enerji, ilgili gezegeninkidir. Bu nedenle, bu gezegen olumsuz gelişmeler içindeyken ne yapılması gerektiği başlığı altında verilen talimatları uygulayın ve orada belirtilen düşünceleri mümkün olduğunca onur, iş ve tanıtım ile ilgili düşüncelerle uyumlu bir şekilde ilişkilendirin. Ve davranışın ve fiziksel ortamın, MC düşünce hücrelerinin hayata olumsuz bir tanıtım, konum kaybı veya iş sıkıntısını getirmek için gösterdikleri her türlü çabaya mümkün olduğunca fazla direnç göstermesini sağlamak için özen gösterin.

Olumsuz İlerlemeler Altında Yapılması Gerekenler Asc.

Asc'yi içeren gelişmiş bir yön. gezegen tarafından haritalanan dinamik yıldız yapısı ile bu topraklama kablosu arasında geçici bir yıldız anteni oluşturur. Alınan başlıca enerji, ilgili gezegeninkidir. Bu nedenle, bu gezegen olumsuz gelişmeler içindeyken ne yapılması gerektiği başlığı altında verilen talimatları uygulayın ve burada belirtilen düşünceleri sağlık, kişilik ve kişisel ilişkilerle ilgili düşüncelerle mümkün olduğunca güçlü ve uyumlu bir şekilde ilişkilendirin. Ve beslenme dahil olmak üzere davranış ve fiziksel ortamın, Kurs XVI'da belirtildiği gibi Doğum Haritası Sabitleri ve İlerleyen Sabitler gibi fiziksel hastalıklar için uygun önleyici eylemler olduğunu görmek için özen gösterin,*yıldız şifa*, zamanda muhtemelen gelişebileceğini gösterir.

Büyük-İlerlemiş Gezegenler Tarafından Yapılan Yönleri Hesaplama

Gezegenleri içeren majör-ilerlemiş açılar, örnekleri Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen Güneş'in majör-gelişmiş açıları ile tamamen aynı şekilde hesaplanır ve Ay tarafından yapılan majör-gelişmiş açılar, örnekler bunlardan Bölüm 3'te verilmektedir (Seri Ders 112).

Ve bir görünümün bir derece etkin küre içinde hareket ettiği ve bu nedenle ilk önce bir etkiye sahip olmaya başladığı zaman ve bir görünümün bir derece etkin küreyi geçtiği ve dolayısıyla etkisini kaybettiği zaman tam olarak aynı şekilde hesaplanır. yolu, ancak kapatılacak boşluk

mükemmel görünümden bir derece önceki veya bir derece sonraki konumla gösterilir.

AYIN KESİNLERİ: Orana göre çalışma ilerlemelerinde, genellikle güne dönüştürülecek bir ayın küçük bir bölümü vardır. Bunu yapmak için payı 30 ile çarpın ve ürünü paydaya bölün. Dolayısıyla aşağıdaki örnek 1'de 21/73 ay vardır. 21 ile 30'u çarpmak 630 verir. 630'u 73'e bölmek 9 gün verir.

Aşağıdaki örneklerin tümü, 100. sayfada verilen Çizelge 3a ile ilgilidir. Çizelge 28 Haziran 1920, 12:23 CST için oluşturulmuştur. 89W. 40:40K. EGMT artı 6h 23m'dir. Sınırlı Tarih 22 Mart 1920'dir.

Örnek 1. Venüs altmışlık Satürn*r*: Efemeris tarihi 30 Haziran 1920, Venüs (b) açıyı 20' geride ve her gün (a) 1° 13' veya 73' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 20'yi (c) 12 (ay) ile çarpmak 240 verir. 240'ı (a) 73'e bölmek (d) 3 21/73 ay veya 3 ay 9d verir. 30 Haziran 1920, LD ve dolayısıyla Haritadan 2 gün sonradır. D. 1922 için. 22 Mart 1922'den 3 ay, 9 gün çıkarıldığında Venüs'e altmışlık Satürn'ü verir.*r*13 Aralık 1921. Logaritmalarla, problem Bölüm 1'in 2. sayfasında (Seri Ders 19) ayrıntılı olarak işlenir.

Örnek 2. Venüs altmışlık Satürn uygular*r*bir derece küre içinde: Etkili bir küre derecesine ulaşmak için Venüs 6'ya ulaşmalıdır.) 1° 14' veya 74'. Orantılı olarak, (b) 7'yi (c) 12 ile çarpmak 84 verir. 84'ü (a) 74'e bölmek (d) 1 10/74 ay veya 1 ay 4d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.2891. (b) 2.3133, günlük olan 1.0242'yi verir. (d) 2sa 16dk. 2'yi 2'ye bölmek 1mo verir. 16 ve 4'ü bölmek 4d verir. 29 Haziran 1920, Harita. D. 1921 takvim yılı için. Her iki yöntemde de bulunan 1 ay, 4 gün 22 Mart 1921'den çıkarıldığında, Venüs'ün altmışlık Satürn uygulamasını verir.*r* 18 Şubat 1921'de kürenin bir derecesi içinde.

Örnek 3. Venüs, altmışlık Satürn'ü ayırıyor*r* bir derece küre içinde: Bir derece etkili küreyi bırakmak için Venüs 8'den fazla Yengeç 06 olmalıdır. Efemeris tarihi 1 Temmuz 1920, Venüs 8 Yengeç 40'tır ve bu nedenle (b) gerekli konumu 34' geçiyor ve günlük hareket ediyor (a) 1° 14' veya 74'. Orantılı olarak, (b) 34'ü (c) 12 ile çarpmak 408 verir. 408'i (a) 74'e bölmek (d) 5 38/74 ay veya 5ay 15d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.2891. (b) 1.6269, günlük olan .3378'i verir. 11h 02m. 11'i 2'ye bölmek, 60m kalan 5mo verir. 2m'ye 60m eklemek 62m verir. 62'yi 4'e bölmek 15d verir. 1 Temmuz 1920, Haritadır. D. 1923 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 5 ay, 15 gün 22 Mart 1923'ten çıkarıldığında, Venüs'ün Satürn'ü altmışlık açıyla ayırdığını gösterir.*r* bir derece küre içinde, bundan sonra etkisi ihmal edilebilir, 7 Ekim 1922.

Örnek 4. Venüs kare Mars*p*: Efemeris tarihi 22 Temmuz 1920, Mars 5 Akrep 05 ve Venüs 4 Aslan 30'u ve dolayısıyla (b) 35' kare açıdan gösterir. Venüs her gün 1° 14' hareket ederken, Mars 28' hareket ediyor. Aradaki fark (a) 46' kazancıdır. Orantısal olarak, (b) 35'i (a) 12 ile çarpmak 420 verir. 420'yi 46'ya bölmek (d) 9 6/46 ay veya 9ay 4d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.4956. (b) 1.6143, günlük olan .1187'yi verir. (d) 18h 16dk. 18'i 2'ye bölmek 9mo verir. 16'yı 4'e bölmek 4d verir. 22 Temmuz, LD'den 24 gün sonradır ve dolayısıyla Haritadır. D. 1944 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 9 ay, 4 gün 22 Mart 1944'e eklendiğinde, Venüs kare Mars'ı verir.*p* 26 Aralık 1944.

Örnek 5. Venüs, Mars karesini uygularken*p*bir derece küre içinde: Efemeris tarihi 21 Temmuz 1920, Mars 4 Akrep 37 ve Venüs 3 Aslan 17'yi gösterir ve bu nedenle (b) 20' karenin bir derecelik küresi içinde olmaktan yoksundur. Venüs her gün 1° 13' ve Mars 28' hareket ediyor. Aradaki fark, günlük kazanç (a) 45'. Orantılı olarak, (b) 20'yi (c) 12 ile çarpmak 240 verir. 240'ı (a) 45'e bölmek (d) 5 15/45 ay veya 5 ay 10d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.5051. (b) 1.8573, günlük olan .3522'yi verir. (d) 10h 40m. 10'u 2'ye bölmek 5mo verir. 40'ı 4'e bölmek 10d verir. 21 Temmuz 1920, Harita. D. 1943 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 5 ay, 10 gün 22 Mart 1943'e eklendiğinde, Venüs'ün kare Mars'ı uyguladığını gösterir.*p*kürenin bir derecesi içinde 2 Eylül 1943.

Örnek 6. Venüs, Mars karesini ayırıyor*p*bir derecelik küre içinde: Efemeris tarihi 24 Temmuz 1920, Mars 6 Akrep 01 ve Venüs 6 Aslan 58'i gösterir ve bu nedenle (b) 3' kare görünümün bir derece ötesinde olma özelliğinden yoksundur. Venüs her gün 1° 14' ve Mars 29' hareket ediyor. Aradaki fark, günlük kazanç (a) 45'. Orantılı olarak, (b) 3'ü (c) 12 ile çarpmak 36 verir. 36'yı 45'e bölmek (d) 36/45 ay veya 24d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.5051. (b) 2.6812, günlük olan 1.1761'i verir. (d) 1h 36m veya 96m. 96'yı 4'e bölmek 24d verir. 24 Temmuz 1920, Map.D. 1946 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 24 günü 22 Mart 1946'ya ekleyerek, Venüs'ün Mars'ı ayıran karesini verir.*p*bir derece küre içinde, bundan sonra etkisi ihmal edilebilir, 16 Nisan 1946.

Örnek 7. Satürn altmışlık Plüton*r*: Efemeris tarihi 30 Haziran 1920, Satürn açıyı (b) 1' geride. Satürn her gün (a) 5' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 1'i (c) 12 ile çarpmak 12'yi verir. 12'yi (a) 5'e bölmek (d) 2 2/5 ay veya 2 ay 12d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 2.4594. (b) 3.1584, günlük olan .6990'ı verir. (d) 4h 48m. 4'ü 2'ye bölmek 2mo verir. 48'i 4'e bölmek 12d verir. 30 Haziran 1920, Map.D. 1922 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 2mo 12d'yi 22 Mart 1922'den çıkarmak, Satürn altmışlık Plüton'u verir*r*10 Ocak 1922.

Örnek 8. Venüs kavuşumu MC*r*: Efemeris tarihi Temmuz 4, 1920, Venüs 12 Yengeç 21'dir ve dolayısıyla (b) 7' açıyı geçmiştir. Venüs her gün (a) 1° 13' veya 73' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 7'yi (c) 12 ile çarpmak 84 verir. 84'ü (a) 73'e bölmek (d) 1 11/73 ay veya 1 ay 5d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) Günlükten 1.2950. (b) 2.3133, günlük olan 1.0183'ü verir. (d) 2h 18dk. 2'yi 2'ye bölmek 1mo verir. 18'i 4'e bölmek 5d verir. 4 Temmuz 1920, Harita. D. 1926 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 1 ay, 5 gün 22 Mart 1926'dan çıkarıldığında, Venüs kavuşumu MC'yi verir.*r*17 Şubat 1926.

Örnek 9. Merkür Üçgen Ay*r*: Efemeris tarihi 6 Temmuz 1920, Merkür (b) 5' açıdan yoksun ve her gün (a) 30' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 5'i (a) 12 ile çarpmak 60 verir. 60'ı (a) 30'a bölmek (d) 2mo verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.6812. (b) 2.4594, günlük olan .7782'yi verir. (d) 4h. 4'ü 2'ye bölmek 2mo verir. 6 Temmuz 1920, Harita. D. 1928 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 2 ayı 22 Mart 1928'e ekleyerek, Merkür Ay üçgenini verir.*r*22 Mayıs 1928.

Örnek 10. Merkür kavuşumu Neptün*r*: Efemeris tarihi 10 Temmuz 1920, Merkür (b) 4' açıdan yoksun ve her gün (a) 12' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 4'ü (c) 12 ile çarpmak 48'i verir. 48'i (a) 12'ye bölmek 4mo verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 2.0792. (b) 2.5563, günlük olan .4771'i verir. (d) 8h. 8'i 2'ye bölmek 4mo verir. 10 Temmuz 1920, Harita. D. 1932 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 4 ayı 22 Mart 1932'ye ekleyerek Merkür kavuşumu Neptün'ü verir.*r*22 Temmuz 1932.

Örnek 11. Venüs kare kare Uranüs*r*: Efemeris tarihi 11 Temmuz 1920, Venüs (b) 26' açıyı geçiyor ve her gün (a) 1° 14' veya 74' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 26'yı (c) 12 ile çarpmak 312 verir. 312'yi (a) 74'e bölmek (d) 4 16/74 ay veya 4ay 6d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.2891. (b) 1.7434, günlük olan .4543'ü verir. (d) 8h 26dk. 8'i 2'ye bölmek 4mo verir. 26'yı 4'e bölmek 6d verir. 11 Temmuz 1920, Harita. D. 1933 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 4 ay, 6 gün 22 Mart'tan çıkarıldığında,

1933, Venüs Uranüs'ün kare karesini verir*r*16 Kasım 1932.

Örnek 12. Mars kare Merkür*r*: Efemeris tarihi Temmuz 16, 1920, Mars açıyı (b) 1' geride ve her gün hareket ediyor (a) 26'. Orantılı olarak, (b) 1'i (c) 12 ile çarpmak 12 verir. 12'yi (a) 26'ya bölmek (d) 12/26 ay veya 14d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.7434. (b) 3.1584, günlük olan 1.4150'yi verir. (d) 55m. 55'i 4'e bölmek 14d verir. 16 Temmuz 1920, Harita. D. 1938 takvim yılı için. Her iki yöntemle bulunan 14 günü 22 Mart 1938'den çıkarmak, Mars kare Merkür'ü verir.*r*8 Mart 1938.

Örnek 13. Merkür paralel Mars*p*: Efemeris tarihi Temmuz 18, 1920, Mars 13 S 50 eğime sahip ve günde 10' eğim kazanırken, Merkür 13 N 59 eğime sahip ve günde 5' eğim kaybediyor. Görünüm (b) 9' yoksundur. Eğim ile birbirlerine doğru hareket ederken, 10 ve 5'i toplarız, bu da günlük kazancı (a) 15' olarak verir. Orantılı olarak, (9)'u (c) 12 ile çarpmak 108 verir. 108'i (a) 15'e bölmek (d) 7 3/15 ay veya 7ay 6d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.9823. (b) 2.2041, günlük olan .2218'i verir. (d) 14h 24m. 14'ü 2'ye bölmek 7mo verir. 24'ü 4'e bölmek 6d verir. 18 Temmuz 1920, Harita. D. 1940 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 7 ay, 6 gün 22 Mart 1940'a eklendiğinde, Merkür paralel Mars'ı verir.*p*28 Ekim 1940.

Örnek 14. Merkür paralel Mars uygular*p*bir derece küre içinde: Efemeris tarihi 12 Temmuz 1920, Mars 13 S 21 eğime sahip ve günde 9' eğim kazanıyor ve

Merkür 14 N 23 eğime sahiptir ve her gün 10' eğim kaybeder. (b) 2', bir derece etkili küre içinde olmaktan yoksundurlar. Eğim ile birbirlerine doğru hareket ederken, günlük kazancı (a) 19' olarak veren 9 ve 10'u toplarız. Orantılı olarak, (b) 2'yi (c) 12 ile çarpmak 24 verir. 24'ü (a) 19'a bölmek (d) 1 5/19 ay veya 1 ay 8d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.8796. (b) 2.8573, günlük olan .9777'yi verir. (d) 2h 32m. 2'yi 2'ye bölmek 1mo verir. 32'yi 4'e bölmek 8d verir. 15 Temmuz 1920, Harita. D. 1937 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 1 ay, 8 gün 22 Mart 1937'ye eklendiğinde, Merkür paralel Mars'ı uygular*p*30 Nisan 1937'de kürenin bir derecesi içinde.

Örnek 15. Merkür paralel Mars'ı ayırıyor*p*bir derece küre içinde: Efemeris tarihi 18 Ağustos 1920, Mars 19 S 10 eğimde ve günde 10' eğim kazanıyor, Merkür ise günde 18 N 20 eğimde ve 7' eğim kaybediyor. Eğim ile birbirlerine doğru hareket ederken, günlük kazancı (a) 17' olarak veren 10 ve 7'yi toplarız. (b) 10' paralel yönün bir derece ötesinde olmalarından yoksundurlar. Orantılı olarak, (b) 10'u (c) 12 ile çarpmak 120 verir. 120'yi (a) 17'ye bölmek (d) 7 1/17 ay veya 7 ay 2d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.9279. (b) 2.1584, günlük olan .2305 değerini verir. (d) 14h 7dk. 14'ü 2'ye bölmek 7mo verir. 7'yi 4'e bölmek 2d verir. 18 Ağustos 1920, Harita. D. 1971 takvim yılı için. Her iki yöntemle bulunan 7 ay, 2 gün 22 Mart 1971'e eklendiğinde,

Merkür'ü Mars'ı ayıran paralel verir*p*bir derece küre 24 Ekim 1971.

Örnek 16. Mars üçgen Venüs*r*: Efemeris tarihi 22 Temmuz 1920, Mars (b) 14' açıdan yoksun ve (a) 28' günlük hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 14'ü (c) 12 ile çarpmak 168'i verir. 168'i (a) 28'e bölmek (d) 6mo'yu verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.7112. (b) 2.0122, günlük olan .3010'u verir. (d) 12h. 12'yi 2'ye bölmek 6mo verir. 22 Temmuz 1920, Harita. D. 1944 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 6 ayı 22 Mart 1944'e eklemek, Mars'ın Venüs üçgenini verir.*r*22 Eylül 1944.

Örnek 17. Mars üçgen Güneş*r*: Efemeris tarihi 25 Temmuz 1920, Mars (b) 12' açıdan yoksun ve her gün (a) 29' hareket ediyor. Orantılı olarak, (b) 12'yi (c) 12 ile çarpmak 144 verir. 144'ü (a) 29'a bölmek (d) 4 28/29 ay veya 4ay 29d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) 1.6969 günlükten. (b) 2.0792, günlük olan .3823 değerini verir. (d) 9h 57m. 9'u 2'ye bölmek, geriye kalan 60m ile 4mo verir. 57m'ye 60m eklemek 117m verir. 117'yi 4'e bölmek 29d verir. 25 Temmuz 1920, Harita. D. 1947 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 4 ay, 29 günü 22 Mart 1947'ye ekleyerek, Mars'ın Güneş üçgen açısını verir.*r*21 Ağustos 1947.

Örnek 18. Merkür kavuşumu Merkür*r*: Efemeris tarihi 29 Temmuz 1920, Merkür (b) 2' açıdan yoksun ve her gün (a) 39' geri hareket ediyor. (b) 2'yi (c) 12 ile çarpmak 24 verir. 24'ü (a) 39'a bölmek (d) 24/39 ay veya 18d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.5673. (b) 2.8573, günlük olan 1.2900'ü verir. (d) 1h 14m veya 74m. 74'ü 4'e bölmek 18d verir. 29 Temmuz 1920, Harita. D. 1951 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 18 günü 22 Mart 1951'e ekleyerek, Merkür kavuşumu Merkür'ü verir.*r* 10 Nisan 1951.

Örnek 19. Venüs paralel Satürn*r*: doğum haritası Satürn 10 K 35. Efemeris tarihi 17 Ağustos 1920, Venüs azalan eğimi 10 K 27 ve dolayısıyla (b) 8' açıyı geçiyor ve her gün hareket ediyor (a) 27'. Orantılı olarak, (b) 8'i (c) 12 ile çarpmak 96'yı verir. 96'yı (a) 27'ye bölmek (d) 3 15/27 ay veya 3ay 17d verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.7270. (b) 2.2553, günlük olan .5283'ü verir. (d) 7h 7m. 7'yi 2'ye bölmek, geriye kalan 60m ile 3mo verir. 7m'ye 60m eklemek 67m verir. 67'yi 4'e bölmek 17d verir. 17 Ağustos 1920, Harita. D. 1970 takvim yılı için. Her iki yöntemle de bulunan 3 ay, 17 gün 22 Mart 1970'den çıkarıldığında, Venüs paralel Satürn'ü verir.*r* 5 Aralık 1969.

-

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 5

Güneş ve Açıların Küçük İlerlemeleri

Seri Ders Numarası 114

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

MINOR PROGRESSION DATE TABLE

Years Age	Y.	Mo.	Days	Years Age	Y.	Mo.	Days
1	00	00	27	25	01	10	18
2	00	01	25	26	01	11	15
3	00	02	22	27	02	00	07
4	00	03	19	28	02	01	04
5	00	04	17	29	02	02	02
6	00	05	14	30	02	02	29
7	00	06	11	31	02	03	26
8	00	07	08	32	02	04	24
9	00	08	06	33	02	05	21
10	00	09	03	34	02	06	18
11	00	10	00	35	02	07	16
12	00	10	28	36	02	08	13
13	00	11	25	37	02	09	10
14	01	00	17	38	02	10	07
15	01	01	15	39	02	11	05
16	01	02	12	40	02	11	29
17	01	03	09	41	03	00	24
18	01	04	06	42	03	01	22
19	01	05	04	43	03	02	19
20	01	06	01	44	03	03	16
21	01	06	28	45	03	04	14
22	01	07	26	46	03	05	11
23	01	08	23	47	03	06	08
24	01	09	20	48	03	07	05

Computed by W. M. A. Drake

MINOR PROGRESSION DATE TABLE

Years Age	Y.	Mos.	Days	Years Age	Y.	Mos.	Days
49	03	08	03	73	05	05	18
50	03	09	00	74	05	06	15
51	03	09	27	75	05	07	13
52	03	10	25	76	05	08	10
53	03	11	22	77	05	09	07
54	04	00	14	78	05	10	04
55	04	01	12	79	05	11	02
56	04	02	09	80	05	11	29
57	04	03	06	81	06	00	21
58	04	04	03	82	06	01	19
59	04	05	01	83	06	02	16
60	04	05	28	84	06	03	13
61	04	06	25	85	06	04	11
62	04	07	23	86	06	05	08
63	04	08	20	87	06	06	05
64	04	09	17	88	06	07	02
65	04	10	15	89	06	07	30
66	04	11	12	90	06	08	27
67	05	00	04	91	06	09	24
68	05	01	01	92	06	10	22
69	05	01	29	93	06	11	19
70	05	02	26	94	07	00	11
71	05	03	23	95	07	01	09
72	05	04	21	96	07	02	06

Computed by W. M. A. Drake



Küçükler: Doğum Haritası 317b

4 Temmuz 1920, 17:00 CST. 90W. 30N.

LD 19 Ocak 1920. MM eksi 2S 14° 50'

SC eksi 7S 9° 55'. 1932 Mip. D. 28 Mayıs 1921

19 Ocak 1932 için dış çemberde büyük ilerlemeler

19 Ocak 1932 için grafik dışı küçük ilerlemeler.

1932	18 Şubat	artan*m*paralel Merkür*p*.
1932	1 Mart	Güneş*m*altmışlık Venüs*p*.
1932	24 Mart	artan*m*kare Merkür*p*.
1932	Mart 29	artan*m*kare Neptün*r*. MC
1932	28 Mayıs	*m*paralel Jüpiter*p*. Güneş
1932	26 Eylül	*m*seskukare Mars*r*. MC*m*
1932	12 Aralık	altmışlık Mars*p*.

Bölüm 5

Güneş ve Açıların Küçük İlerlemeleri

INOR ilerlenmiş yönlerin iki farklı etkisi vardır. Aynı ikisi arasında bir güç ve bir güç ve bir uyum veya uyumsuzluk, 1/27.3 güç ve aynı yönün uyum veya uyumsuzluğu aynı ikisi arasında. büyük-ilerlemiş yön tarafından yapıldığında gezegenler. Minör-ilerlemiş yönler yoluyla yeni enerji alan düşünce hücrelerinin psikokinetik gücü, böylece onların yaşamın küçük olaylarını çekmelerini sağlar. Küçük olaylar, karakteristik küçük-ilerlemiş yönlerle örtüşür.

Ancak bu bağımsız etkiye ek olarak, eğer küçük-ilerlemiş açı terminallerden birine aitse (bir gezegen kendi doğum haritası yerine açı yapmıyorsa, hem doğum haritası hem de ilerlemiş konumlar terminaldir), her gelişmiş yönün dört terminali vardır. majör-ilerlemiş yönü, o hızlanır ve böylece majör-ilerlenmiş yönü güçlendirir. Etkiler söz konusu olduğunda, bir otomobil endüksiyon bobini, ateşleme için gerekli kıvılcımı sağlamak için akü akımını yeterli voltaja yükseltmekte çalıştığından, büyük ilerlemeli güç üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Ve büyük-ilerlemiş bir yönün büyük bir olayı çekecek kadar güç kazanması için, onun, kendi olaylarından birine küçük-ilerlemiş bir veçhe ile bu şekilde takviye edilmesi gerektiği kadar gerekli görünüyor.

Bir otomobilde olduğu gibi, tatmin edici bir ateşleme elde etmek için akü akımının bir endüksiyon bobini tarafından hızlandırılması için dört terminal.

Church of Light, bazı büyük olayların meydana geldiği sırada yüzlerce çizelgede majör ve minör-ilerlemiş yönlerin istatistiksel çalışmaları, büyük olayların sadece karakteristik majör-ilerlemiş veçhe, böylece minör-ilerlemiş bir veçhe ile takviye edildiğinde meydana geldiğini göstermektedir. Bu istatistiksel çalışmalar, bu pekiştirme etkisinin, ana-gelişmiş yönün uyumu veya uyumsuzluğu üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor. Ancak, görünüşe göre, ana-ilerlemiş yönün o sırada sahip olduğu gücü, aynı oranda, benzer bir ana-ilerlemiş veçhe, ilgili gezegenlerin doğum haritası gücünü artırıyor. Bu nedenle, majör-ilerlemiş bir yönün tek etkili küre derecesi dahilinde olduğu süre boyunca, minör-ilerlemiş yönlerin onu hızlandırdığı birkaç daha küçük dönem olacağı kesindir.

Bölüm 7'de (Seri Ders 116) açıklandığı gibi, terminallerinden birinin küçük-ilerlemiş yönüne ek olarak, aynı zamanda, bir büyük-gelişmiş bir tarafından cezbedilen bir olayın tam zamanında terminallerinden birinin bir transit yönü olmalıdır. yönü hayata girer. Ancak, küçük ilerlemeli yönlerin pekiştirici gücüyle ilgili olarak, kapsamlı istatistiksel araştırmalar aşağıdakileri tamamen haklı çıkarır:

KURAL: Bir olayın veya hastalığın Büyük-İlerlemiş Sabitleri her zaman küçük-ilerlemiş bir yön tarafından pekiştirilir

olayın meydana geldiği veya hastalığın geliştiği anda Ay'dan dört terminalinden birine kadar olandan daha ağırdır.

Bu kural çok önemlidir, çünkü belirli bir olayın olasılığını veya belirli bir hastalığın gelişme olasılığını ortadan kaldırmamızı sağlar, bu sınırlı süreler dışında, Ana-İlerleyen Sabitlerin bir derece etkin küre içinde olduğu dönemlerde bile. TÜM bu Büyük-İlerlemiş Sabitler, küçük-ilerlemiş yönlerle güçlendirildiğinde.

Ancak bu nedenle, yalnızca on gezegenin ve MC ve Yükselen'in zodyak küçük-ilerlemiş konumu değil, belirli bir süre boyunca ortadan kaldırıldığından emin olmak için. kesin olarak tespit edilmelidir, ancak aynı zamanda on iki küçük ilerlemeli pozisyonun da sapmaları. Bu tür hesaplamalar için Ay Sabiti kullanılması, küçük olayların zamanlanmasında önemli olmayan bir ila üç gün arasında bir hata verebilir. Ancak üç gün boyunca küçük ilerlemeli Güneş, Merkür ve Venüs'ün her biri 15'den az hareket edemez. Bu nedenle, bu hata payı, gerçekte oldukları halde bir yönün yörüngesinde değillermiş gibi görünebilir. Ve bir birey, Mars'ı içeren ağır, uyumsuz, büyük-ilerlemiş bir açı sırasında tehlikeli bir istismara girişirse, Mars'ı içeren bir derece mükemmellik içinde küçük-ilerlemiş hiçbir yönün olmadığı izlenimi altında, gerçekte böyle olduğu halde, bu hata onun hayatına mal olabilir. Veya hata, gerçekte olmadığı halde, bir majör-ilerlemiş yönün terminaline bir derece küre içinde küçük-ilerlemiş bir yönün olduğunu gösterebilir. Küçük-ilerlemiş yönün bu nedenle pekiştirici güç uyguladığı varsayımına göre, bir birey bazı olumlu faktörlerin etkisi altındadır.

majör-ilerlemiş yön, bir dereceye kadar etkili küre içinde olsaydı, küçük-ilerlemiş yönün başarılı olacağı bir girişimde bulunabilir ve başarısız olabilir. Bu nedenle, belirli durumlarda, bir minör-ilerlemiş yönün ne zaman bir doğum haritasına veya büyük-ilerlemiş pozisyona bir derece etkili küre içinde olduğunu ve ne zaman olmadığını tam olarak belirleyebilmek esastır.

Yukarıdaki kural, belirtilen olayları daha kesin olarak zamanlamamızı sağlar; çünkü olay, TÜM Büyük-İlerlemiş Sabitler minör-ilerlemiş yönlerle güçlendirildiğinde belirtilen güç zirvelerinden birinde gerçekleşecektir.

Bölüm 8'in 226. sayfasında (Seri Ders 117) belirtildiği gibi, çizelgeleri düzeltmeye büyük ölçüde yardımcı olur; çünkü tablo doğruysa, olaydan etkilenen yaşam bölümünün haritasını çıkaran evin yöneticisine ve olayın -çoğunlukla birkaç evin yöneticilerini içeren- olayın Büyük-İlerleyen Sabitlerine ilişkin yalnızca büyük bir ilerleme yönüne sahip olmayacaktır. olayın meydana geldiği anda, ancak ek bir kontrol olarak, her durumda olayı gösteren büyük-ilerlemiş yön, küçük-ilerlemiş bir yön tarafından güçlendirilmeli ve bir transit yönü tarafından serbest bırakılmalıdır.

Evin yöneticisi, büyük-ilerlemiş açıdan etkilenen yaşam bölümünü haritalandırıyorsa ve diğer Büyük-İlerlemiş Sabitlerin her biri, böylece, küçük-ilerlemiş bir yön tarafından güçlendirilmezse ve o sırada bir transit-ilerlemiş veçhe tarafından serbest bırakılırsa olayın, haritanın ev konumları doğru değil.

Yukarıda verilen kuralın başka önemli uygulamaları da vardır, ancak şüphesiz en büyük faydası,

işleri yapmak için en iyi zamanın seçimi. Genellikle, küçük ilerlemeli yönler yalnızca kısa bir süre sürer. Bu nedenle, bir majör-ilerlemiş yönün bir derece etkili küre içinde olduğu süre boyunca, genellikle, terminallerinden herhangi birinin minör-ilerlemiş yönünün onu güçlendirmediği birkaç kısa dönem seçmek mümkündür. Eğer kişi tehlikeli bir yolculuk yapmak gibi tehlikeli bir şey yapmak zorunda kalırsa, Mars'ın dahil olduğu olumsuz bir büyük ilerleme durumu varken, eğer kişi bu büyük ilerleme yönünün küçük ilerlemeli bir yön tarafından desteklenmediği bir zaman seçilirse , tehlike sıfıra olmasa da en azından minimuma indirilecektir. Şimdiye kadar birkaç yüz kazayı analiz ederken, Mars'ın dahil olduğu büyük ölçüde ilerlemiş bir yön, bir veya daha fazla küçük ilerlemiş yön tarafından güçlendirilmedikçe hiçbirine rastlamadık.

Öte yandan, olumlu bir büyük-ilerlemiş açıdan mümkün olan tüm faydayı elde etmenin gerekli olduğu bir zamanda bir şey yapmak istersek, birkaç küçük-ilerlemiş yönün büyük-ilerlemiş yönü pekiştirdiği bir zaman seçilebilir. . Çoğu zaman, takviyelerin ana-ilerlemiş yönü normal tepe gücünün birkaç katı verdiği kısa bir süre bulmak mümkündür. Bu kadar kısa bir süre içinde istenen olayı gerçekleştirme gücü, sonuç olarak, hiçbir takviyenin olmadığı zamandan çok daha fazla olacaktır.

Çoğu büyük olay birdenbire habersiz yere düşmez. Genellikle büyük olaya yol açan küçük ön olaylar vardır ve büyük olay geçtikten sonra oldukça sık olarak ondan kaynaklanan küçük olaylar vardır. Büyük bir olaya yol açan ve büyük bir olaydan kaynaklanan küçük olaylar

majör olayı gösteren majör-ilerlemiş yönün terminallerinden bir veya daha fazlasını içeren minör-ilerlemiş yönler tarafından belirtilir ve zamanlanır. Bu bilgi, yaklaşan büyük olayın türünü tahmin etmede ve ondan gelişen belirli koşulların oluşacağı zamanı tahmin etmede oldukça değerli olabilir.

Küçük İlerlemiş Unsurlar Sadece Yapıldığında Değerlidir

Doğum Haritası Gezegenlerine veya Büyük İlerlemiş Gezegenlere

Deneyimler, küçük-ilerlemiş gezegenlerin kendi aralarındaki açılarının, etkilerinin ihmal edilmesi gereken kadar az enerji sağladığını kanıtlıyor.

Herhangi bir takvim zaman aralığı, küçük ilerlemeli zaman aralığına dönüştürülebilir ve herhangi bir küçük ilerlemeli zaman aralığı, bir yıllık takvim zamanına eşdeğer olan 27.3 günlük küçük ilerleme süresi ve 360° oranında takvim zaman aralığına dönüştürülebilir. Ay'ın küçük bir ilerlemeyle hareketi bir yıllık (365.25 gün) takvim zamanına eşittir. Efemeris Ay böylece günde yaklaşık 1 derece küçük bir ilerleme ile hareket eder.

Kesin olmak gerekirse, küçük-ilerlemiş Ay, geçiş yapan Güneş ile tam olarak aynı sayıda derece ve dakika hareket eder. Böylece, doğum haritasındaki Güneş ile doğum haritasındaki Ay arasındaki zodyak uzaklığı, her zaman, küçük-ilerlemiş Ay ile transit Güneş arasındaki kesin zodyak uzaklığıdır. Bu nedenle, transit Güneş'ten - herhangi bir belirli takvim tarihinde Güneş'in efemeris içindeki konumundan - küçük-ilerlemiş Ay'ın konumu ve küçük-ilerlemiş Ay'ın konumundan, küçük-ilerlemiş Ay'ın konumu kolayca bulunabilir. başka gezegenler olabilir

tespit edildi. Ve herhangi bir küçük-ilerlemiş açı oluştuğunda, küçük-ilerlemiş Ay'ın konumundan, Güneş'in geçiş konumu kolaylıkla bulunabilir ve Güneş'in geçiş konumundan, Güneş'in bu konumu için bir ephemerise bakılarak, küçük ilerlemeli yönün oluşturulduğu takvim günü tespit edilebilir. İstenirse, o günkü Güneş'in belirtilen konumun kesin ' noktasına geldiği saat hesaplanarak, o takvim gününde görünümün oluştuğu saat de tespit edilebilir. Bu hesaplamalarda kullanılan doğum haritasındaki Ay ile doğum haritasındaki Güneş arasındaki zodyak uzaklığına Güneş Sabiti denir.

Güneş Sabitini Bulma

Güneş Sabiti (kısaltılmış SC), doğum haritasında Ay ve Güneş arasındaki burçlar, °s ve 'ler cinsinden zodyak mesafesidir, artı veya eksi olarak ifade edilir, böylece işarete ° ve ' eklendiğinde, Ay tarafından işgal edildiğinde, cebirsel toplam, ° ve Güneş tarafından işgal edilen işareti verir.

Güneş Sabitini bulmak için, burçlardaki daha büyük zodyak boylamından, doğum haritasında Güneş veya Ay tarafından işgal edilen °s ve 'lerden, burçlardaki daha küçük zodyak boylamını, °s ve 'lerin Güneş veya Ay'ın işgal ettiği yerlerde çıkarın. Doğum grafiği. İşaretlerin, °'lerin ve 'lerin önüne yerleştirin, böylece Güneş'in işgal ettiği yeri tespit etmek için Ay'ın işgal ettiği yere eklenip eklenmeyeceğini veya çıkarılacağını belirten artı veya eksi işareti bulundu.

Sonra, Ay nerede olursa olsun küçük bir ilerlemeyle, cebirsel olarak ° ve 'SC'yi işgal eder ve sonuç, geçiş yapan Güneş tarafından işgal edilen işaret, ° ve' olur.

Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

o takvim yılı için efemerlerde gösterildiği gibi. Günün saati Güneş bu dereceye ulaşır ve ' daha sonra hesaplanabilir.

Takvim yılının herhangi bir gününde, günün herhangi bir saatinde Güneş nerede olursa olsun, SC'den önceki cebir işaretini değiştirin ve o takvim tarihinde günün saatinde Güneş tarafından işgal edilen, ° ve ' işaretine ekleyin, ve sonuç, o takvim tarihinde küçük-ilerlemiş Ay tarafından işgal edilen, ° ve ' işaretidir.

Küçük İlerleme Tarihini Bulma

365,25 günlük her takvim yılı, 27.3 günlük efemeris zamanına (küçük ilerleme süresi) eşittir; bu, küçük-ilerlemiş Ay'ın 12 zodyak burcunun tümüne rağmen döngüyü tamamlaması ve işarete, ° ve işaretine geri dönmesi için geçen süredir. ' doğum haritasında işgal etti. Küçük İlerleme Tarihi (kısaltılmış Mip. D.)—küçük-ilerlemiş Ay'ın yeniden burcunu işgal ettiği, ° ve doğum haritasında ' işgal ettiği efemeris tarihi - herhangi bir takvim yılı için ileriyi sayarak bulunabilir. efemeris Ay'ın burçlara dönüşleri kadar, ° ve ' doğumdan bu yana geçen yaşam yılları kadar doğum haritasında yer alır.

Veya doğumdan bu yana geçen yıl sayısını 27.3 ile çarpın. Daha sonra ürünü 365'e (bir yıldaki gün sayısı) bölün ve bölüm yıllarını arayın. Kalan günleri 30'a bölün ve bölüm aylarını arayın. Doğumdan sonraki her yıl için 96 yaşına kadar bu şekilde tespit edilen yıl, ay ve gün sayıları 130 ve 131. sayfalardaki Küçük İlerleme Tarihi Tablosunda verilmiştir. Daha sonra doğum yılına, ayına ve gününe yılları, ayları ve günleri ekleyin. küçük-ilerlemiş aralığın günleri böylece tespit edildi. Bu irade

Mip'in yaklaşık efemeris tarihini verin. D. Bu yaklaşık Mip'ten efemeris içinde ileri veya geri hareket edin. D. efemeris Ay'ı burçta gösterene kadar, ° ve ' doğum haritasında yer alır. Bu efemeris günü, Küçük İlerleme Tarihidir.

Minör Efemeris Tarihini Bulma

Küçük Efemeris Tarihi (kısaltılmış MED), gezegenlerin küçük-ilerlemiş konumlarının hesaplandığı veya küçük-ilerlemiş gezegenlerin doğum haritasına veya büyük-ilerlemiş konumlarına açı yaptığı tarihtir.

Efemerisin incelenmesi, küçük-ilerlemiş gezegenlerin doğum haritasına veya büyük-ilerlemiş konumlara açılar yaptığı MED'yi gösterecektir. Herhangi bir takvim tarihi için gezegenlerin küçük-ilerlemiş konumlarının hesaplanacağı MED'yi bulmak için, SC'den önceki işareti değiştirdikten sonra, onu, o takvim tarihinde o takvim tarihinde transit Güneş tarafından işgal edilen ° ve ' işaretine cebirsel olarak ekleyin. küçük ilerlemeli pozisyonların gerekli olduğu günün saati. Bu, o takvim tarihinde ve günün o saatinde küçük ilerlemiş Ay tarafından işgal edilen işareti, ° ve işgal eder.

Sonra yaklaşık Mip'i bulun. D. o takvim yılı için. Takvim tarihi o yılın doğum gününden önceyse, yaklaşık Mip'ten efemeriste geri gidin. D. Ay belirtilen işarette, ° ve ' bulunana kadar. Takvim tarihi o yılın doğum gününden sonraysa, yaklaşık Mip'ten efemeris içinde ilerleyin. D. Ay belirtilen işarette, ° ve ' bulunana kadar. Bu şekilde bulunan efemeris tarihi MED'dir.

Gezegenlerin Küçük İlerlemiş Konumlarını Bulmak
Belirli bir Takvim Tarihi

İlk önce, verilen takvim tarihinde ve günün kesin saatinde transit Güneş tarafından işgal edilen, ° ve ' işaretlerini bulun, tıpkı doğum günü ve saati için bir doğum haritası oluştururken bulunduğu gibi. Ardından, yukarıda açıklandığı gibi, bu takvim tarihi ve günün saati için küçük ilerlemeli Ay tarafından işgal edilen kesin işareti, ° ve ' bulmak için SC'yi kullanın. Bundan, daha önce açıklandığı gibi, bu takvim tarihi için MED'yi bulun.

(a) Gezegenin günlük hareketini °s ve 'ler cinsinden MED'de bulun.

(c) Ay'ın MED üzerindeki günlük hareketini °s ve ' olarak bulun.

Takvim tarihi ve günün saatinde küçük ilerlemeli Ay tarafından işgal edilen °s ve ' işaretlerini, ° ve ' yi bulunuz, yukarıda bulunan şekilde, Ay tarafından işgal edilmiştir, ° ve ' MED'de.

Orantısal olarak (a), (c) ve (d)'yi 's'ye düşürün.

(d)'yi (a) ile çarpın ve ürünü (c)'ye bölün. Bu (b)'yi verir, ' cinsinden gezegenin MED konumundan uzaklığıdır.

Logaritma ile günlük ekleyin. (a) günlüğe kaydetmek. (d) ve toplam çıkarma günlüğünden. (c). Sonuç günlüktür. (b), °s ve 'ler gezegen MED konumundan hareket etti.

Küçük ilerlemeli Ay'ın verilen takvim tarihi için konumu MED'deki konumundan daha azsa ve

gezegen geri hareket ediyor, MED konumuna °s ve bu şekilde bulunan 'leri ekleyin. Küçük ilerlemiş Ay'ın konumu MED üzerindeki konumundan daha azsa ve gezegen doğrudan hareket halindeyse, MED konumundan bulunan °s ve 'leri çıkarın. Küçük ilerlemiş Ay'ın konumu MED üzerindeki konumundan daha büyükse ve gezegen hareket halinde geri hareketteyse, MED konumundan bulunan °s ve 'leri çıkarın. Küçük ilerlemeli Ay'ın konumu MED üzerindeki konumundan daha büyükse ve gezegen doğrudan hareket halindeyse, MED konumuna bulunan °s ve 'leri ekleyin. Bu, verilen takvim tarihinde gezegenin küçük-ilerlemiş konumunu verir.

Gezegenin küçük-ilerlemiş eğimi için, (a) için günlük hareketini sapma ile kullanın ve (b)'yi bulun, °s ve 's'yi MED konumundan sapma ile bulun; tıpkı °s ve 's zodyak MED konumu yukarıda bulundu.

Örnek 1. Sayfa 132'de verilen 317b çizelgesi için, 19 Ocak 1932 için tüm yan ilerleme konumlarını hesaplayın. Tüm yan ilerlemeli hesaplamalardaki ilk adım Güneş Sabitini bulmaktır. Doğum haritası Güneş'in 4S 12° 36' konumunu, doğum haritası Ay'ın 11S 22° 31' konumundan çıkarmak, Güneş Sabitini 7S 9° 55' olarak verir.

Küçük ilerlemeli konumları bulmanın ikinci adımı, takvim tarihi için küçük ilerlemeli Ay'ın konumunu bulmaktır. 19 Ocak 1932'ye dönersek, efemerlerde, Greenwich öğlen 10S 28° 13' konumunda geçiş yapan Güneş'i buluruz. SC'den önceki cebirsel işareti değiştirerek, 7S 9° 55', geçiş yapan Güneş'e 10S 28° 13' ekleriz. Bu, küçük ilerlemeli Ay'ın konumunu 6S 8° 08' olarak verir.

Küçük ilerlemeli pozisyonları bulmanın üçüncü adımı, yaklaşık Küçük İlerleme Tarihini bulmaktır. 1932, doğumdan 12 yıl sonra. Küçük İlerleme Tarihi Tablosu, sayfa 130'a bakarız ve 12 yaş için 00y 10m 28d buluruz. Bunu doğum tarihine, 1920y 7mo 4d'ye eklemek, yaklaşık Mip'i verir. D. 2 Haziran 1921 olarak.

Küçük ilerlemeli pozisyonları bulmanın dördüncü adımı MED'yi bulmaktır. 19 Ocak 1932'deki doğum gününden önce olduğu için, yaklaşık Mip'ten efemeriste geri dönüyoruz. D. 8 Başak 08'in yakınında Ay'ı bulana kadar. MED böylece 15 Mayıs 1921'dir ve Ay 5 Başak 21'i gösterir ve (c) 13° 55' hareket eder.

8 Başak 08'e ulaşmak için (d) 2° 47' hareket etmelidir.

Gezegenin 15 Mayıs 1921'deki günlük hareketi (a)'dır.

Orantılı kullanım için 13° 55' azaltırız, bu da (c) 835' verir.

Orantılı kullanım için 2° 47' azaltırız, bu da (d) 167' verir.

Logaritmalarla kullanım için indirgenmezler.

15 Mayıs 1921'de Güneş'in günlük hareketi (a) 58' dir. Orantılı olarak, (d) 167'yi (a) 58 ile çarpmak 9686'yı verir. 9686'yı (c) 835'e bölmek (b) 12'yi verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) Günlüğe kaydetmek için 1.3949. (d) .9356 verir 2.3305. Günlük çıkarma. (c) 2.3305'ten .2367, günlük olan 2.0938'i verir. (b) 12'. Her iki yöntemle de bulunan 12' 15 Mayıs 1921'de Güneş'in efemeristeki konumuna eklendiğinde, Güneş'in küçük ilerlemeli konumunu verir.

19 Ocak 1932 takvim tarihi için Greenwich öğlen, 24 Boğa 18 olarak.

15 Mayıs 1921'de Merkür'ün günlük hareketi (a) 2° 09'. Orantısal olarak, 2° 09' azaltmak (a) 129' verir. (d) 167'yi (a) 129 ile çarpmak 21543'ü verir. 21543'ü (c) 835'e bölmek (b) 26' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) 1.0478'i günlüğe kaydetmek (d) .9356 verir 1.9834. Günlük çıkarma. (c) 1.9834'ten .2367, günlük olan 1.7467'yi verir. (b) 26'. Her iki yöntemle de bulunan 26' 15 Mayıs 1921'de Merkür'ün efemeristeki konumuna eklenmesi, Merkür'ün 19 Ocak 1932 takvim tarihinde Greenwich öğlen 00 İkizler 37 olarak küçük ilerlemeli konumunu verir.

Diğer gezegenlerin küçük-ilerlemiş konumları, 15 Mayıs 1921'deki günlük hareketleri kullanılarak (a)'daki gibi bulunur. Greenwich öğlen için küçük ilerlemeli konumları, sayfa 132'deki çizelgenin dış tarafında bulunacaktır. Sapmalar, (a)'daki gibi gezegenin eğimi ile günlük hareketi kullanılarak aynı şekilde ele alınır.

Böylece, 15 Mayıs 1921'de Ay, 4° 26' meylinde (a) küçülüyor. Orantısal olarak, 4° 26' azaltmak (a) 266' verir. (d) 167'yi (a) 266 ile çarpmak 44422'yi verir. 44422'yi (c) 835'e bölmek (b) 53' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) günlüğe kaydetmek için .7335. (d) .9356 verir 1.6691. Günlük çıkarma. (c) 1.6691'den .2367, günlük olan 1.4324'ü verir. (b) 53'. Ay'ın 15 Mayıs 1921'deki efemeristeki eğiminden her iki yöntemle bulunan 53' değerini (sapma azaldıkça) çıkarmak,

19 Ocak 1932 takvim tarihinde Greenwich'te Ay'ın küçük ilerlemeli eğimi, 4 N 51 olarak.

Örnek 2. 317b grafiği için, küçük-ilerlemiş MC ve Artan'ı bulun. 19 Ocak 1932 için. Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre bulunan bu çizelge için Orta Gökyüzü Sabiti (MCC) eksi 2S 14° 50''dir. Bu nedenle, Bölüm 2'de açıklandığı gibi, küçük-ilerlemiş MC'yi bulmak için, MCC'nin cebirsel işaretini değiştirin ve 2S 14° 50', Güneş'in yukarıda bulunan küçük-ilerlemiş konumuna, 2S 24° 18' ekleyin. Bu, 19 Ocak 1932'de Greenwich'te 9 Aslan 08 olarak küçük ilerlemeli MC'yi verir. Bölüm 2'de verilen yöntem kullanılarak, 9 Aslan 08, 30K enleminde MC'deyken, 5 Akrep 55'in olduğu bulunmuştur. Asc üzerinde. Bu nedenle, 19 Ocak 1932 takvim tarihinde Greenwich öğlen, küçük ilerlemeli Asc. 5 Akrep 55'.

Bir Doğum Haritasında veya Büyük Derecede İlerleme Pozisyonunda Küçük İlerlemeli Bir Yönün Bulunduğu Takvim Tarihini Bulma

Mükemmel

Görünümün mükemmel olduğu efemeris zamanına en yakın efemeristeki MED'yi bulun.

Bir ana ilerleme pozisyonu söz konusuysa, MED tarafından temsil edilen takvim tarihi için ana ilerleme pozisyonu bulun. Küçük ilerlemiş Ay'ın MED üzerindeki hareketiyle temsil edilen gün sayısı boyunca büyük ilerlemeli yolculuğunu bulun. Bu, 12 ila 15 derece arasında hareket eden MED sırasında Ay tarafından belirtildiği gibi, 12 ila 15 günlük takvim zamanıdır.

(a) Takvim aralığı boyunca büyük-ilerlemiş gezegendeki küçük-ilerlemiş gezegenin kazancını °s ve 's cinsinden bulun.

MED tarafından temsil edilmektedir. Eğer açı bir doğum haritası pozisyonuna ise, (a) küçük-ilerlemiş gezegenin MED'deki günlük yolculuğudur.

(b) °'leri ve 'leri, MED tarafından temsil edilen takvim tarihinde mükemmel olandan bulun.

(c) Ay'ın MED üzerinde seyahat ettiği °s ve 'leri bulun.

Orantısal olarak (a), (c) ve (b)'yi 'lere düşürün. (c) ile çarp (b) ve ürünü (a)'ya bölün. Bu (d)'yi verir, açı mükemmel olduğunda küçük-ilerlemiş Ay'ın MED üzerindeki konumundan uzaklıktır.

Logaritma ile günlük ekleyin. (b) oturum açmak. (c) ve toplam çıkarma günlüğünden. (a). Sonuç günlüktür. (d), açı mükemmel olduğunda, °s ve 'ler küçük-ilerlemiş Ay MED üzerindeki konumundandır.

açı mükemmel olduğunda, ° ve ' bu nedenle küçük-ilerlemiş Ay tarafından işgal edildiğinde, açının mükemmel olduğu takvim tarihinde geçiş yapan Güneş tarafından işgal edilen ° ve ' işaretini bulmak için SC'yi kullanın. Günün saatini bilmek isteniyorsa, o takvim gününde küçük ilerlemeli yönün mükemmel olduğunu, günün saatini Bölüm 7'de (Seri Ders 116) açıklanan şekilde hesaplayın.

Örnek 3. Grafik 317b için, 1932 takvim yılı boyunca, küçük ilerlemeli Güneş'in Venüs p'ye 60'lık açıda olduğunu bulun. 132. sayfadaki çizelge, büyük ilerleme kaydeden Venüs'ün 19 Ocak 1932'de 27 Yengeç 07 olarak konumunu göstermektedir. Yaklaşık Mip'ten efemeriste geriye bakmak. D. için 1932 (2 Haziran 1921), Güneş'i 18 Mayıs'ta 26 Boğa 59'da buluruz ve böylece Venüs'e yakın altmışlık s. Bu MED'de Ay 16 Terazi 29'dur.

7S 16° 29' değerinden SC 7S 9° 55' çıkarmak, Güneş'in MED üzerindeki geçiş konumunu 12S 6° 34' olarak verir. 1932 efemerisine baktığımızda 26 Şubat 1932'de Güneş 6 Balık 42'yi buluyoruz. Büyük-ilerlemiş Venüs'ü Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre hesaplamak, 26 Şubat 1932'deki konumunu 27 olarak verir. Yengeç 15. Bölüm 2'de verilen yöntemle hesaplanan Ay'ın MED üzerindeki hareketi 13 gün boyunca, Venüs 3' hareket eder. Güneş'in 18 Mayıs 1921'de hareket ettiği 58' değerinden bu 3' çıkarıldığında, (a) 55' kazancı elde edilir.

18 Mayıs 1921, Güneş eksik (b) 16' altmışlık 27 Yengeç 15.

18 Mayıs 1921, Ay (c) 13° 19' hareket ediyor.

Orantısal olarak, 13° 19' azaltmak (c) 799' verir. çarpma (c) 799 by (b) 16 12784'ü verir. 12784'ü (a) 55'e bölmek (d) 232' veya 3° 52' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 1.9542 günlüğe kaydedilir. (c) .2558 verir 2.2100. Günlük çıkarma. (a) 2.2100'den 1.4180, günlük olan .7920'yi verir. (d) 3° 52'.

Her iki yöntemle de bulunan 3° 52'yi 18 Mayıs 1921'de Ay'ın konumuna eklemek, Ay'ın küçük-ilerlemiş konumunu 20 Terazi 21'i verir. Bundan 7S 20° 21' çıkarın SC 7S 9° 55' ve Güneş 10 Balık 26'nın geçiş konumunu verir. 1932 yılı için bir efemerise dönersek, 1 Mart 1932'de gerekli konumdan 12 saatten daha az hareketle Güneş 10 Balık 43'ü buluruz. Böylece Güneş*m*sekstil Venüs*p*1 Mart 1932.

Örnek 4. 317b haritası için, 1932 takvim yılı boyunca küçük-ilerlemiş Güneş'in seskikare doğum haritası Mars olduğunu bulun. 132. sayfadaki çizelge Mars'ı gösteriyor*r*27 Terazi 50. Sesquisquare için Güneş*m*12 İkizler 50'ye geçebilir. Yaklaşık Mip'ten efemerislere bakmak. D. 1932 için (2 Haziran 1921), 3 Haziran 1921'de 12 İkizler 20'de Güneş'i buluyoruz. Bu MED'de Güneş (a) 57' hareket ediyor. (b) 30' açıdan yoksundur. Ay her gün (c) 13° 44' hareket ediyor.

Orantısal olarak 13° 44' azaltmak (c) 824' verir. çarpma (c) 824 (b) 30 24720 verir. 24720'yi (a) 57'ye bölmek (d) 434' veya 7° 14' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 1.6812 günlüğe kaydedilir. (c) .2424 verir 1.9236. Günlük çıkarma. (a) 1.9236'dan 1.4025, günlük olan .5211'i verir. (d) 7° 14'. Her iki yöntemle de bulunan 7° 14'yi Ay'ın 3 Haziran 1921'deki konumuna eklemek, Ay'ın 13 Boğa 21'in küçük-ilerlemiş konumunu verir. Bundan 2S 13° 21', SC 7S 9° 55' ve Güneş'in geçiş konumunu 7S 3° 26' olarak verir. 1932 için bir efemerise dönersek, Güneş 3 Terazi 11'i ve dolayısıyla 26 Eylül 1932'deki gerekli konumdan 12 saatten az bir hareketle buluruz. Böylece Güneş*m*Mars seskikare mi*r*26 Eylül 1932.

Belirli Bir Tarihte Küçük Aşamalı MC'yi Bulma

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Küçük İlerleme Artışını Bulma. Belirli Bir Tarihte

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Verilen bir Asc için MC'de İşareti, ° ve ' bulma.

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Minör İlerleyen Takvim Tarihini Bulma MC

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Küçük İlerlemiş MC'nin Zodyak Hareketini Bulma veya artan

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Küçük-İlerlemeli MC veya Artıştan Bir Yönün Bulunduğu Takvim Tarihini Bulma. İleri Derecede veya Doğum Haritası Pozisyonu Mükemmel

Görünümün mükemmel olduğu efemeris zamanına en yakın efemeristeki MED'yi bulun. Küçük ilerlemeli MC veya Artan'ın işaretini, ° ve ' bulun. bu MED tarafından temsil edilen takvim tarihinde.

Önemli bir ilerleme durumu söz konusuysa, MED tarafından temsil edilen takvim tarihi için ana ilerleme konumunu bulun. MED'deki küçük ilerlemeli Ay'ın hareketiyle temsil edilen gün sayısı boyunca büyük ilerlemeli yolculuğunu bulun. Bu, 12 ila 15 derece arasında hareket eden MED üzerindeki Ay tarafından belirtildiği gibi, 12 ila 15 günlük takvim zamanıdır.

(a) minör ilerlemeli MC veya Artan'ın °s ve ' cinsinden kazancını bulun. MED tarafından temsil edilen takvim aralığı sırasında ana ilerleme pozisyonunun seyahatinde. Eğer açı bir doğum haritası pozisyonuna ise, (a) minör-ilerlemiş MC veya Asc'nin yolculuğudur. MED'de.

(b) °'leri ve 'leri, MED tarafından temsil edilen takvim tarihinde mükemmel olandan bulun.

(c) Ay'ın MED üzerinde seyahat ettiği °s ve 'leri bulun.

Daha sonra görünüş, daha önce açıklandığı gibi küçük-ilerlemiş bir gezegen tarafından yapılıyormuş gibi ilerleyin.

Örnek 5. 317b şeması için, 1932 takvim yılı boyunca, küçük-ilerlemiş MC'nin altmışlık Mars p olduğu zamanını bulun. Sayfa 132'deki çizelge 19 Ocak 1932'de 2 Akrep 23'te Mars'ta büyük ilerlemeyi göstermektedir. Altmışlığa ulaşmak için MC 2 Başak 23'ten fazla olmalıdır. 6S 2° 23' değerinden MCC 2S 14° 50' ve Güneş verir *m* olarak 17 İkizler 33. Yaklaşık Mip'ten ileriye bakmak. D. (2 Haziran 1921) 8 Haziran 1921'de 17 İkizler 08'de Güneş'i buluyoruz. Bu MED. Buna 3S 17° 08' MCC 2S 14° 50' ekleyin ve MC'nin konumunu verir. *m* MED'de 1 Başak 58. Bu MED'de Ay 18 Yengeç 04'tür. SC 7S 9° 55' 4S 18° 04' değerinden çıkarıldığında, Güneş'in MED üzerindeki geçiş konumu 9S 8° 09' olarak verilir. 1932 efemerisine baktığımızda 30 Kasım 1932'de Sun 8 Yay 06'yı buluyoruz.

Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre büyük ilerlemeli Mars'ı hesaplamak, Mars'ı verir. *p* 30 Kasım 1932'de 2 Akrep 45'te. Bölüm 2'de verilen yönteme göre hesaplanan Ay'ın MED üzerindeki 15 günlük hareketi sırasında, Mars 1' hareket ediyor. MC

MED üzerinde Güneş ile aynı mesafeyi hareket ettirir. 8 Haziran 1921'de 57' hareket eder. 57' den 1' Mars hareketlerini çıkarmak, kazancı (a) 56' olarak verir.

MED'de MC, (b) 47' altmışlık Mars'tan yoksundur.*p*.

8 Haziran 1921'de MED'de Ay (c) 14° 49' hareket ediyor.

Orantısal olarak, 14° 49' azaltmak (c) 889' verir. çarpma (c) 889 (b) 47 41783 verir. 41783'ü (a) 56'ya bölmek 746' veya 12° 26' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) günlüğe kaydetmek için 1.4863. (c) .2095 verir 1.6958. Günlük çıkarma. (a) 1.6958'den 1.4102, günlük olan .2856'yı verir. (d) 12° 26'.

Her iki yöntemle de bulunan 12° 26'yı Ay'ın 8 Haziran 1921'deki konumuna eklemek, Ay 00 Aslan 30'un küçük-ilerlemiş konumunu verir. Bundan 5S 00° 30', SC 7S 9° 55' ve Güneş 9S 20° 35' geçiş konumunu verir. 1932 yılı için bir efemerise dönersek, Güneş 20 Yay 17'yi, gerekli konumdan 12 saatten daha az bir hareketle, 12 Aralık 1932'yi buluruz. Böylece, küçük-ilerlemiş MC, Mars'a altmışlıktır.*p*12 Aralık 1932.

Örnek 6. Çizelge 317b için, 1932 takvim yılı boyunca küçük-ilerlemiş Asc. kare Neptün*r*: Örnek 2'de minör ilerlemeli Asc bulduk. 19 Ocak 1932'de 5 Akrep 55'te. Neptün'ün karesini yapmak için*r*10 Akrep 12'ye ulaşmalıdır. Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre 10 Akrep 12 Yükselen'deyken. 30K enleminde, 14 Aslan 08 MC'de 5S 14° 08' den MCC 2S 14° 50' çıkarın ve Güneş'in konumunu verir*m*görünüm 2S 29° 18' olarak mükemmel olduğunda. bakıyor

yaklaşık Mip'ten efemeris içinde. D. Güneşi 21 Mayıs 1921'de, 29 Boğa 52'de buluyoruz. Böylece 21 Mayıs 1921, MED'dir.

MED'de Güneş (a) 58' hareket ediyor.

MED'de Güneş (b) yönü 34' geridedir.

MED'e önceki gün, Ay 12° 54' hareket ediyor.

Orantısal olarak, 12° 54' azaltmak (c) 774' verir. çarpma (c) 774 (b) 34 26316 verir. 26316'yı (a) 58'e bölmek (d) 454' veya 7° 34' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 1.6269 günlüğe kaydedilir. (c) .2696 verir 1.8965. Günlük çıkarma. (a) 1.8965'ten 1.3949, günlük olan .5016'yı verir. (d) 7° 34'.

Ay'ın 21 Mayıs 1921'deki konumundan her iki yöntemle de bulunan 7° 34'ü çıkarmak, Ay'ın küçük-ilerlemiş konumunu 18 Akrep 15'i verir. Bundan 8S 18° 15' çıkararak SC 7S 9° 55' ve Güneş 1S 8° 20' geçiş konumunu verir. 1932 için bir efemerise dönersek, Sun 8 Aries 35'i, gerekli konumdan 12 saatten az bir hareketle, 29 Mart 1932'yi buluyoruz. Böylece minör-ilerlemiş Asc. kare Neptün*r*29 Mart 1932.

Örnek 7. Çizelge 317b için, 1932 takvim yılı boyunca küçük-ilerleyen Asc. kare Merkür*p*. 132. sayfadaki çizelge Merkür'ü gösteriyor*p*19 Ocak 1932'de 9 Leo 58R'de. Meydana ulaşmak için Asc. 9'dan küçük olmalıdır Akrep 58. 10 Akrep 05, Yükselen üzerindeyken. 30N enleminde. evlerin tablosu MC'de 14 Leo 00'ı gösteriyor

5S 14° 00' değerinden MCC 2S 14° 50' çıkarmak, küçük ilerlemeli Sun 2S 29° 10' konumunu verir. 20 Mayıs 1921, efemeris Güneş'i gösterir 28 Boğa 54. Böylece 20 Mayıs 1921, MED'dir.

20 Mayıs 1921'de Güneş'in konumuna, MCC 2S 14° 50' ve MED'de küçük-ilerlemiş MC'nin konumunu 13 Leo 44 olarak verir. Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre hesaplanmıştır, 13 Leo 44 30N enleminde MC'deyken . 9 Akrep 51 Yükselişte. Bu nedenle minör-ilerlemiş Asc. MED'de 9 Akrep 51 var.

MED üzerindeki Ay 12 Akrep 55'tir. Bundan SC 7S 9° 55' çıkar ve Güneş 3 Koç 00'ın geçiş konumunu verir. 1932 efemeris Güneş'i 2 Koç 39 Mart 23'te gösterir. Bu, buna karşılık gelen takvim tarihidir. MED'e. Bölüm 2'de verilen yönteme göre büyük ilerleme gösteren Merkür'ün hesaplanması, konumunu 23 Mart 1932'de 9 Aslan 55R olarak verir. Görünüş mükemmeldendir, dolayısıyla (b) 4'.

20 Mayıs 1921'de MED'de, Güneş 58' hareket eder, bu da küçük-ilerlemiş MC'nin hareketidir, MC ise 60' 13 Aslan 00'dan 14 Aslan 00 Yükselen'e hareket eder. 30N enleminde. 51' hareket eder ve MC 58' hareket ederken, Bölüm 2'de verilen yönteme göre hesaplanan Artan 49' hareket eder. Böylece Asc. MED'de 49' hareket eder ve 13 gün boyunca, Ay'ın MED ana ilerlemiş Merkür üzerindeki hareketi, Bölüm 2'de verilen yönteme göre hesaplanmış, 1' hareket eder. Asc olarak doğrudan hareket halindedir ve büyük ilerlemeli Merkür geri harekettedir, kazancı (a) 50' veren 49' ve 1'i toplarız.

MED'de Ay (c) 12° 54' hareket ediyor.

Orantısal olarak, 12° 54' azaltmak (c) 774' verir. çarpma (c) 774, (b) 4 3096 verir. 3096'yı (a) 50'ye bölmek (d) 62' veya 1° 02'.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 2.5563 günlüğe kaydedilir. (c) .2696 verir 2.8259. Günlük çıkarma. (a) 2.8259'dan 1.4594 şunu verir: 1.3665, günlüktür. (d) 1° 06'.

Her iki yöntemle de bulunan 1° 02'yi Ay'ın 20 Mayıs 1921'deki konumuna eklemek, Ay'ın küçük-ilerlemiş konumunu 13 Akrep 57 olarak verir. Bundan 8S 13° 57', SC 7S 9° 55'i çıkarın. ' ve Güneş'in geçiş konumunu 1S 4° 02' olarak veriyor. 1932 yılı için bir efemerise dönersek, Güneş'i 3 Koç 39'da, gerekli konumdan 12 saatten az bir hareketle, 24 Mart 1932'de buluruz. kare Merkür*p*24 Mart 1932.

Küçük İlerlemiş MC'nin Sapmasını Bulma veya artan Belirli bir Takvim Tarihi için

Küçük ilerlemeli MC veya Asc üzerindeki işaretten, ° ve '. Bölüm 3'ün 66. sayfasında (Seri Ders 112) açıklandığı gibi, sapmayı bir doğum haritası konumuymuş gibi bulun.

Küçük-İlerlemenin Sapmasıyla Hareketi Bulma MC veya Asc.

Bunun için talimatlar Bölüm 3'te verilmiştir (Seri Ders 112).

Büyük, Küçük veya Geçiş Halinde İlerleyen Gezegen, İlerleyen MC veya İlerleyen Bir Takvim Tarihini Bulma

artan Zodyak'ın Verilen İşaretine, ° ve ' ye ulaştığında veya
Verilen bir ° ve ' Sapma ulaşır

Bu problemde (b) °s'dir ve 'gezegen, MC veya Asc'dir. Haritasından hareket etmelidir. D., MED veya Transit Date konumuna ulaşmak için verilen ° ve '. Sorun tam olarak ilerleyen gezegen, MC veya Asc gibi ele alınır. Bu ° ve ' sayısı, doğum haritası pozisyonuna bir açı yapmaktan kaynaklanıyordu.

Küçük İlerleme MC veya Asc'nin Hangi Takvim Tarihini Bulma. Paralel Bir Yön Oluşturur
İleri Derecede veya Doğum Haritası Pozisyonu Olan

Görünümün mükemmel olduğu efemeris zamanına en yakın efemeristeki MED'yi bulun. Büyük ilerlemeli bir pozisyon söz konusuysa, MED tarafından temsil edilen takvim tarihi için ana ilerlemeli düşüşü bulun. Küçük ilerlemiş Ay'ın MED üzerindeki hareketiyle temsil edilen gün sayısı boyunca sapmaya göre majör ilerlemeli seyahati bulun. Bu, 12 ila 15 derece arasında hareket eden MED sırasında Ay tarafından belirtildiği gibi, 12 ila 15 günlük takvim zamanıdır.

°s ve ' cinsinden sapmayı bulun, küçük-ilerlemiş MC veya Artan tarafından işgal edilir. MED tarafından temsil edilen takvim tarihinde. MC veya Artan sapma ile küçük ilerlemeli seyahati bulun. MED sırasında.

(a) minör ilerlemeli MC veya Artan'ın °s ve ' cinsinden kazancını bulun. MED tarafından temsil edilen takvim aralığı sırasında ana ilerleme pozisyonunun sapma ile seyahatindeki sapmada. Eğer açı bir doğum haritası pozisyonuna ise, (a) minör-ilerlemiş MC veya Asc'nin düşüşündeki yolculuktur. MED'de.

(b) °'leri ve 'leri, MED tarafından temsil edilen takvim tarihinde mükemmel olandan bulun.

(c) Ay'ın MED üzerinde seyahat ettiği °s ve 'leri bulun.

Daha sonra görünüş, daha önce açıklandığı gibi küçük-ilerlemiş bir gezegen tarafından yapılıyormuş gibi ilerleyin.

Örnek 8. Grafik 317 b için, 1932'de küçük-ilerlemeli Artış takvim tarihini bulun. paralel Merkür*p*. Haritada gösterildiği gibi büyük ilerlemeli Merkür. D. 16 Temmuz 1920, 19 Ocak 1932'de 14 N 13 eğime sahiptir ve büyük ilerleme ile sapmayı yılda 8' azaltır. Bölüm 6 (Seri Ders 115) sayfa 162'deki tablo, sapma 14 S 11'e ulaşmak için Artan. 8 Akrep 00 olabilir. Evlerin bir tablosu, 11 Aslan 00 MC'deyken Yükselen olduğunu gösterir. 30N enleminde. 7 Akrep 31'dir. Böylece açı mükemmel olduğunda yaklaşık 11 Aslan 30 MC'de olacaktır MM 2S 14° 50' 5S 11° 30' değerinden çıkarıldığında küçük ilerlemeli Güneş 26 Aslan 40'ın yaklaşık konumu verilir. yaklaşık Mip'ten efemeris. D. 1932, 2 Haziran 1921 için, Güneş'i 18 Mayıs 1921'de, 26 Boğa 59'da buluyoruz. Böylece 18 Mayıs 1921, MED'dir.

18 Mayıs 1921, Ay 16 Terazi 29'dur. 7S 16° 29' değerinden SC 7S 9° 55' çıkarın ve Güneş'in MED 12S 06° 34' üzerindeki geçiş konumunu verir. 1932 efemerisine baktığımızda 26 Şubat'ta 6 Balık 42'de Güneş'i buluruz. Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yöntemle ana-ilerlemiş Merkür'ün eğimini hesaplamak 13 Mart 1932'deki konumunu 14 N olarak verir. 12. Ay'ın MED üzerindeki hareketi olan 14 gün boyunca 1'den az hareket ediyor.

MED 2S 26° 59' üzerinde Güneş'in konumuna şunu ekleyin: MCC 2S 14° 50' ve MED'de 5S 11° 49' olarak minör ilerlemeli MC verir. Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yöntemle, 11 Aslan 49 30N enleminde MC'deyken hesaplanır. Asc. 8 Akrep 30. Bu onun MED üzerindeki konumu. MED'de Güneş 58' hareket ediyor. Bu aynı zamanda MC'nin MED üzerindeki yolculuğudur. MC Artan 58' hareket ederken, Bölüm 2'de verilen yönteme göre hesaplanmıştır. 50' hareket eder. Bölüm 6 (Seri Ders 115) sayfa 162'deki tablo, Asc. 8'de Akrep 00 60' hareket eder, sapma 19' hareket eder. Bölüm 3'te verilen yöntemle hesaplanan (Seri Ders 112) 8 Akrep 30 böylece 14 S 21 sapmaya sahiptir. Asc ile aynı yöntemle hesaplanan zodyak hareketi ile MED üzerinde 50' hareket eder. sapmayı 16' arttırır. Bu minör-ilerlemiş Asc'nin inişli çıkışlı yolculuğudur. MED'de. MED sırasında Merkür sapmayı değiştirmediği için kazanç (a) 16'.

Küçük ilerlemeli Asc. MED'de 14 S 21 sapmada artıyor ve MED'de büyük ilerlemeli Merkür 14 N 12, açı mükemmel (b) 9'.

17 Mayıs ve 18 Mayıs 1921 tarihleri arasında MED'de Ay, (c) 13° 31' hareket etmektedir.

Orantısal olarak, 13° 31' azaltmak (c) 811'i verir. çarpma (c) 811 ile (b) 9 7299 verir. 7299'u (a) 16 ile bölmek 456' veya 7° 36' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 2.2041 günlüğe kaydedilir. (c) .2493 verir 2.4534. Günlük çıkarma. (a) 2.4534'ten 1.9542, günlük olan .4992'yi verir. 7° 36'.

18 Mayıs 1921'de Ay'ın konumundan her iki yöntemle de bulunan 7° 36'yı çıkarmak, Ay'ın 8 Terazi 53 olarak mükemmel olduğu zaman küçük-ilerlemiş konumunu verir. Bundan 7S 8° 53' SC'yi çıkarın. 7S 9° 55' ve Güneş'in geçiş konumunu 11S 28° 58' olarak veriyor. 1932 için bir efemerise dönersek, 18 Şubat 1932'de gerekli konumdan 12 saatten az bir hareket olan Güneş 11 Kova 38'i buluruz.*m*paralel Merkür*p*18 Şubat 1932.

Örnek 9. Grafik 317b için, küçük-ilerlemiş MC'nin Jüpiter'e paralel olduğu 1932'deki takvim tarihini bulun.*p*. Haritada gösterildiği gibi, büyük ilerlemeli Jüpiter. D. 16 Temmuz 1920, büyük ilerleme ile yılda 15 N 15 ve azalan 4' eğime sahiptir. 18 Aslan 00 MC'deyken MC'nin eğimi 15 N 26 ve MC 60' hareket ederken 19' azalıyor. 18 Aslan 30 MC minör ilerlemiş Güneş 3 İkizler 40, bu da MED 25 Mayıs 1921, Güneş 3 İkizler 43. 25 Mayıs 1932, Ay 15 Oğlak 23. Bundan çıkarıldığında SC takvimi verir MED için tarih 26 Mayıs 1932. 26 Mayıs 1932'de majör ilerlemeli Jüpiter, 15 N 14 eğime sahip ve MED'nin 12 günlük aralığı boyunca 1'den az hareket ediyor.

MED'de küçük ilerlemeli MC, 15 N 16 sapma ile 18 Aslan 33'tür. Görünüm, mükemmel (b) 2' dendir.

MED üzerindeki küçük-ilerlemiş MC burçlar hareketiyle 58' hareket eder ve sapmayı 18' azaltır. Jüpiter sapmayı değiştirmediği için kazanç (a) 18' olur.

25 Mayıs 1921'de MED'de Ay (c) 11° 59' hareket ediyor.

Bu noktadan itibaren görünüş, küçük-ilerlemiş bir gezegen tarafından yapılıyormuş gibi çözülürse, küçük-ilerlemiş MC paralel Jüpiter buluruz.*p*28 Mayıs 1932.

-

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 6

Ay ve Gezegenlerin Küçük İlerlemeleri

Seri Ders Numarası 115

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

TABLE OF HOUSE CUSP DECLINATIONS

♈	N	♐	♉	N	♑	♊	N	♋
♎	S	♓	♍	S	♒	♐	S	♌
Deg.	Dec.	Deg.	Deg.	Dec.	Deg.	Deg.	Dec.	Deg.
0	0:00		0	11:28		0	20:09	
1	0:23	29	1	11:49	29	1	20:22	29
2	0:47	28	2	12:11	28	2	20:34	28
3	1:12	27	3	12:31	27	3	20:46	27
4	1:36	26	4	12:52	26	4	20:57	26
5	1:59	25	5	13:12	25	5	21:08	25
6	2:23	24	6	13:32	24	6	21:18	24
7	2:47	23	7	13:52	23	7	21:29	23
8	3:11	22	8	14:11	22	8	21:39	22
9	3:34	21	9	14:30	21	9	21:48	21
10	3:58	20	10	14:49	20	10	21:57	20
11	4:22	19	11	15:07	19	11	22:06	19
12	4:45	18	12	15:26	18	12	22:14	18
13	5:08	17	13	15:45	17	13	22:22	17
14	5:32	16	14	16:03	16	14	22:30	16
15	5:55	15	15	16:20	15	15	22:36	15
16	6:18	14	16	16:38	14	16	22:42	14
17	6:41	13	17	16:55	13	17	22:49	13
18	7:04	12	18	17:12	12	18	22:54	12
19	7:27	11	19	17:29	11	19	23:00	11
20	7:49	10	20	17:45	10	20	23:04	10
21	8:11	9	21	18:01	9	21	23:08	9
22	8:34	8	22	18:16	8	22	23:12	8
23	8:56	7	23	18:32	7	23	23:16	7
24	9:19	6	24	18:47	6	24	23:19	6
25	9:41	5	25	19:01	5	25	23:22	5
26	10:02	4	26	19:16	4	26	23:23	4
27	10:25	3	27	19:30	3	27	23:24	3
28	10:46	2	28	19:44	2	28	23:25	2
29	11:07	1	29	19:57	1	29	23:26	1
	11:28	0		20:09	0		23:27	0

Computed by Dr. Harold E. Iden



Küçükler: Doğum Haritası 3b

28 Haziran 1920, 12:23 CST. 89W.
40:40K. LD 22 Mart 1920. MM eksi 0S 5° 32'. Güneş Sabiti, eksi 5S 1° 45'.

22 Mart 1937 için dış çemberdeki büyük ilerlemeler.

22 Mart 1937 için çizelgenin dışındaki küçük ilerlemeler.

1924 20 Ocak, Venüs*m*Uranüs üçgeni*r*. 18 Mayıs

1934 Güneş*m*kavuşum Güneş*p*. 22 Ağustos,

1935 Mars*m*Üçgen Ay*r*. 11 Eylül, Uranüs*m*

1936 muhalefet Satürn*r*.



Küçükler: Doğum Haritası 318b
24 Kasım 1920, 18:00 CST. 95W. 39N.
LD 24 Mayıs 1941. MM eksi 2S 23° 57'.
Güneş Sabiti, artı 6S 14° 39'.

24 Mayıs 1941 için dış çemberdeki büyük ilerlemeler.

24 Mayıs 1941 için çizelgenin dışındaki küçük ilerlemeler.

1933 1 Haziran, Venüs *m* paralel Satürn *p*. 11

1936 Eylül Merkür *m* yarı-sekstil Venüs *p*. 19

1937 Şubat, Paz *m* kare Artan. *r*.

1938 1 Temmuz Merkür *m* kavuşum Uranüs *p*.

Bölüm 6

Ay ve Gezegenlerin Küçük İlerlemeleri

Önemli bir yönün, terminallerine bir veya birkaç küçük-ilerlemiş yön tarafından güçlendirildiği ve büyük güç verildiği için, dönemleri belirlemek ÇOK daha kolaydır. Önemli bir olay, bu şekilde çekilen olayın ne kadar lehte veya aleyhte olacağını belirlemekten daha çok yeni enerji verilen düşünce hücrelerinin psikokinetik gücünden dolayı hayata geçecektir. Minör-ilerlemiş yönün majör-ilerlemiş yönün uyumu veya uyumsuzluğu üzerinde hiçbir etkisi yok gibi görünüyor. Ama gücünü önemli ölçüde artırıyor.

Ana-ilerlemiş bir yönün bu güçlendirilmiş güç zirveleri, o zamanlarda düşünce hücrelerinin psikokinetik gücünün, ana-ilerlemiş veçhede yer alan gezegenlerin, düşünceler, davranışlar ve çevre. Ancak düşünce, davranış ve çevre üzerinde baskı oluşturan uyum ya da uyumsuzluk, yalnızca ilerlemiş yönün uyum ya da uyumsuzluğu ile tahmin edilemez. İlerlemiş açıdan etkilenen düşünce hücrelerinin doğum haritası uyumu veya uyumsuzluğu vardır. Bu olabilir

yaşam süreleri normal kabul edilmelidir. Bağımsız bir küçük ilerleme durumu, normalden sapan küçük, nahoş veya elverişli bir olayla çakışabilir, ancak meydana geldiği dönem üzerindeki nispi etkisi, normal uyum veya uyumsuzluktan hafif bir sapmadır; ilgili gezegenlerin göreli uyumu veya uyumsuzluğu ile ölçülecek bir sapma.

İki gezegen arasındaki majör gelişmiş bir yönün uyumu veya uyumsuzluğu, aynı zamanda düşünce hücrelerinin normal uyumundan veya uyumsuzluğundan bir sapmadır. Düşünce hücrelerine ilerlemiş bir görünüm tarafından eklenen uyum veya uyumsuzluk, doğum haritası uyum veya uyumsuzluklarını, doğum haritası uyumlarına veya uyumsuzluklarına eklenen uyum veya uyumsuzlukların sayısına göre değiştirir.

Sıklıkla olduğu gibi, büyük ilerleme gösteren açı, biri doğumda birçok armodine sahip olan ve diğeri de doğumda birçok uyumsuzluğa sahip olan iki gezegen arasındaysa, olayın görünümden etkilenen ortalama yararı veya zararı çok yakından olabilir. açının ortalama uyumu veya uyumsuzluğu ile belirtilir, ancak aynı zamanda bazı olaylar veya aynı olaylar, uyumsuz doğum haritası gezegeni tarafından yönetilen yaşam bölümü için belirgin bir zarar veya kayıp olabilir. Örneğin, sevilen birinin ölümü ciddi bir kişisel kayıp anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda çok değerli bir mali miras da getirebilir. Veya uyumlu bir evlilik, ona karşı çıkan arkadaşların soğumasına neden olabilir.

İlgili gezegenlerin doğum haritası uyumsuzluğu çok büyük olduğu için, ilerlemiş bir üçgenin hayata kayıp ve keder getirdiği durumlar meydana gelir. Ve diğer durumlarda meydana gelir

ki, ilgili gezegenlerin doğum haritası uyumu çok büyük olduğu için, ilerlemiş bir kare veya karşıtlık hayata iyi şans getirir. Bu nedenle, ilerlemiş bir yönün olumlu veya olumsuz olup olmadığını ve ne kadar olduğunu tahmin ederken, ilerlemiş açıdan dahil olan her gezegenin uyumu veya uyumsuzluğu tahmin edilmelidir. Ve eğer ilgili gezegenlerden biri çok fazla uyuma sahipse, yönettiği yaşamın bölümleri herhangi bir ilerleme yönünden çok fazla acı çekmeye eğilimli değildir. Ancak, ilgili diğer gezegen çok fazla uyumsuzluğa sahipse, yönettiği yaşamın bölümleri ağır bir uyumsuz ilerleme yönünden ciddi şekilde acı çekmeye ve ağır uyumlu gelişmiş bir açıdan çok az fayda sağlamaya eğilimlidir.

Hem gelişmiş bir açıdan beklenecek ortalama fayda veya zarar hem de etkilenen yaşamın her bölümünden beklenecek fayda veya zarar, sayfa 200-202'de verilen kurallara göre uyumlar ve uyumsuzluklar açısından oldukça hassas bir şekilde hesaplanabilir. Bölüm 7 (Seri Ders 203), Kurs XVI,*yıldız şifa*. Ancak bu yapılmadan önce, iki gezegenin her birinin doğum haritası gücü ve uyumu ve ilerlemiş yönün uyumu veya uyumsuzluğu hesaplanmalıdır. Bu hesaplamalar Ders XVI'da açıklanmış ve örnekler verilmiştir.*yıldız şifa*. Ancak, doğum haritasındaki uyumun ya da gezegenlerin ilerlemiş bir açıya dahil olan uyumsuzluğunun bu şekilde kesin olarak hesaplanıp hesaplanmadığı veya sadece inceleme yoluyla tahmin edilip edilmediği, olayın kaderini veya talihsizliğini değerlendirirken, doğumun ilerlemiş bir yönü tarafından cezbedilmesi muhtemel olay veya koşullar. İçinde yer alan her gezegenin harita uyumu veya uyumsuzluğu her zaman dikkate alınmalıdır.

Uygun İlerlemeler Altında Ne Yapmalı?

Güneş

Güneş tarafından haritalanan düşünce hücreleri sinir akımları ile çok yakından ilişkili olduğundan, Güneş'in olumlu yönüne karşılık gelen duygu, mümkün olduğunca tutarlı ve güçlü bir şekilde tutulmalıdır, böylece tüm elektromanyetik forma hakim olan uyumlu enerjileri olacaktır. Toplanan Kuvvetler olarak astral bedenin diğer bölümlerine girme yollarını bulurlar ve böylece yaşamın mümkün olduğu kadar çok bölümünden faydalanırlar.

Böyle bir ilerlemenin altındaki kişi, önemini ve etkisinin kapsamını artırmak için alışılmadık bir çaba göstermelidir. Koşulları şekillendirme Gücünün arttığını görecek ve bu nedenle kendisini amaçlarına daha uygun çeşitli çevresel faktörleri şekillendirmeye güçlü bir şekilde yönlendirmelidir. Bu çabada, kendi eğilimlerine normalden daha elverişli bir konumda veya etkide bulunanları bulacaktır; ve bu tür bağlantıları kurmak için özel bir çaba sarf etmelidir.

Özellikle kadınlara karşı erkek cinsiyet daha nazik olacak ve yardımları istenebilecek. Onlara göre bu yön, kalıcı ekler yapmak için elverişlidir.

Güneş'in dahil olduğu olumlu bir ilerleme yönü altındaki Kişi, emrinde, zihnini ve eylemlerini ısrarla bir şeyin başarılmasına yönlendirirse, düşünce hücrelerinin onun gerçekleşmesi için alışılmadık derecede güçlü psikokinetik güç kullanmasını sağlayan hayati bir rezerve sahip olacaktır.

Elbette, böyle bir zamanda, Güneş'in ve açıya dahil olan diğer gezegenin ev konumlarının gösterdiği şeyleri başarmak daha kolaydır. Yönlendirilmemiş, düşünce hücreleri bu şekilde belirtilen yaşam bölümüne ait olayları çekecektir. Ancak, Toplayıcı Kuvvetler olarak güçleri nedeniyle, Güneş enerjileri, hemen hemen her türlü başarı biçimine kolayca yönlendirilebilir.

Bu nedenle, böyle bir Güneş ilerlemesinden en iyi şekilde yararlanmak için, bireyin neyi başarmayı veya çekmeyi arzuladığını kesinlikle bilmesi gerekir. O zaman bu amacı sürekli aklında tutmalı ve onu gerçekleştirmek için ısrarla ve sarsılmaz bir güvenle çalışmalıdır.

Uygun İlerlemeler Altında Ne Yapmalı? Ay

Güneş'inkinden daha alıcı ve dalgalı olmasına rağmen, Ay tarafından haritalanan düşünce hücrelerinin elektromanyetik form ve sinir akımları ile de yakın bir ilişkisi vardır. Anten üzerinden onlara gelen enerjiler, yaşamın diğer bölümlerini etkilemek için kolaylıkla Toplanan Kuvvetler haline gelir, düşünce hücrelerini yönetir ve ayrıca bazı geçici yıldız antenleri tarafından da erişilir.

Ancak, uyumlu veya uyumsuz gezegenlerden gelen enerjiler, yalnızca duygular onlara yanıt verdiğinde Toplanan Kuvvetler haline gelir. Ay'ı içeren olumlu gelişmiş yönleri en geniş ölçüde kullanacaksak, bu nedenle, getirdikleri uyum ve coşkuyu hissetme yeteneğini geliştirmeliyiz. Bunun yerine, alışkanlık veya irade yoluyla daha az hoş bir titreşime bağlı kalırsak,

Ay'dan gelen enerjiler, ancak daha direkt olarak ulaştıkları düşünce hücrelerinin faaliyetleri ile olumlu bir etkiye sahip olabileceklerdir.

Ay ve açıya dahil olan diğer gezegen tarafından işgal edilen evler, uygun koşulların en büyük kolaylıkla çekilebileceği yaşam bölümlerini gösterir. Genel olarak halkla temas, tanıtıma yönelik çabalar ve bir bütün olarak Ev işleri gelişme eğilimindedir. Erkeklere, özellikle kadınlara karşı nazik olunacak ve yardımları istenebilecektir.

Yaşam boyunca oldukça sık aralıklarla, Büyük İlerlemiş Ay, doğum haritasına ve büyük ilerleme konumlarına olumlu yönler verir. Bu nedenle, kesinlikle yararlı olabilecek gezegensel titreşimlere uyum sağlamak için tekrar tekrar fırsat mevcuttur. Kişi, açıya dahil olan diğer gezegenin karakteristik enerjisini dikkate alarak doğasını değerlendirirse ve Zihnini ve Duygularını bu titreşim hızına ayarlı tutmak için sürekli bir çaba gösterirse, bu olumlu titreşimlere olağanüstü bir güç verecektir. Bu şekilde sinir akımları bu uyumlu enerjiyi büyük bir hacimde toplayacak ve zamanın onun baskın titreşim hızı olmasına neden olacaktır.

İnsanlar, onlara uyum sağlamak için kolayca erişilebilen uyumlu bir enerji kaynağı sağlayarak, Ay'ın olumlu gelişmiş bir yönünün bile kendilerine sunduğu fırsatları anlasalardı, şu anda hayal etmeye cesaret edemeyecekleri olasılıkları açacaktı.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler
Merkür

Merkür'ün dahil olduğu herhangi bir ilerlemiş yön, bilinçli düşüncenin ifadesi ile ilgili düşünce hücrelerine ek enerji verir. Yani, serebral süreçler normal aktiviteden daha fazla uyarılır; ve bu şekilde uyarılan düşüncelerin eğilimi, Merkür'ün açıya dahil olduğu gezegenin özellikleri tarafından güçlü bir şekilde renklendirilecektir. Bu düşüncelerin esas olarak etrafında döndüğü şeyler, Merkür ve açıya dahil olan diğer gezegenin bulunduğu evler tarafından yönetilenlerdir.

Bu bilinçli düşüncelerin, sinir sistemini ve sinirler üzerinden akan elektrik enerjilerini, karşılık gelen bir frekans ve eğilime sahip iç düzlem titreşim oranlarında ayarlama işlevi vardır. Aslında, insanın kendi kaderini şekillendirmek için en büyük gücü, bilinçli olarak yetiştirilen düşünce ve duygular aracılığıyladır. Düşüncesi için uygun özne seçimi yoluyla, tüm elektromanyetik formunu benzer titreşim hızlarına ayarlayabilir ve onları radyo modası ile alabilir ve böylece kendisini istenen kalitedeki enerjilerle doyurabilir.

Bu enerjiler daha sonra Toplanma Güçleri olarak hareket eder ve yaşamın çeşitli bölümleriyle ilgili yıldız hücrelerine uyumlu titreşim hızlarını ekleyerek, o sırada astral bedeninde mevcut olabilecek tüm geçici yıldız antenlerinin üzerinden akar. Bu hücreler böylece yeni bir enerji kazanırlar ve kendilerini iyi hissettikleri için psikokinetik güçlerini kendi bölümleriyle ilgili talihli olayları yaşama çekmek için kullanırlar. Düşünceler ve duygular, karakterin ve kaderin arzu edilen amaçlara göre şekillendirilebileceği araçlardır.

Bununla birlikte, Merkür'ün dahil olduğu ilerlemiş bir açıda, açının terminalleri tarafından haritalanan yıldız hücrelerine olağandışı enerji erişimi tarafından uyarılan düşünceler yönetilmedikçe ve sabitlenmedikçe, sinirsel acele ve telaşa, sinirsel bir duruma yol açabilirler. gerilime veya karakter olarak tamamen uyumlu ve yapıcı olmayan duygulara. Bu nedenle, Merkür'ün dahil olduğu en uygun yön altında bile, düşünmeyi sakin, istikrarlı ve uyumlu bir şekilde seçilmiş bazı yapıcı kanallara yönlendirmek iyidir. Bunu yapmak ve düşüncelerin dağılmasını veya gereksiz gerilimlerin gelişmesini önlemek için Güç düşüncelerinin ve Dinsel düşüncelerin yetiştirilmesinde çaba harcamak gerekebilir.

Merkür'ü içeren olumlu ilerlemeler, düşüncelerin ifadesine kolaylık ve başarı sağlar. Bu nedenle, yetenekler hangi yönde olursa olsun, konuşmaya, yazılı sözleşmeler düzenlemeye, ders vermeye, öğretmeye, yazmaya, yayınlamaya veya herhangi bir düşünce ürününü başkalarına sunmaya elverişlidirler.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler Venüs

Venüs'ün getirdiği lütuflar büyük ölçüde dostluk ve diğerlerinin nazik ofislerinden gelenler olduğundan, eğer Venüs'ü içeren olumlu bir ilerlemeden en çok şey yapılacaksa, insan temaslarının sağlanması esastır.

Venüs, her türlü sanatsal ifadeye, sevişmeye ve genel olarak sevgi konularına yardımcı olur. Bu nedenle, bu çıkarlar, arzu edilir görünüyorlarsa, böyle bir zamanda geliştirilebilir. Ama bu konuların dışında daha açık bir şekilde

Venüs tarafından yönetilen, dostluk yoluyla iletilebilecek diğer çıkarlar zorlanabilir.

Venüs, en az direnç çizgisini bu kadar çok aradığı için, iyi ilerlemelerinden en fazla fayda nadiren elde edilir. Eğilim sadece mutlu bir zaman geçirmek ve onun cömertliğinin sunduğu bu tür zevklerin tadını çıkarmaktır. Ancak başkalarının iyi dilekleri, yardımcı önerileri ve daha fazla maddi desteği, eğer uygun bir inisiyatif alınırsa, çoğu zaman daha önemli bir hedefe götürmek için yapılabilir.

Zevk arayışındaki aşırılık, Venüs'ün dahil olduğu olumlu bir ilerleme altında bile gelişebilir; ancak neşe, canlılık ve hayata mutlu bir bakış açısı da böyle bir ilerlemede başkalarını kişiye çeken ve onu tercih etmelerine neden olan niteliklerdir. Bu nedenle, zevkten ve başkalarının toplumundan kaçmak yerine, insanlarla kaynaşmak, onlarla samimi olmak, onların mutluluk ve neşesine vesile olmak için alışılmadık bir çaba gösterilmelidir.

Venüs'ün dahil olduğu olumsuz bir ilerleme olduğunda Güvenlik düşünceleri faydalı olsa da, Venüs'ün dahil olduğu olumlu bir ilerleme altındayken bunların gereksiz şekilde yetiştirilmesi coşkuyu azaltır ve başkalarının hissettiği bir ürperti yaratır. Maksimum faydayı çekmek için Venüs'ün Sosyal düşüncelerinin kendiliğinden ifade etmesine izin verilmeli ve hatta teşvik edilmelidir. Herkesi rahatlatma, kendisinin eğlendiğini görme, başkalarının arkadaşlığından zevk alma ve mutluluğun ışığını her tarafa yayma çabası, Venüs'ün iyi talihi çekmesi için olumlu bir ilerleme için en iyi fırsatı sunar.

Olumlu Bir İlerleme Altında Ne Yapmalı? Mars

Mars'ın kazandığı her şey, enerji harcaması, olağandışı inisiyatif, yaratıcı güç, saldırganlık ve çekişme yoluyla gelir. Bu nedenle, Mars'ı içeren olumlu bir yönün bile çektiği koşulların antagonizmalardan arınmış olmasını beklememize gerek yok. Çekişme genellikle kaçınılmazdır; ancak olumlu ilerleme, muhalefete rağmen kazanımların elde edilmesini sağlayan ek enerji ve kaynakları sağlar.

Makine satın almak veya işlemek için böyle bir yön şanslıdır. O zamana sunulan cerrahi operasyonlar alışılmadık bir beceriyle ele alınacaktır. Düşmanlar daha kolay yenilecek. Ama görünüş son derece uyumlu olsa da tehlikelerin çekimini engellemez. Hem konuşmada hem de eylemde acele ve dürtüden kaçınmak için kasıtlı bir girişim olmalıdır.

Mars'ı içeren olumlu bir ilerleme için bir şey ve sadece bir şey gereklidir. Tüm enerjileri azami ölçüde yapıcı kanallara yönlendirmektir. Bu, enerjilerin dizginlenmesi gerektiği anlamına gelmez, ancak onları yıkmak için değil, inşa etmek için kullanmaları gerekir.

İnisiyatif ve enerji egzersizi yoluyla kişi, özellikle Mars'ın ve açıya dahil olan diğer gezegenin ev konumları tarafından belirtilen arzularını ve hırslarını iletebilir. Ve yalnızca yapıcı tutumu izleyerek, antagonizmalar ve çekişmeler geliştiğinde, kesinlikle olacakları gibi, onlara ne kadar az ilgi gösterilirse o kadar iyi olur. Genellikle, fark edilmezlerse kısa sürede azalırlar.

Savaşmak kaçınılmazsa, kazanma şansı da normalden daha yüksektir; ancak kişi, enerjilerini tamamen gerçek bir başarı hedefine yöneltebildiği ölçüde, Mars'ı içeren olumlu bir görünüm altında tatmin edici bir ilerleme kaydedilecektir. Mars'ın altında, iç düzlem havası sabrı geliştirin ve sakin olun.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler
Jüpiter

Jüpiter, iyi talihi çekmek için en güçlü etkidir. Bunu, başkalarının hissettiği ve iyilik yapma arzusuyla karşılık verdiği bol iyimserlik ve iyi arkadaşlık yoluyla yapar.

Jüpiter, İş gezegenlerinden biridir ve olumlu ilerlemeleri, yatırımlar, ticaret ve profesyonel ilerleme için avantajlıdır. Etkisi, iyi ödeme yeteneği olanlardan himaye çekmektir. Kulüpler, topluluklar veya daha doğrudan satıcılık yolu aracılığıyla başkalarıyla temaslar aranmalıdır.

Bu, satışın en kolay ve en iyi şekilde yapılabileceği ilerlemedir. Para toplamak da bu zamanda o kadar zor değil.

Yardımseverlik, iyi niyet ve yardımseverlik duygusuyla gelen diğer kişilerden, bireyle temasları yoluyla geldiğinden, uygun temaslar teşvik edilmelidir. Aslında yardım etmeye gücü yetenlerle temasa geçmek ve bu tür toplantılar vesilesiyle bir dolu, iyi karşılanmış bir ortam yaratmak için hiçbir çabadan kaçınılmamalıdır.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler
Satürn

Satürn'ün etkisiyle elde edilebilecek kazanımlar, sıkı çalışma, ekonomi, organizasyon, sistem, kurnaz pazarlık, sorumlulukları omuzlama ve inatçı azim ile sağlanır.

Yönetim ve görevlerin başkalarını tatmin edecek şekilde yerine getirilmesi yoluyla çekilen iş ve sorumluluğu kabul ederek, böyle bir ilerleme altında kalıcı ilerleme sağlanabilir. Yaşlı insanlarla ve muhafazakar bir dönüşe sahip kişilerle temaslar, ilerleme için fırsatlar getirme eğilimindedir. Bu, satın alma yapmak için tüm gelişmiş yönlerin en iyisidir. Düşük bir fiyata satmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Satürn, İş gezegenlerinden biri olduğu için, iş dünyasında organizasyon, yeniden düzenleme veya maliyet tasarrufu yöntemleri başlatılabilir. Ancak o, o kadar olumsuzdur ki, en elverişli ilerlemeleri altında bile, Güç düşüncelerinin cesaret ve canlılık vermek için biraz uygulamaya ihtiyacı vardır. Ve zihnin ciddi problemler üzerinde çok fazla durmasını önlemek için, sosyal temaslar ve Sosyal düşüncelerin teşvik edilmesi, Satürn'ün dahil olduğu olumsuz bir ilerleme olduğunda olduğundan daha az önemlidir. Satürn'ün iç düzlem havası altında çenenizi yukarıda tutun ve neşeyi geliştirin.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler
Uranüs

Zihinsel uğraşlara, özellikle astroloji ve okültizm çalışmasına olumlu bir ivme kazandırılır. keşif,

buluş, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve karmaşık makinelerin ve elektrikli cihazların kullanımı da şanslıdır.

Böyle kullanılırsa, entelektüel ve hatta belki de ruhsal ilerleme için tüm etkilerin en güçlüsü haline getirilebilir. Elektromanyetik enerjiler, bireye hitabet veya daha yakın çağrışımlar yoluyla, başkalarını istediği gibi yapmaya zorlamasını sağlayacak şekilde güçlü bir şekilde yüklenir. Şanslı olduğunu kanıtlayan ani değişikliklere yönelir; özellikle yeni zihinsel manzaralar açarken.

Böyle bir ilerleme altında, bir kişi belirli bir süre boyunca belirgin bir etkiye sahip olmak için genellikle yaşamın içine çekilir, ancak bağlanma nadiren kalıcıdır. Bununla birlikte, insan temasları yoluyla ani ve şaşırtıcı fırsatlar gelebilir. Aslında, olan ani ve beklenmedik bir durumdur ve birey ortaya çıkan herhangi bir durumdan yararlanmaya hazır olmalıdır.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler Neptün

Bu tür ilerlemeler gezileri ve eğlenceyi destekler ve muhtemelen psişik fenomenleri araştırmak ve psişik melekelerin gelişimi için en iyisidir. Büyük boyutlu projeler sunulabilir, ancak nadiren beklenen faydaların küçük bir kısmından fazlasını sağlarlar.

Bu, görünüm geçtikten sonra sağlam bulunursa, yaşamda kalıcı amaçlar olarak benimsenebilecek yeni idealler getirmek için iyi bir etkidir. Hepsi dramatik ve sanatsal

çabalar tercih edilir ve görünmeyen kaynaklardan gelen ilham hazırdır. Böylece yaratıcı çalışmalar olağanüstü bir kolaylıkla yürütülür.

Tüm okült, mistik ve astrolojik arayışlar teşvik edilir. Bu, gerçek ruhsal ilerleme için tüm etkilerin en iyilerinden biridir.

Olumlu Gelişmeler Altında Yapılması Gerekenler

Plüton

Başka hiçbir gezegenin etkisi altında, Neptün tarafından teşvik edilen psişik duygu ve izlenimler yoluyla değil, doğrudan düşünce alışverişi yoluyla görünmeyen dünyanın zekalarıyla temas kurmak bu kadar kolay değildir.

İç düzlemdekilerle bu doğrudan birliktelik tehlikesiz değildir. Arzular ve düşünceler bencil ise, bu şekilde ayarlananlar da benzer bir eğilime sahip olacaktır. Görünmeyen varlıkların yaşamları üzerindeki etkisi, bu nedenle, kim olduklarını iddia ederlerse, eleştirel incelemeye ihtiyaç duyar.

Bir an için asla ayrım yapma gücünden vazgeçmemeli veya kontrole izin vermemelidir. Dikkatli bir analizden sonra, bu tür kaynaklardan elde edilen bilgiler Evrensel Refah için kullanılabilirse, iyi ve iyi. Ancak Plüton'un, gerçekte ifadelerini kısıtlarken ve gereksiz kısıtlama uygularken, insanları başkalarına yardımcı olduklarına sık sık ikna eden ince, tersyüzlü bir yanı vardır.

Pluto'yu içeren olumlu bir ilerleme, grup etkinliği ve işbirliği için fırsat sağlar; Bazı değerli nedenleri iletmek için başkalarıyla birleştiği için. Böyle bir ilerleme altında temasa geçilebilecek olan daha ince yanı, dünyanın en manevi yönüdür.

tüm etkiler; ve böylece başkalarına fayda sağlamak ve Manevi Gelişimde bireye en üst düzeyde vermek için yapılabilir.

Uygun İlerlemeler Altında Ne Yapmalı? MC

MC'yi içeren ilerlemiş bir görünüm, gezegen tarafından haritalanan dinamik yıldız yapısı ile bu yayın istasyonu arasında geçici bir yıldız anteni oluşturur. Alınan başlıca enerji, ilgili gezegeninkidir. Bu nedenle, bu gezegen olumlu ilerlemeler içindeyken ne yapılması gerektiği başlığı altında verilen talimatları uygulayın ve burada belirtilen düşünceleri mümkün olduğunca güçlü ve uyumlu bir şekilde onur, iş ve tanıtım ile ilgili düşüncelerle ilişkilendirin. Ve özellikle açıyla ilgili gezegenin özellikleri ve işgal ettiği ev aracılığıyla bu üç konuyu iletmek için tüm fırsatlardan yararlanmaya özen gösterin.

Olumlu Gelişmeler Altında Ne Yapmalı? Asc dahil.

Asc'yi içeren gelişmiş bir yön. gezegen tarafından haritalanan dinamik yıldız yapısı ile bu topraklama kablosu arasında geçici bir yıldız anteni oluşturur. Alınan başlıca enerji, ilgili gezegeninkidir. Bu nedenle, bu gezegen uygun ilerlemeler içindeyken ne yapılması gerektiği başlığı altında verilen talimatları kullanın ve orada belirtilen düşünceleri sağlık, kişilik ve kişisel ilişkilerle ilgili düşüncelerle mümkün olduğunca güçlü ve uyumlu bir şekilde ilişkilendirin. Ve hepsinden yararlanmak için acı çek

Bu üç konuyu, özellikle açıya dahil olan gezegenin özellikleri ve işgal ettiği ev aracılığıyla iletme fırsatları.

Uygun İlerlemelerin Toplanma Kuvvetleri Olarak Kullanılması

Çoğu zaman, aynı anda bir derece etkili küre içinde hem olumsuz hem de olumlu bir ilerleme yönü vardır. Düşünce hücrelerine, gezegenlerine özgü düşünce tiplerini ve görünümün doğasını düşünerek, olumsuz ilerlemiş açı tarafından haritalanan enerji ne kadar fazla verilirse, olumsuz olayları hayata getirmek için o kadar fazla psikokinetik güç kazanırlar. Ve birey, ilgili gezegenlerin ve yönettikleri evlerin karakteristiği olan çevresel faktörlerle ne kadar yakın ilişki kurarsa, talihsiz olayları hayata geçirmek için bu psikokinetik güç o kadar büyük kolaylıklar sağlar.

Birey, bunun yerine, olumlu bir ilerleme yönüne dahil olan aynı zamanda gezegenlerin karakteristik çevresel faktörleri ile yakından ilişki kurduğu ölçüde ve yönettikleri evler, haritaladıkları düşünce hücreleri, hayata talihli olayları getirmek için olanaklara sahip olacaktır. Olumsuz ilerlemiş açıya dahil olan gezegenlerin ve yönettikleri evlerin karakteristik çevresel faktörlerinden kaçınarak, kullanabilecekleri her türlü psikokinetik güce karşı çevresel direnç olacak ve bu da çekebilecekleri olayın talihsizliğini azaltacaktır.

Ve eğer birey, olumlu ilerlemiş veçhede yer alan gezegenlerin karakteristik uyumlu titreşimleri hakkındaki düşünceleri ve hisleriyle ayarlanmaya devam ederse, düşünce hücrelerine sadece ek enerji sağlamakla kalmaz.

şanslı olayları hayata geçirmek için psikokinetik güçlerini artıracak, ancak aynı zamanda, o sırada tek bir etkililik derecesi dahilinde olan tüm gelişmiş yönlerin antenlerinin ulaştığı tüm yıldız hücrelerine daha fazla uyum sağlamak için Toplanma Kuvvetleri olarak hareket edeceklerdir. küre

Bireyin duygu ve düşünceleri belli bir titreşim kalitesine ayarlandığında, elektrik enerjisi olan sinir akımları, bu kalitedeki astral enerjinin iletkeni haline gelir ve onu, astral bedenin tüm yıldız antenlerine kolaylıkla taşır. Bir gezegenin ahenkli duygu karakteristiğini korumak, olumlu bir gelişmiş açıyla ilgiliyken, olumsuz bir gelişmiş açıdan dahil olduğunda veya ilerlemiş bir açıdan dahil olmadığında olduğundan çok daha kolaydır. Ve bu duygu durumu korunduğu sürece, tüm antenlerin uç noktalarındaki yıldız hücreleri tarafından alınan başlıca astral enerji bu türdendir. Böylece, yalnızca olumlu gelişmiş yönün uçlarındaki yıldız hücreleri değil, diğer yıldız antenlerinin uçlarındaki düşünce hücreleri de ek uyumlu enerji alır. özellikle diğer gelişmiş yönlerin uç noktalarındakiler de bu uyumlu enerjiyi alırlar, bu da onlara daha uyumlu arzular verme eğilimindedir. Ve böylece arzuları daha uyumlu bir şekilde koşullandırılarak, arzularının uyumlu Toplanma Kuvvetleri tarafından bu şekilde etkilenmemiş olmalarından daha elverişli olan yaşam olaylarını hayata geçirmek için sahip oldukları psikokinetik gücü kullanacaklardır.

Küçük-İlerlemelerin Takip Edilmesi ve Transit Aşamalı Pozisyonlar

Ay'dan daha ağır bir küçük-ilerlemiş açının, o sırada büyük-ilerlemiş bir açıdan etkilenen terminallerden birine ne zaman oluştuğunun önceden bilinebilmesi için, küçük-ilerlemiş konumları takip etmek özellikle önemlidir. bir etkili küre derecesi; Bu tür olaylar için, ana-ilerlemiş yönün getirdiği gibi, bu şekilde belirtilen gücün zirvelerinden birinde meydana gelecektir. Bu nedenle, bu tür her bir takviye periyodu sırasında özel ihtiyati tedbirler alınmalıdır.

Mip'teki küçük ilerlemeli Ay. D. aynı işarete ulaşır, ° ve Ay doğum haritasında yer alır. Bu nedenle, küçük ilerlemeli pozisyonları takip etmenin iyi bir yolu, ilk önce Mip'i bulmaktır. D. Geçerli takvim yılı için ve kısa ömürlü olarak, takvim yılının tarihi ile işaretleyin. Sonra efemeris içinde Ay'ın Mip'teki konumuna geri dönün. D. önceki takvim yılının ve Ay'ın Mip'teki pozisyonunun önünde. D. takip eden yılın D. ve bu günleri bu takvim yıllarının tarihleriyle efemeriste işaretleyin.

Ay, küçük ilerlemeyle günde yaklaşık 1° hareket ettiğinden, küçük ilerlemeli Ay'ın işgal ettiği burcun derece sayısının takvim ayının gün sayısıyla ilişkisi yaklaşık olarak sabittir. Doğumda ayın gün sayısının önünde veya arkasında °s sayısı, herhangi bir ayın gün sayısından yaklaşık °s küçük-ilerlemiş Ay'ın ilerisinde veya gerisindedir. Bu farka Ay Sabiti denir. Doğum gününden sonraki her tam ay,

küçük ilerlemiş Ay, sonraki bir burçta, ancak yaklaşık olarak doğumdakiyle aynı derecede. Böylece, takvim yılının doğum gününden başlayarak Ay Sabiti'ni ve Mip'teki doğumla aynı burçta ve °'de küçük-ilerlemiş Ay'ı dikkate alarak. D. o takvim yılı için, Mip'ten efemeris içinde ileri veya geri hareket ederken. D., gezegenlerden herhangi birinin bir doğum haritasına veya büyük-ilerlemiş terminale açı yapmaya yakın olduğu takvim tarihini yalnızca inceleme gösterecektir. Böylece görünümün mevcut olacağı yaklaşık takvim tarihini belirledikten sonra, bu MED, görünümün ne zaman mükemmel olduğunu ve önemli bir ilerleme durumunu pekiştiriyorsa, içeri girdiğinde ve ayrıldığında hesaplamak için kullanılabilir. bir derece etkili küre.

Gezegenlerin geçiş konumları bir doğum haritasına sahip bir açıya yakın olduğunda veya büyük ilerleme konumu yalnızca belirli bir takvim yılı için efemeris taranarak tespit edilebilir. Ancak küçük ilerlemeli ve transit ilerlemeli MC ve Asc'nin pozisyonları için. MCC kullanılmalıdır.

MM'den önceki işareti değiştirin ve ilerlemiş Güneş tarafından işgal edilen ° ve ' işaretine cebirsel olarak ekleyin. Bu, ilerlemiş MC'ye verir. İlerlemiş MC, ilerlemiş Güneş ile aynı mesafeyi hareket ettirir, ilerleyen Güneş'in hareketini MC'ye zihinsel olarak eklemek, MC'nin bir görünüm oluşturduğu MED veya Transit Tarihini gösterecektir. Aynı zamanda, MC'nin bu ilerlemesi için evlerin bir tablosunu taramak, Asc'ın üzerinde bulunduğu MED veya Transit Tarihini gösterecektir. zodyak bir görünüm oluşturur. Aynı zamanda, sayfa 162'deki House Cusp Declinations Tablosunu da tarar.

ilerledikçe MC ve Asc. ileriye doğru hareket, MC veya Asc'nin üzerinde bulunduğu MED veya Transit Tarihini gösterecektir. doğum haritası veya büyük ilerleme pozisyonu ile paralel bir görünüm oluşturur.

Küçük-İlerlemiş Gezegenler Tarafından Yapılan Görünümlerin Hesaplanması

Aşağıdaki örneklerde ve Bölüm 5'tekilerde (Seri Ders 114), Greenwich öğlen için küçük ilerlemeli konumlar hesaplanır ve küçük ilerlemeli yönler en yakın takvim gününe hesaplanır. Ancak, bireyin şu anda ikamet ettiği yerde günün belirli bir saati için transit Güneş'in kesin değerini veya geçiş yapan Güneş, görünüm mükemmel olduğunda işgal ettiği kesinliğe ulaştığında, bireyin şimdi ikamet ettiği günün saatini hesaplayarak, küçük ilerlemeli pozisyonlar ve küçük ilerlemeli yönler, yarım saatlik takvim zamanından daha az bir hassasiyetle tespit edilebilir. Böylece günün belirli bir saatinde transit Güneş'in konumunun nasıl belirleneceği ve günün herhangi bir konum için belirli bir zodyak boylamına ulaştığı zaman Bölüm 7'de (Seri Ders 116) açıklanmaktadır.

Küçük ilerlemelerin hesaplanacağı takvim yılı için bir efemeris mevcut olmadığında, transit Güneş'in konumunu tespit etmek için aynı yüzyıl için bir efemeris kullanın (1900 artık yıl değildi) ve bir yıl olan bir yıl kullanın. verilen takvim yılına eklenen veya çıkarılan 4'ün katları. Böylece 1980 yılı için, 32 yılı çıkarın ve 1948'deki aynı tarihi kullanın. Belirli bir takvim yılı için efemeris bu şekilde kullanılmadığında, geçen Güneş'in konumunda birkaç hata olacaktır, ancak konumu yeterince kesin olacaktır. pratik amaçlar için.

Herhangi bir takvim tarihi için küçük ilerlemeli pozisyonları bulmak ve herhangi bir küçük ilerlemeli yönün mükemmel olduğu takvim tarihini bulmak için kurallar Bölüm 5'te (Seri Ders 114) verilmiştir.

Örnek 1. Sayfa 163'te verilen tablo 3b için, 22 Mart 1937 için tüm küçük-ilerlemiş pozisyonları hesaplayın: Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre hesaplanan MCC, eksi 0S 5° 32' . Güneş'in konumu, 4S 6° 42' Ay'ın konumundan, 9S 8° 27' çıkarıldığında, Güneş Sabitini eksi 5S 1° 45' olarak verir.

22 Mart 1937'deki efemeris, Güneş 1 Koç'u gösteriyor 27. SC'den önceki cebirsel işareti değiştirmek ve 5S 1° 45' ile 1S 1° 27' eklemek, küçük ilerlemeli Ay'ın konumunu 3 Başak 12 olarak verir.

1937 doğumdan 17 yıl sonra olduğu için, Bölüm 5'in 130. sayfasındaki Küçük İlerleme Tarihi Tablosuna başvurarak (Seri Ders 114), orada bulunan 1y 3mo 9d'yi doğum tarihi olan 1920y 6mo 28d'ye ekleriz ve yaklaşık Mip'i buluruz. D. 7 Ekim 1921'dir. 22 Mart doğum gününden önce olduğu için, efemeriste Ay 8 Başak 01'i bulduğumuz 29 Eylül 1921'e geri dönüyoruz. Bu MED.

8 Başak 01, 3 Başak 12'yi (d) 4° 49' geride bıraktı.

28 Eylül ile 29 Eylül 1921 arasında, Ay (c) 14° 49' hareket ediyor.

28 Eylül ile 29 Eylül 1921 arasında, Güneş (a) 59' hareket ediyor.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) Günlüğe kaydetmek için 1.3875. (d) .6975 verir 2.0850. Günlük çıkarma. (c) 2.0850'den .2095, günlük olan 1.8755'i verir. (b) 19' Güneş tarafından seyahat. 28 Eylül ile 29 Eylül 1921 arasındaki günlük hareketini (a) olarak kullanarak, böylece her gezegenin yolculuğu bulunabilir. Bu seyahatin 29 Eylül 1921'deki konumundan çıkarılması, 22 Mart 1937'deki küçük ilerlemeli konumunu verir.

Güneş'in bu şekilde bulunan küçük-ilerlemiş konumu 5 Terazi 29'dur. MCC'den önceki cebirsel işareti değiştirerek, Güneş'in bu konumuna OS'sini 5° 32' ekleyin ve küçük-ilerlemiş MC'yi 11 Terazi 01 olarak verir. 11 Libra 01 40-40N enleminde MC'deyken Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yöntem. 19 Yay 36, Yükseliş'te. Bu minör ilerlemiş Asc. 22 Mart 1937 için küçük ilerlemeli zodyak pozisyonları, sayfa 163'teki çizelgenin dışında verilmiştir. Meyilli pozisyonlar benzer bir şekilde bulunabilir.

Örnek 2. Sayfa 164'te verilen 318b çizelgesi için, 24 Mayıs 1941 için tüm yan ilerleme pozisyonlarını hesaplayın: Bölüm 2'de verilen yönteme göre hesaplanan MCC, eksi 2S 23° 57'. Ay'ın konumu, 2S 17° 48' Güneş'in konumundan, 9S 2° 27' çıkarılması, Güneş Sabitini artı 6S 14° 39' olarak verir.

24 Mayıs 1941'deki efemeris, Sun 2 İkizler'i gösteriyor 55. SC'den önceki cebirsel işareti değiştirmek ve 6S 14° 39' değerini 3S 2° 55' değerinden çıkarmak, küçük ilerlemeli Ay'ın konumunu 18 Akrep 16 olarak verir.

1941 doğumdan 21 yıl sonra olduğu için, Bölüm 5'in 130. sayfasındaki Küçük İlerleme Tarihi Tablosuna başvurulur (Seri

Ders 114), orada bulunan 1y 6mo 28d'yi doğum tarihine, 1920y 11mo 24d'ye ekliyoruz ve yaklaşık Mip'i buluyoruz. D. 22 Haziran 1922'dir. 24 Mayıs doğum gününden önce olduğu için, efemeriste Ay 18 Akrep 16'yı bulduğumuz 7 Haziran 1922'ye geri dönüyoruz. Bu sadece MED değil, aynı zamanda Ay'daki Ay olarak efemeris, 24 Mayıs 1941'de küçük-ilerlemiş Ay'ın tam ° ve ' dir, gezegenler için herhangi bir hesaplamaya gerek yoktur. Onların küçük-ilerlemiş pozisyonları, 7 Haziran 1922'de efemerlerde verilen pozisyonlarıdır.

Güneş'in bu şekilde bulunan küçük-ilerlemiş konumu 15 İkizler 56'dır. MCC'den önceki cebirsel işareti değiştirerek, Güneş'in bu konumuna 2S 23° 57' ekleyin ve bu küçük-ilerlemiş MC'yi 9 Başak 53 olarak verir. Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yöntemle, 9 Başak 53, 39K. enleminde MC'deyken, 27 Akrep 03, Yükseliş'tedir. Bu minör ilerlemiş Asc. 24 Mayıs 1941 için küçük ilerlemeli zodyak pozisyonları, sayfa 164'teki çizelgenin dışında verilmiştir. Meyilli pozisyonlar benzer bir şekilde bulunabilir.

Örnek 3. 163. sayfada verilen çizelge 3b için, büyük ilerleme gösteren Merkür'ün Uranüs ile kavuşum yaptığı takvim tarihini bulun.*r*1924'te küçük ilerlemeli Venüs üçgeni Uranüs tarafından güçlendirildi*r*.

Bu büyük-ilerlemiş yön, 1 Ocak 1924 için mükemmeldir. 1924, doğumdan 4 yıl sonra olduğu için, Bölüm 5'in 130. sayfasındaki Küçük İlerleme Tarihi Tablosuna başvurarak (Seri Ders 114), orada bulunan 0y 3ay 19d'yi doğuma ekliyoruz. tarih, 1920y 6mo 28d ve yaklaşık Mip'i bulun. D. 17 Ekim 1920.

1 Ocak doğum gününden önce olduğu için, 17 Ekim 1920'den MED 4 Ekim 1920'ye geri dönüyoruz, burada Venüs 5 Akrep 46'yı buluyoruz ve böylece (b) 14' Uranüs r üçgenini buluyoruz. . Venüs her gün hareket ediyor (a) 1 ° 14'. 3 Ekim ile 4 Ekim 1920 arasında Ay, (c) 14° 11' hareket ediyor.

Orantısal olarak, 1° 14' azaltmak 74' verir. 14° 11' küçültmek (c) 851' verir. (c) 851'i (b) 14 ile çarpmak 11914'ü verir. 11914'ü (a) 74'e bölmek (d) 161' veya 2° 41' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 2.0122 günlüğe kaydedilir. (c) .2284 verir 2.2406. Günlük çıkarma. (a) 2.2406'dan 1.2891, günlük olan .9515'i verir. (d) 2° 41'.

4 Ekim 1920'de Ay'ın konumundan her iki yöntemle bulunan 2° 41'i çıkarmak, Ay'ın küçük ilerlemeli konumunu 1 Yengeç 10 olarak verir. Bundan 4S 1° 10' çıkarın SC 5S 1° 45' ve Güneş 29 Oğlak 25'in geçiş konumunu verir. 1924 yılı için bir efemeriye dönersek, 20 Ocak 1924'te gerekli konumdan 12 saatten az bir hareketle Güneş 29 Oğlak'ı 1° buluruz. Venüs*m*üçgen Uranüs*r*20 Ocak 1924.

Örnek 4. Sayfa 164'te verilen 318b çizelgesi için, büyük ilerleme gösteren Venüs Satürn'ün üçgen açı yaptığı takvim tarihini bulun.*p* 1933'te küçük ilerlemeli Venüs paralel Satürn tarafından güçlendirildi *p*:

Bu büyük-ilerlemiş yön, 25 Haziran 1933 için mükemmeldir. 1933, doğumdan 13 yıl sonra olduğu için, Bölüm 5'in 130. sayfasındaki Küçük İlerleme Tarihi Tablosuna bakarak (Seri Ders 114), orada bulunan 0y 11mo 25d'yi doğum tarihine ekliyoruz. , 1920y

11mo 24d ve yaklaşık Mip'i bulun. D. 19 Kasım 1921'dir.

7 Aralık 1920'de, 24 Mayıs 1933'ü gösteren D Haritası, Satürn'ün eğimi 4 N 12. 24 Mayıs doğum gününden önce olduğu için 19 Kasım 1921'den 1 Kasım'a kadar efemeriste geri dönüyoruz, 1921, Venüs'ü 4 S 15 sapmasında buluyoruz. Bu MED. Bu tarihte Ay 27 Akrep 42'dir. Bu 8S 27° 42'ye örnek 2'de bulunan SC'yi ekliyoruz, 6S 14° 39' ve MED'de geçiş yapan Güneş'in konumunu 12 İkizler 21 olarak veriyor. 1933, Güneş'i 3 Haziran'da 12 İkizler 26'da gösterir. Böylece 3 Haziran 1933, MED'yi temsil eden takvim tarihidir. Büyük ilerleme gösteren Satürn 1933'te düşüşle yılda sadece 2' hareket ettiğinden, 3 Haziran 1933'teki konumu 4 N 12 olarak kalır.

1 Kasım 1921'de MED'de küçük ilerlemeli Venüs, eğimde artış gösteriyor ve bu nedenle (b) 3' açısını geçmiş durumda.

31 Ekim ve 1 Kasım 1921 arasında, Venüs (a) 29' sapma ile hareket eder.

31 Ekim ve 1 Kasım 1921 arasında Ay (c) 13° 34' hareket ediyor.

Orantısal olarak, 13° 34' azaltmak (c) 814' verir. çarpma (c) 814 ile (b) 3' 2442 verir. 2442'yi (a) 29'a bölmek verir (d) 84' veya 1° 24'.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 2.6812 günlüğe kaydedilir. (c) .2477 verir 2.9289. Günlük çıkarma. (a) 2.9289'dan 1.6969 verir 1.2320, günlük olan. 1° 24'.

Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

Her iki yöntemle de bulunan 1° 24' 1 Kasım 1921'de Ay'ın konumundan çıkarıldığında, küçük ilerlemeli Ay'ın konumunu 26 Akrep 18 olarak verir. Buna 8S 26° 18' SC 6S 14° 39 ekleyin. ' ve Güneş 10 İkizler 57'nin geçiş konumunu verir. 1933 yılı için bir efemeriye dönersek, 1 Haziran 1933'te gerekli konumdan 12 saatten az bir hareket olan Güneş 10 İkizler 31'i buluruz. Böylece Venüs*m*paralel Satürn*p*1 Haziran 1933.

Örnek 5. Sayfa 164'te verilen 318b çizelgesi için, Merkür'ün Uranüs ile büyük ilerleme kaydettiği takvim tarihini bulun.*p* 1938'de küçük ilerlemeli Güneş üçgeni Merkür tarafından güçlendirilmeye başlandı*p*.

Büyük ilerlemeli Merkür kare Uranüs*p*mükemmel ağustos 29, 1938. 1938 doğumdan 18 yıl sonra olduğu için, Bölüm 5'in 130. sayfasındaki Küçük İlerleme Tarihi Tablosuna bakarak (Seri Ders 114), orada bulunan 1y 4mo 6d'yi doğum tarihi olan 1920y 11mo 24d'ye ekliyoruz ve yaklaşık Mip. D. 30 Mart 1922.

Merkür olduğunda açı mükemmel*p*2 Yay 10'dur. Güneş tarafından güçlendirilmeye başlar*m*ne zaman güneş*m*1 Koç 10'da bu konumdan yaklaşık bir derecedir. 30 Mart 1922'den efemeriste geri dönersek, 22 Mart 1922'de Güneş'i Koç 05'te buluruz. Bu MED.

22 Mart 1922'deki Ay 25 Oğlak 20'dir. Buna 10S 25° 20' SC 6S 14° 39' ekleyin ve Orta Doğu'da geçiş yapan Güneş'in konumunu 9 Aslan 59 olarak verir. 2 Ağustos 1938'de Güneş, 9 Aslan'da 31. Böylece 2 Ağustos 1938, MED'yi temsil eden takvim tarihidir.

Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yönteme göre majör ilerlemeli Merkür'ü hesaplamak, konumunu 2 Ağustos 1938'de 2 Yay 04 olarak verir. Ay'ın MED'deki 12 günlük hareketi sırasında majör ilerlemeli Merkür 3' hareket ediyor. 22 Mart 1922'de Güneş 60' hareket ederken, (a) 57' kazancını veren 60' değerinden 3' çıkarıyoruz.

2 Ağustos 1938 takvim tarihinde küçük ilerlemeli Güneş, 1 Koç 05'tir ve 2 Ağustos 1938 takvim tarihinde büyük ilerlemeli Merkür, 2 Yay 04'tür. Bu nedenle Güneş*m*Üçgen Merkür'ün bir derecelik etkili yörüngesi içindedir*p*(b) 1'.

21 Mart ile 22 Mart 1922 arasında Ay, hareket ediyor (c) 12° 11'.

Orantısal olarak, 12° 11' azaltmak (c) 731' verir. (c) 731'i (b) 1 ile çarpmak 731'i verir. 731'i (a) 57'ye bölmek (d) 13' verir.

Logaritmalara göre, log ekleyerek. (b) 3.1584 günlüğe kaydedilir. (c) .2945 verir 3.4529. Günlük çıkarma. (a) 3.4529'dan 1.4025 verir 2.0504, günlüktür. (d) 13'.

Ay'ın 22 Mart 1922'deki konumundan her iki yöntemle bulunan 13' çıkarıldığında, Ay'ın küçük-ilerlemiş konumu 25 Oğlak 07'yi verir. Buna 10S 25° 07' SC 6S 14° 39' eklenir ve Güneş 9 Aslan 46'nın geçiş konumunu verir. 1938 yılı için bir efemerise dönersek, 2 Ağustos 1938'de gerekli konumdan 12 saatten az bir hareket olan Güneş 9 Aslan 31'i buluruz. Böylece Güneş*m*Merkür üçgenini uyguluyor*p*kürenin bir derecesi içinde 2 Ağustos 1938.

-

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 7

Geçişler, Devrimler ve Döngüler

Seri Ders Numarası 116

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi



Transitler: Doğum Haritası 317c

4 Temmuz 1920, 17:00 CST. 90W. 30N.

LD 19 Ocak 1920. MM eksi 2S 14° 50'.

Güneş Sabiti, eksi 7S 9° 55'.

19 Ocak 1932 için ilk dış çemberde büyük ilerlemeler.

*19 Ocak için ikinci dış çemberde küçük ilerlemeler,*1932.

19 Ocak 1932 için dışarıda transit ilerlemeler.

1932, 9 Ocak, Mars *t* karşı güneş *p*.

1932, 7 Şubat, Venüs *t* Üçgen Güneş *p*.

1932, 15 Şubat, Mars *t* kavuşum Ay *r*.



Geçişler: Doğum Haritası 3c
28 Haziran 1920, 12:23 CST. 89W.
40:40K. LD 22 Mart 1920. MM eksi 0S 5° 32'. Güneş Sabiti, eksi 5S 1° 45'.

22 Mart 1937 için ilk dış çemberde büyük ilerlemeler.

22 Mart 1937 için ikinci dış çemberde küçük ilerlemeler.

22 Mart 1937 için dışarıda transit ilerlemeler.

1937, 2 Temmuz, Jüpiter *t* kare Artan. *p*. Güneş *t*

1937, 25 Temmuz, kare Mars *p*. Merkür *t* kavuşum

1937, 6 Ağustos, Satürn *p*.



Transitler: Doğum Haritası 318c
24 Kasım 1920, 18:00 CST. 90W. 39N.
LD 24 Mayıs 1920. MM eksi 2S 23° 57'.
Güneş Sabiti, artı 6S 14° 39'.

24 Mayıs 1941 için ilk dış çemberde büyük ilerlemeler.

24 Mayıs 1941 için ikinci dış çemberde küçük ilerlemeler.

24 Mayıs 1941 için dışarıda transit ilerlemeler

1941, 2 Nisan, Satürn *t* kare Neptün *p*.

1941, 11 Haziran, Mars *t* bağlaç MC *p*.

1941, 18 Haziran, Uranüs *t* Mars üçgeni *r*.

Bölüm 7

Geçişler, Devrimler ve Döngüler

Tüm astrolojik konuların en tartışmalı olanı, transit yönlere ne kadar bağımlı olunabileceği ile ilgilidir. Yeterince geniş bir küreye izin verilirse, bir geçiş yönü bulunabilir. hayatın her olayının hesabını vermek için yapılmış. Ancak bir küre bu kadar geniş kullanıldığında, böyle bir geçiş yönü her zaman mevcuttur ve bu çok sayıda geçiş yönünden hangisinin bir olayı işaret edip etmediğini açıkça gösteren hiçbir şey yoktur. Bu durumda, aktif duyu dışı algıya sahip olan astrolog, bir olaya denk gelecek olanı seçebilir. Ama sadece görünüşe güvenenler bunu yapamazlar; çünkü olaylar genellikle doğum haritası konumlarının geçiş yönleriyle örtüşürken, doğum haritası konumlarının sayısız geçiş yönleri meydana gelir ve bunlar herhangi bir önemli olayla örtüşmez.

Işık Kilisesi, transit yönlerin hiçbir etkisi olmadığını asla savunmadı, ancak önemlerinin bazıları tarafından fazlasıyla tahmin edildiğini öğretti. Ayrıca, bir olayın zamanına kadar ilerleyen binlerce haritanın istatistiksel analizi, onları dikkate almaya gerek olmadığını gösterdiğinden, Hermetik Sistem, talihin kısmına, Ay'ın düğümlerine,

ilerlemiş küçük ev başlangıç çizgileri veya Arapça veya sözde hassas noktalar.

Hem doğum haritasında hem de ilerleme yoluyla, dikkatini yalnızca on gezegenin, orta göklerin ve yükselenlerin konumlarına sınırlar. Doğum astrolojisi tarafından bir bireyin yaşamındaki olası olayları tahmin etmek için döngülere veya bu tür diğer çizelgelere hiç dikkat etmez; dikkatli istatistiksel analizden sonra kullanımlarını atmış olmaları, genellikle güvenilmez olduklarını kanıtladı. Doğum haritasına ek olarak, tek güvenilir - ve güvenilir - faktörlerin büyük ilerlemeler, küçük ilerlemeler ve transit ilerlemeler olduğunu bulmuştur.

Konuyla ilgili çok sayıda istatistiksel araştırmadan sonra, aşağıdaki kuralı tamamen haklı buluyoruz:

KURAL: Bir olayın veya hastalığın her bir güçlendirilmiş Ana-İlerleme Sabiti, olayın meydana geldiği veya hastalığın geliştiği anda Ay'dan dört terminalinden birine her zaman daha ağır bir geçiş yönü tarafından salınır. Ve bağımsız bir minör-ilerlemiş veçhe, her zaman olayın meydana geldiği zaman minör-ilerlemiş veçheden etkilenen doğum haritasına veya majör-ilerlemiş terminallerden birine bir transit veçhe ile serbest bırakılır.

Böylece, minör-ilerlemiş yönlerin bile iki farklı etkisi olduğu gibi, transit-ilerlemiş yönleri de vardır. Ana-gelişmiş açı ile yapıldığında, aynı iki gezegen arasında aynı yönün bir gücü ve ahengi veya uyumsuzluğu 1/365.25 ve uyum veya uyumsuzluk. Transit-ilerlemiş yönler yoluyla yeni enerji alan düşünce hücrelerinin psikokinetik gücü, böylece önemsiz olayları yaşamın içine çekmelerini sağlar.

Önemsiz olaylar, karakteristik geçişin ilerlediği yönlerle örtüşür.

Ancak bu bağımsız etkiye ek olarak, eğer transit-ilerlemiş açı terminallerden birine ise (bir gezegen kendi doğum haritası yerine açı yapmıyorsa, hem doğum haritası hem de ilerlemiş konumlar terminaldir), her gelişmiş yönün dört terminali vardır. majör-ilerlemiş yönü, ya minör-ilerlenmiş yönü ya da majör-ilerlenmiş yönü veya her ikisini serbest bırakma eğiliminde olan bir tetikleyici etkiye sahiptir.

Pişirme gazıyla dolu bir odada bir kibrit yakılırsa, ne patlamanın gücü ne de ortaya çıkan yıkım kibritin sınırlı enerjisiyle orantılıdır. Güç oradaydı ve kibritin alevi onu serbest bıraktı. Silahtan bir mermi fırlatan güç, ne tetikte ne de onu basan parmakta yatmaktadır. Güç tozda. Tetiğe basıldığında bu güç serbest bırakılır. Tetiğe basılana kadar güç serbest bırakılmaz. Ve transit yönlerinin kendi içlerinde çok az güce sahip olduğunu gösteren bol miktarda istatistiksel veriye sahibiz, ancak bunların, güçlendirilmiş büyük-ilerlemiş yönlerin gücünü ve ayrıca bağımsız küçük-ilerlemiş yönlerin gücünü serbest bırakma eğiliminde olan bir tetikleyici etki uyguladıklarını gösteren çok sayıda istatistiksel veriye sahibiz.

Bazılarının geçişlerin neden bu kadar güçlü olduğunu düşündüğü şimdi anlaşılacak. Bunlar gerçekleştiğinde, önemli olaylar üzerinde etkisi olan gezegenleri içeren bir derece mükemmellik içinde her zaman bir geçiş yönü vardır. Bununla birlikte, büyük ilerlemeli yönleri görmezden gelenler, ortalama olarak bu tür önemli geçiş yönlerinin yarısını kaçırırlar; çünkü bir gezegenin ana-ilerlemiş konumuna geçiş yönü, doğum haritasının aynı geçiş yönü kadar güçlüdür.

aynı gezegenin konumu. Bununla birlikte, asıl nokta, AYNI ZAMANDA küçük-ilerlemiş bir veçhe ile takviye edilmiş olan görünüşe sahip gezegeni içeren büyük-ilerlemiş bir veçhe olmadığı sürece, hiçbir transit veçhenin bir bireyin hayatındaki önemli bir olayla örtüşmemesidir.

Bütün meseleyi özetlemek gerekirse, yaklaşık yarım asırlık gözlem ve çeyrek asırlık C. L. istatistik araştırması, bizi büyük olaylar için birincil güvenin sadece olayın Ana-İlerleme Sabitlerine yerleştirilmesi gerektiğine ikna ediyor. . Küçük olaylar sadece küçük-ilerlemiş açılar tarafından belirtilen periyotlarda gerçekleşir ve büyük olaylar sadece olayın TÜM Büyük-İlerlenmiş Sabitlerini güçlendiren küçük-ilerlemiş yönler tarafından belirtilen gücün zirveleri sırasında gerçekleşir. Ve asıl olay, yalnızca, bu güçlendirilmiş güç, olayın TÜM Ana-İlerlemiş Sabitlerinin terminallerinden birine bir geçiş yönünün tetikleme etkisi ile serbest bırakıldığında gerçekleşir.

Sembolik olarak, Güneş babadır ve Ay annedir, "Onları erkek ve dişi yarattı." Daha yüksek yaşam formlarında, erkek ve dişinin bir araya gelerek yavruları kavramasını gerektirir. Hermetik Aksiyom, yani "Yukarıda olduğu gibi aşağıdadır", böylece daha da ileri doğrulanır ve hem Güneş'in gelişmiş açıları ölçtüğünü hem de Ay'ın TÜM İlerlemiş Sabitlerini etkileyen gelişmiş açıları ölçtüğünü bularak daha da doğrulanır.

Gebeliğe ek olarak, olay doğmadan önce enerjinin serbest bırakılması gerekir. Yeryüzünde tezahür etmesi gerekir. İnsanda gebelik tamamlandıktan sonra doğumda olduğu gibi, çocuk kendi ilk bağımsız nefesini almak için serbest bırakılmadan önce doğum sancıları veya eşdeğeri olmalıdır,

bu nedenle, herhangi bir büyük olayın tesliminde, büyük-ilerlemiş görünüm ve küçük takviye ilerlemiş yönü nedeniyle gebelikten sonra, olay fiziksel dünyada serbest bırakılmadan önce, önemli doğum haritasına veya büyük-ilerlemiş terminale bir geçiş yönü de olmalıdır. .

Yukarıdaki kural, Ana-İlerleyen Sabitlerin tek bir etkili küre derecesi içinde olduğu ve hepsinin küçük-ilerlemiş yönlerle güçlendirildiği dönemlerde bile, belirli bir olayın veya belirli bir hastalığın başlaması olasılığını ortadan kaldırmamızı sağlar. , TÜM bu Büyük İlerlemiş Sabitlerin de transit yönler tarafından serbest bırakıldığı sınırlı dönemler dışında.

Bölüm 8'in 226. sayfasında (Seri Ders 117) belirtildiği gibi doğum çizelgelerinin düzeltilmesine büyük ölçüde yardımcı olur ve belirtilen olayları daha kesin olarak zamanlamamızı sağlar; çünkü olay yalnızca TÜM Büyük-İlerlenmiş Sabitler minör-ilerlemiş yönlerle güçlendirildiğinde belirtilen güç tepe noktalarından birinde meydana gelmez, aynı zamanda SADECE bu güç tepe noktalarından biri sırasında, aynı zamanda bir olay veya hastalığın TÜM güçlendirilmiş Ana-İlerleme Sabitlerini serbest bırakan geçiş yönü.

Ancak bu nedenle, belirli bir süre boyunca ortadan kaldırıldığından ve yalnızca on gezegenin ve MC ve Yükselen'in zodyak geçiş konumları değil, tetikleyici etki olmadığı için belirli bir tür olayın meydana gelmeyeceğinden emin olmak için. kesin olarak tespit edilmelidir, ancak aynı zamanda on iki geçiş konumunun da sapmaları. Bu tür bir kesinlik, bazı olumlu olayların geçmesi için çaba sarf edildiğinde tetikleyici etkisinin mevcut olduğundan emin olmak için de gerekli olabilir.

Transit Aşamalı Yönler, Yalnızca Doğum Haritası Gezegenlerine veya Ana Aşamalı Gezegenlere Yapıldığında Değerlidir

gezegenler

Deneyimler, transit ilerlemiş yönlerin kendi aralarındaki görünümlerinin -gökyüzünde oluşan görünümlerin- o kadar az enerji verdiğini kanıtlıyor ki, girişimlere başlarken veya önemli bir şey yaparken dikkate alınmaları gerekirken, aksi takdirde etkileri ihmal edilmelidir.

Ancak Bölüm 1'de (Seri Ders 19) belirtildiği gibi, evlerin içinden geçiş hareketlerine, özellikle köşeli evlerden geçen daha yavaş hareket eden gezegenlere dikkat edilmelidir. Ve özellikle, daha yavaş hareket eden gezegenler tarafından yapılan doğum haritası veya büyük ilerleme konumları ile birleşme veya muhalefet, takviye edilmiş büyük-ilerlemiş yönleri serbest bırakmada veya küçük-ilerlemiş yönleri serbest bırakmada transit yönlerin tetikleyici etkisine ek olarak not edilmelidir. bakış açıları.

Transit ilerlemiş bir yönün enerjisinin aynı ana-ilerlemiş yönün enerjisinin 1/365.25 olduğunu düşündüğümüzde, etkilerinin fark edilemeyecek kadar küçük olduğu sonucuna atlama eğilimindeyiz. Ancak psikokinetik gücün çektiği bir olayın önemi, bu gücü harekete geçiren gezegensel enerjinin astrodinlerinin sayısıyla doğru orantılı değildir. Bir birey aynı gezegeni içeren bir dizi büyük-ilerlemiş veçheye sahip olduğunda, o gezegen tarafından haritalanan düşünce hücreleri tarafından edinilen yardımcı enerji, onların, benzer bir büyük-ilerlemeden daha önemli bir olayı hayata geçirmelerini sağlar. o gezegeni içeren yönü. Ancak düşünce hücrelerinin bu şekilde aldığı enerji, tek bir benzer görünüm altında alınanın beş katı ise, bu

cezbedilen olay beş kat daha önemli olacaktır. Deneyimler, bunun iki kattan daha az önemli olduğunu ve belki de sadece bir buçuk katı kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Olağan koşullar altında, çevrenin önemsiz bir olaya direnci o kadar küçüktür ki, 1/365.25 bir geçiş yönü gibi büyük-ilerlemiş bir yönün gücü bile, onu geçmek için yeterli olabilir. Ancak genel olarak, çevrenin gerçekten önemli olaylara direnci o kadar büyüktür ki, benzer büyük ilerlemeli bir yön, yalnızca birkaç düzine kat daha önemli bir olayı hayata geçirebilir. Ve çevrenin daha önemli olaylara karşı direnci nedeniyle, tek bir ana-ilerlemiş yönün gücünün beş veya on katı, tek bir benzer ilerleme nedeniyle bir olayın iki katından daha önemli olmayan bir olayı hayata geçirebilir. Görünüş.

Ayrıca, karşıtlıklar ve kareler gibi gökyüzündeki ağır yönler ve özellikle daha yavaş hareket eden gezegenlerin kavuşumları ve ulusları etkileyen iç düzlem hava koşullarının gösterdiği gibi, dünyayı etkileyen iç düzlem hava koşullarından etkilenen çevresel koşullar. , şehirler ve insan grupları, doğum haritalarında büyük ilerleme gösteren yönlerle belirtildiği gibi, bir bireyin haritasında ilerlemiş yönlerle belirtilen olaylara yönelik tesisler veya bunlara karşı direnç üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Araştırma departmanımız, felaket niteliğindeki dünya olaylarına bir eğilim vermek gibi, efemerlerde belirli bir süre boyunca şiddetli uyumsuzluklar ortaya çıktığında, bu dünya ıstıraplarının esas olarak kendileri aracılığıyla faaliyet gösterdiği insanlar olduğunu gözlemledi.

Doğum haritalarında ve ilerlemesinde öne çıkan ve ciddi şekilde olumsuz olan bir veya daha fazla gezegene sahip olanlar.

Efemeristeki ağır açılar faydalıysa, doğum haritalarında öne çıkan bir veya daha fazla gezegene sahip olanlar ve ilerlemeyle olumlu açılar yapanlar en çok yararlananlardır.

Ortak bir yönetim yetkisine sahip ulusların, şehirlerin, toplulukların ve diğer insan gruplarının alışılmış tepkisi, Ders XIII'de belirtilmiştir,*Sıradan Astroloji*. Ve bireyin ait olduğu grubun yasaları, gelenekleri, tutumları ve kaderi, olayları getirmek için ileri bir yön tarafından enerji verilen düşünce hücrelerinin psikokinetik gücüne kolaylık veya direnç sağlayan çevresel bir faktör olarak dikkate alınmalıdır. hayatın içine.

Somut bir örnek olarak, gerek I. Dünya Savaşı, gerekse II. Dünya Savaşı sırasında, hizmete çağrılan çok sayıda kişinin çizelgelerinde ilerleme durumlarının etkisini gözlemleme fırsatımız oldu. Bedeni ve zihni yeterince sağlam olan belirli yaş sınırları içindeki insanlar için, Mars'la ilgili hemen hemen her büyük ilerleme, onları silahlı hizmete soktu ve böylece hayatlarının tüm seyrini değiştirdi. Ve normal şartlar altında sadece hafif bir kesik veya yanık çekebilecek olan Mars'ı içeren gelişmiş bir görünüm altında, savaşta pek çok iyi asker katledildi.

Uzun Süreli İlerleyen Yönler

İnsanlar ya alışılmış dış düzlem hava durumuna ya da alışılmış iç düzlem hava durumuna alışırlar. Yavaş hareket eden gezegenler arasındaki ana ilerleme yönleri yıllarca sürer ve tüm yaşam boyunca sürebilir. Birey bu sürekli iç düzlem havasına kendini ayarlar ve yaşamı için normal kabul eder. Ancak, her zaman bir derece etkili küre içindedir, ana-ilerlemiş yön, iç düzlem havasının, başka bir ana-ilerlemiş açıdan yeterli yardımcı enerji veya bir veya daha fazla küçük-ilerlemiş bir açıdan yeterli takviye verildiği şekilde olduğunu gösterir. terminallerinden daha fazlası, bir anda dış düzlem ortamı böyle bir olay için olanaklar sunarken, düşünce hücrelerinin karakteristik bir olayı yaşama çekmesini sağlayabilir. Böylece,

Bu kursta ortaya konan doğum haritası ve ilerlemiş yönler hakkında bilgi muazzam bir değere sahip olsa da, bir gezegen tarafından haritalanan düşünce hücrelerinin psikokinetik gücü ne kadar kesin olarak bilinirse, bireyin doğum şeklini o kadar iyi bildiği açıktır. düşünce hücrelerinin tepki vereceği; ve uyumları veya uyumsuzlukları ne kadar kesin olarak bilinirse, olay ve koşulların kendi yararına olması için bireyin hayatını yönlendirmesini sağlamak için gereken önlem eylemlerinin miktarını ve türünü o kadar iyi tahmin etmek mümkündür. Ve bu bilgi kesinliğini vermek için, psikokinetik gücün göreli miktarı astrodinlerde ve göreli uyum ya da uyumsuzluğun miktarı ve dolayısıyla onların eğilim gösterme gücü ölçülür.

uyumlu koşullar veya uyumsuz koşulları yaşama getirme eğilimlerinin gücü, uyumlar veya uyumsuzluklarla ölçülür. Bu kadar çok astrodin nasıl hesaplanır, herhangi bir gezegenin, açının, burcun veya evin GÜCÜ, ilerlemiş haritada; ve doğum haritasındaki herhangi bir gezegenin, açının, burcun veya evin UYUMU veya ANLAŞMAZLIĞININ veya herhangi bir gezegenin, açının, açıların kombinasyonunun, burcun veya evin ilerlemiş haritanın UYUMU veya ANLAŞMAZLIĞININ armoni veya uyumsuzluk olarak nasıl hesaplanacağı, Ders XVI'da örneklerle açıklanmıştır,*yıldız şifa*, ve referans kitabında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır,*Astrodyne Kılavuzu*.

Müşteriye Söylenmemesi Gerekenler

Astrologun amacı, yalnızca müşterisine ve genel olarak dünyaya, tahminlerinin her ayrıntısında ne kadar doğru olduğunu göstermek değil, müşterisine ve bir bütün olarak topluma mümkün olduğunca büyük yardımda bulunmak olmalıdır.

Bu nedenle, insanların öneriye belirgin tepki gösterdiğini asla unutmamalıdır. Aslında, kararlı bir zihin tarafından yapılan olumlu bir ifade, astralde bu ifadeyi gerçeğe dönüştürmek için içsel düzlemden çalışan bir düşünce formu oluşturur. Sonuç olarak, bu telkin gücü ve astrologun yapıcı olayları gerçekleştirme iradesi büyük fayda sağlayabilir. Öte yandan, büyük bir yıkıcı güce sahip bir kuvvet haline getirilebilir.

Bir kişinin ölümünü belirli bir zamanda tahmin eden astrolog, eğer kişi bu kehanetin farkındaysa telkin yoluyla ölüme katkıda bulunabilir. Ve birey tahminden habersiz olduğunda bile, düşünce formu

Astrolog tarafından başlatılan ve astrologun tahmininin gerçekleşeceğine inanan başkaları tarafından eklenen, trajediye neden olan aktif bir ajan olabilir.

İnsanları korkutmak adaletsizdir, çünkü korkuları onlara aksi takdirde asla olmayacak felaketleri çeker.

Astrologun müşterisine yalan söylemekte hiçbir zaman haklı olduğuna inanmıyorum; ancak anladıklarının ne kadarını anlatacağı mesleki yetki alanındadır. Ve müvekkiline anlattıklarında, sözlerinin düşündürücü gücü ve düşünce gücü yapıcı ve yardımcı olacak şekilde tavsiye ve bilgi verme fırsatına sahiptir ve bunu kullanmalıdır.

Tanımlamaların ve tahminlerin psikolojik etkisi, yapılmadan önce, yapılanların mizaç ve olası tepkileriyle bağlantılı olarak her zaman iyi tartılmalıdır.

Gezegenlerin Transit Aşamalı Konumlarını Bulmak
Belirli bir Takvim Tarihi

Gezegenlerin günün herhangi bir saatinde, herhangi bir takvim gününde transit ilerlemiş konumları, tam olarak, belirtilen takvim gününde günün o saati için bir doğum haritasına yerleştirilecekmiş gibi hesaplanarak bulunur.

(a) Gezegenin verilen takvim gününde günlük hareketini bulun.

(d) Verilen takvim tarihinde öğleden sonra eksi veya artı EGMT Aralığını bulun.

(c) 24 saat veya 1440 dakikadır.

Orantılı olarak, (a)'yı (d) ile çarpın ve ürünü (c)'ye bölün. Bu, (b) gezegenin EGMT Aralığı sırasında kat ettiği mesafeyi verir.

Logaritma ile günlük ekleyin. (a) günlüğe kaydetmek. (d). Sonuç günlüktür. (b), EGMT Aralığı sırasında gezegenin kat ettiği mesafe.

(b) takvim tarihinde gezegenin Greenwich öğlen konumuna eklenen veya bundan çıkarılan, işareti verir ve ' verilen takvim gününde belirtilen saatte işgal eder.

Doğum Haritasına Geçişte İlerleyen Bir Yönün Bulunduğu Takvim Tarihini Bulma veya Büyük-İlerleme Pozisyonu Mükemmel

Görünümün mükemmel olduğu en yakın takvim yılı için efemeristeki tarihi bulun.

Önemli bir ilerleme durumu söz konusuysa, bu takvim tarihi için ana ilerleme konumunu bulun. Seyahatini Harita üzerinde bölerek 24 saat boyunca büyük ilerlemesini bulun. D. 365'e kadar. Bu yolculuk, Ay dışındaki tüm büyük gelişmiş gezegenler için 1' den azdır.

(a) 24 saat boyunca ana ilerleme konumunda transit ilerlemiş gezegenin °s ve ' cinsinden kazancını bulun. Eğer açı bir doğum haritası pozisyonuna veya Ay dışında herhangi bir ilerlemiş gezegene ise, (a) transit ilerlemiş gezegenin günlük yolculuğudur. Büyük ilerlemeli Ay, 24 saat boyunca 2' hareket ediyor.

(b) °s ve 'nin açının, transit ilerlemiş gezegenin efemeris konumu ile temsil edilen günün zamanında mükemmel olduğunu bulun.

(c) 24 saat veya 1440 dakikadır.

Orantılı olarak, (b)'yi (c) ile çarpın ve ürünü (a)'ya bölün. Sonuç (d)'dir.

Logaritmalarla, logu çıkarın. (a) günlükten. (b). Sonuç günlüktür. (d) arasında. (d) her iki yöntemle de bulunan, gezegenin efemeris konumundan mükemmel açıya hareket etmesi için gereken EGMT Aralığıdır.

Görünüm, efemeriste takvim tarihinde verilen konumlardan önce oluşmuşsa, (d) o takvim gününde eksi EGMT Aralığıdır. Görünüm, efemerlerde takvim tarihinde verilen konumlardan sonra oluşuyorsa, (d) o takvim gününde artı bir EGMT Aralığıdır. Bu EGMT Aralığından Standart Saati (izlenme süresi) veya Yerel Ortalama Saati bulun, kişinin bulunduğu yerde görünüm mükemmeldir, bu nedenle:

Standart Saati veya Yerel Ortalama Saati Bulma
Eksi veya Artı EGMT Aralığında Verilen Yer
Öğleden sonra

EGMT Aralığından öğlenden bir eksi EGMT Aralığı çıkararak veya öğlene bir artı EGMT Aralığı ekleyerek EGM Zamanını bulun.

Yer Greenwich'in doğusundaysa, Standart Saati bulmak için yerin Standart Saat Diliminin saat sayısını EGM Saatine ekleyin; ama yer batıysa

Greenwich, Standart Saat Diliminin saat sayısını EGM Saatinden çıkarın. Sonuç, aranan Standart Süredir (izlenme süresi).

Yerel Ortalama Saati bulmak için, yerin Greenwich'ten olduğu karasal boylam derecesini 4 ile çarpın ve saatin ürün dakikasını arayın ve karasal boylamın ek dakika sayısını 4 ile çarpın ve ürünün saniyesini çağırın. Bu, Greenwich'ten saat farkını verir. Eğer yer Greenwich'in doğusundaysa Yerel Ortalama Saati bulmak için saat farkını EGM Saatine ekleyin; ancak yer Greenwich'in batısındaysa, zaman farkını EGM Saatinden çıkarın. Sonuç, aranan Yerel Ortalama Saattir.

Belirli Bir Tarihte Transit Aşamalı MC'yi Bulma

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Transit İlerlemiş Artışı Bulma Belirli Bir Tarihte

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Transit İlerlemeden Takvim Tarihini Bulma MC

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Transit-İlerleyen MC'nin Zodyak Hareketini Bulma
veya Art.

Bunun için talimatlar Bölüm 2'de verilmiştir (Seri Ders 111).

Transit-İlerleyen MC veya Artan Bir Yönün Üzerinde Bulunduğu Takvim Tarihini Bulma. İleri Derecede veya
Doğum Haritası Pozisyonu Mükemmel

Görünümün mükemmel olduğu efemeris saatine en yakın efemeristeki takvim tarihini bulun.

Önemli bir ilerleme durumu söz konusuysa, takvim tarihi için ana ilerleme konumunu bulun. Ay dışındaki tüm büyük ilerleme yönleri için 24 saat boyunca majör ilerlemeli seyahat 1' den az olduğundan, bu göz ardı edilebilir.

(a) transit ilerlenmiş MC veya Artan'ın °s ve 'ler cinsinden kazancını bulun. 24 saat boyunca majör gelişmiş pozisyonda. Eğer açı bir doğum haritası pozisyonuna veya Ay dışında herhangi bir gezegene ise, (a) transit MC veya Asc'nin günlük yolculuğudur. Büyük ilerlemeli Ay, 24 saat boyunca 2' hareket ediyor.

(b) °s ve 'nin, verilen takvim tarihinde gezegenin efemeris konumu ile temsil edilen günün saatinde mükemmelden açı olduğunu bulun.

(c) 24 saat veya 1440 dakikadır.

Orantısal olarak, (b)'yi 's'ye indirgerseniz, (b)'yi (c) ile çarpın ve ürünü (a)'ya bölün. Sonuç (d)'dir.

Logaritmalarla, logu çıkarın. (a) günlükten. (b). Sonuç günlüktür. (d) arasında.

(d) her iki yöntemle bulunan, görünümün mükemmel olması için gereken EGMT Aralığıdır.

Görünüm, efemerlerde takvim tarihinde verilen konumlardan önce oluşmuşsa, o takvim gününde eksi EGMT Aralığıdır. Görünüm, efemerlerde takvim tarihinde verilen konumlardan sonra oluşuyorsa, bu, o takvim gününde bir artı EGMT Aralığıdır. EGMT Aralığından Standart Saati (izlenme süresi) veya Yerel Ortalama Saati bulun, görünüm, bireyin bulunduğu yerde daha önce verilen talimatlara göre mükemmeldir.

Transit-İlerleyen MC'nin Sapmasını Bulma veya
artan Belirli bir Takvim Tarihi için

Transit ilerlemeli MC veya Asc'nin işaretinden, ° ve '. Bölüm 3'ün 66. sayfasında (Seri Ders 112) açıklandığı gibi, sapmayı bir doğum haritası konumuymuş gibi bulun.

Transit-İlerlemenin Sapması ile Hareketi Bulma
MC veya Asc.

Bunun için talimatlar Bölüm 3'te verilmiştir.

Transit İlerleyen MC veya Artan Takvim Tarihinin Bulunması. Paralel Bir Yön Oluşturur
İleri Derecede veya Doğum Haritası Pozisyonu Olan

Görünümün mükemmel olduğu efemeris saatine en yakın efemeristeki takvim tarihini bulun. Büyük ilerlemeli bir pozisyon söz konusuysa, takvim tarihinde ana ilerlemeli düşüşünü bulun. 24 saat boyunca sapma ile majör ilerleme 1' den az olduğu için, göz ardı edilebilir.

(a) transit ilerleyen MC veya Artan'ın 's cinsinden günlük hareketidir. sapma ile.

(b) 'nin, takvim tarihinde gezegenlerin efemeris konumlarıyla temsil edilen günün saatinde mükemmelden açı olduğunu bulun.

(c) 24 saat veya 1440 dakikadır.

Orantılı olarak, (b)'yi (c) ile çarpın ve ürünü (a)'ya bölün. Sonuç (d)'dir.

Logaritmalarla, logu çıkarın. (a) günlükten. (b). Sonuç günlüktür. (d).

(d) her iki yöntemle bulunan, görünümün mükemmel olması için gereken EGMT Aralığıdır.

Görünüm, efemerlerde takvim tarihinde verilen konumlardan önce oluşmuşsa, o takvim gününde eksi EGMT Aralığıdır. Görünüm, efemerlerde takvim tarihinde verilen konumlardan sonra oluşuyorsa, bu, o takvim gününde bir artı EGMT Aralığıdır. EGMT Aralığından Standart Saati (izlenme süresi) veya Yerel Ortalama Saati bulun; görünüm, bireyin daha önce verilen talimatlara göre bulunduğu yerde mükemmeldir.

Gökyüzündeki Bir Yönün Mükemmel olduğu veya Gökyüzündeki Bir Gezegenin Belirli Bir İşarete Ulaştığı Günün Saatini Bulma, ° ve '

Zodyak Boylamı veya Verilen bir ° ve ' Sapma

Gökyüzündeki bir yönün ne zaman mükemmel olduğunu bulmak genellikle arzu edilir. Sıradan astrolojide Yeni Ay'ın günün saatini ve her birinin günün saatini belirlemek esastır.

diğer gezegenler güneyden kuzeye doğru meyilli geçer. Astroloji ile hava tahmininde, Güneş'in her bir ana burç girdiği günün saatini ve Merkür'ün her burçta günün hangi saatinde girdiğini bilmek gerekir. Burada çözülen problemde, gezegenin hareketinin düzgün olduğu varsayılır. Ay'da olduğu gibi, Merkür'de de sık sık olduğu gibi, hareket düzensiz olduğunda, bu hızlanma veya yavaşlama, eğer büyük bir hassasiyet gerekiyorsa dikkate alınmalıdır. Bunun nasıl yapılacağı daha sonra açıklanmaktadır. Ancak, bahsedilen problemlerin her birinde hareket üniforması göz önüne alındığında:

Görünümün veya pozisyonun mükemmel olduğu efemeris saatine en yakın efemeristeki takvim tarihini bulun:

(a) Daha yavaş hareket eden gezegende daha hızlı hareket eden gezegenin zodyak hareketindeki veya sapmadaki günlük kazancını °s ve ' cinsinden bulun. Gezegen 0° N 0' sapma gibi sabit bir konuma hareket ediyorsa, (a) gezegenin günlük hareketidir.

(b) °s ve 'nin efemeris tarihinde mükemmelden açı olduğunu veya gezegenin sabit konuma ulaşmak için ne kadar hareket etmesi gerektiğini bulun.

(c) 24 saat veya 1440 dakikadır.

Orantısal olarak, (a) ve (b)'yi 'lere düşürün. (b)'yi (c) ile çarpın ve ürünü (a)'ya bölün. Sonuç (d)'dir.

Logaritmalarla, logu çıkarın. (a) günlükten. (b). Sonuç günlüktür. (d).

(d) her iki yöntemle de, görünüşün mükemmelleşmesi veya ulaşılması gereken pozisyon için gereken EGMT Aralığı bulunur.

Efemeriste takvim tarihinde verilen konumlardan önce bakı oluşmuşsa veya sabit konuma ulaşılmışsa, (d) o takvim gününde eksi EGMT Aralığıdır. Efemeriste takvim tarihinde verilen konumdan sonra bakı oluşmuşsa veya sabit konuma ulaşılmışsa, (d) o takvim gününde artı bir EGMT Aralığıdır. EGMT Aralığından Standart Saati (izlenme süresi) veya Yerel Ortalama Saati bulun, açı mükemmel veya sabit konuma ulaşıldı, çizelgeyi oluşturmak veya saati bilmek istenen yerde.

Örnek 1. Sayfa 194'te verilen 317c çizelgesi için, 19 Ocak 1932, Greenwich Öğlen için tüm transit ilerleme konumlarını hesaplayın: Tüm gezegenlerin konumları, 19 Ocak 1932 için efemerlerden yalnızca kopyalanmıştır. Güneş'in doğum haritası konumu, 4S 12° 36', MC'nin doğum haritası konumundan, 6S 27° 26', MCC eksi 2S 14° 50' verir. MCC'den önce cebirsel işaretin değiştirilmesi, 2S 14° 50' değerini 19 Ocak 1932, 10S 28° 13' güneş geçiş konumuna ekler ve geçiş MC'yi 13 Koç 03 olarak verir. 13 Koç 03 açıkken Bölüm 2'de (Seri Ders 111) verilen yöntemle hesaplanan enlem 30'daki MC, 23 Yengeç 16 Yükselen'de. Bu geçiş Asc.

Bölüm 6'nın 162. sayfasında (Seri Ders 115) verilen House Cusp Sapmaları Tablosunu ve Bölüm 3'ün 66. sayfasında (Seri Ders 112) verilen yöntemi kullanarak, şunu buluruz:

MC 13 Aries 03 olduğunda, 5 N 09 sapmaya sahiptir ve Asc olduğunda. 23 Yengeç 16, eğimi 21 N 26'dır.

Örnek 2. Bölüm 5'te (Seri Ders 114) 1 Mart 1932'de küçük-ilerlemiş Güneş'in altmış-ilerlemiş Güneş'in altmış-gelişmiş büyük-ilerlemiş Venüs olduğu ve Güneş'in geçişi 10 Balık 26 iken, harita 317b için bulundu. York bu yönü mükemmel miydi?

1932 için bir efemerise dönersek, 1 Mart'ta Güneş'i 10 Balık 43'te buluyoruz ve böylece gerekli konumu (b) 17' geçiyoruz.

29 Şubat ile 1 Mart 1932 arasında, Güneş (a) 60' hareket ediyor.

(c) 24 saat veya 1440m.

Orantılı olarak, (b) 17'yi (c) 1440 ile çarpmak 24480 verir. 24480'i (a) 60'a bölmek 408m veya 6h 48m verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.3802. (b) 1,9279, günlük olan .5477'yi verir. 6h 48m.

Her iki yöntemle de bulunan 6h 48m'yi Greenwich öğlenden çıkarmak 5:12'yi verir New York Doğu Standart Saat dilimi, 5h Batı olduğu için, 5h'yi 5:12 AM'den çıkarırız ve bu, küçük-ilerlemiş Güneş'e altmışlık majör-ilerlemiş Venüs, Mart'ı verir. 1, 1932, 12:12 New York izlenme süresi.

Örnek 3. Bölüm 5'te (Seri Ders 114) grafik 317b için küçük ilerlemeli Asc. 18 Şubat 1932'de geçiş sırasında Merkür paralel büyük ilerleme kaydetti.

Güneş 28 Kova 58 yaşındaydı. Los Angeles'ta günün hangi Standart Saatinde bu açı mükemmeldi?

1932 için efemeris'e dönersek, 18 Şubat'ta Güneş 28 Kova 38'i buluruz ve bu nedenle gerekli konumdan (b) 20' eksiktir.

18 Şubat 1932'de Güneş (a) 60' hareket ediyor.

(c) 24 saat veya 1440m.

Orantılı olarak, (b) 20'yi (c) 24h ile çarpmak 480'i verir. 480'i (a) 60'a bölmek 8h verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.3802. (b) 1.8573, günlük olan .4771'i verir. 8h.

Her iki yöntemde de bulunan 8h'yi Greenwich öğlene eklemek 8:00 PM'yi verir Los Angeles Pasifik Standart Saat diliminde, 8h West'te olduğundan, 8h'yi 8:00 PM'den çıkarırız ve küçük-ilerlemiş Asc verir. paralel büyük ilerlemeli Mercury 18 Şubat 1932, öğlen, Los Angeles izlenme süresi.

Örnek 4. Chicago, Illinois'de Yerel Ortalama Saate göre Mart 1932'de Merkür ne zaman Koç burcuna girdi? 9 Mart 1932'deki efemeris, Merkür 29 Balık 21'i gösterir ve bu nedenle gerekli konumdan (b) 39' eksiktir.

9 Mart 1932'de Merkür (a) 1° 54' veya 114' hareket ediyor.

(c) 24 saat veya 1440m.

Orantılı olarak, (b) 39'u (c) 1440 ile çarpmak 56160'ı verir. 56160'ı (a) 114'e bölmek 493' veya 8h 13m verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 1.1015. (b) 1.5673, günlük olan .4658'i verir. 8h 13m.

Her iki yöntemle de bulunan 8h 13m'yi Greenwich öğlene eklemek, Chicago 87:39W olduğundan 8:13 PM verir. 87'yi 4 ile çarparsak 348m verir ve 39'u 4 ile çarparsak 156s veya 2m 36s verir. Bu iki toplamı eklemek, 350m 36s Batı veya 5s 50m 36s Batı verir. 5h 50m 36s PM 8h 13m 00s PM'den çıkarıldığında Mercury 00 Aries 00 9 Mart 1932, 2h 22m 24s PM LMT., Chicago, Ill.

Örnek 5. Mars, 11 Mart 1920'de günün hangi Greenwich saatinde gökyüzünde Jüpiter'in karesini yaptı? 10 Mart 1920'deki efemeris, Jüpiter'i gösteriyor♂9 Aslan 03 ve Mars yönlendiriyor 8 Akrep 58. Bu nedenle açı mükemmel olmaktan yoksun (b) 5'.

Jüpiter her gün 5', Mars ise her gün 3' hareket ediyor. Biri direkt, diğeri retrograd olduğundan, günlük kazancı (a) 8' veren 5 ve 3'ü toplarız.

Orantılı olarak, (b) 5'i (c) 1440 ile çarpmak 7200'ü verir. 7200'ü (a) 8'e bölmek 900m veya 15h verir.

Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten 2.2553. (b) 2.4594, günlük olan .2041'i verir. 15h.

Her iki yöntemle de bulunan 15 saatin 10 Mart öğlene eklenmesi, 11 Mart, 3:00 AM Greenwich gökyüzünde Mars kare Jüpiter'i verir. ' konumuna verilen gezegen konumları ile saat 3:10'da çalışır.

Bir Gezegenin Transit Aşamalı Konumunu Bulmak
Günün Belirli Bir Saatinde Hareket Eden Üniforma

İlk önce, konumunun bulunacağı 24 saat boyunca gezegenin artışını veya azalmasını bulun. Ardışık iki gün boyunca gezegenin günlük hareketindeki fark alınarak bulunan artış veya azalma, gezegenin ortalama yolculuğununkidir. Ve bu ortalama seyahat, her günün iki öğlen arasındaki kesin seyahatidir. Böylece, ortalama artış veya azalışla gece yarısından başlayarak, zaman gece yarısından uzaklaştıkça hızlanma artar veya azalır. Bu nedenle, orantı veya logaritma ile öğlen ile konumun hesaplanacağı zaman arasındaki orta noktada artış veya azalmayı bulun. Gezegenin günlük hareketine bu şekilde bulunan artışı ekleyin veya bu şekilde bulunan düşüşü çıkarın. Sonra bunu ortalama kazanç (a) olarak kullanın ve sorunu normal yolla çözün.

Örnek 6. 318c haritası için, ivme için gereken payı ayırarak Ay'ın işgal ettiği yeri kesin olarak hesaplayın. 24 Kasım 1920'de Ay'ın konumu 10 Boğa 36, 23 Kasım'da ise 26 Koç 30'dur. Bu iki gün arasındaki günlük hareketi 14° 06'. 24 Kasım ile 25 Kasım arasındaki günlük hareketi ise 14° 30'. 24 saat içindeki artış miktarı böylece 24' olur. 14° 30', 24 Kasım artı 12h Greenwich'teki seyahatinin oranıdır.

Ay'ın konumunu artı 12h EGMT Aralığı istiyoruz. Efemeris'te öğlen için verilen konum 10 Boğa 36'dır. Artışını öğlen ile artı 12h arasındaki orta noktada veya artı 6h'de istiyoruz. Artı öğleden sonra 6 saat, 23 Kasım'dan 18 saat sonra artı 12 saat, veya 24 Kasım öncesi 6 saat

artı 12h. Ay'ın 23 Kasım ve 24 Kasım'daki yolculuğu arasındaki günlük artış farkı (a) 24'.

(c) 24 saat veya 1440m.

(d) 6h veya 360m'dir.

Orantısal olarak, (a)'yı (d) 360 ile çarpmak 8640'ı verir. 8640'ı (c) 1440'a bölmek (b) 6' değerini verir. Logaritmalara göre, log ekleyerek. (a) 1.7781 günlüğe kaydedilir. (d) .6021, günlük olan 2.3802'yi verir. (b) 6'.

Her iki yöntemle de bulunan 6' artımı, Ay'ın 24 Kasım'daki artı 12h'deki 14° 30' hareketinden çıkarmak, öğlen ile artı 12h arasındaki orta noktada 14° 24' olarak ortalama seyahati verir.

Hızlanmaya izin vermeden ve olağan şekilde hesaplama yapmadan (a) 14° 30' dir. Bu günlük hareketi kullanmak Ay'ın konumunu 17 Boğa 51 olarak verir. Ancak (a) ivmesine izin vermek 14° 24' dir. Bu, Ay'ın konumunu daha kesin olarak, 318, 318b ve 318c haritalarında verilen konum olan 17 Boğa 48 olarak verir.

Günün Saatini Geçişte İlerleyen Bir Gezegen Bulmak

Hareket Halindeki Üniforma Verilen Bir Pozisyona Ulaşıyor

İlk önce, konumunun zamanının bulunacağı 24 saat boyunca gezegenin artışını veya azalmasını bulun. Ardışık iki gün boyunca gezegenin günlük hareketindeki fark alınarak bulunan artış veya azalma, gezegenin ortalama yolculuğununkidir. Ve bu ortalama seyahat, her günün iki öğlen arasındaki kesin seyahatidir. Böylece ortalama ile gece yarısından başlayarak

artış veya azalma, gezegen gece yarısından uzaklaştıkça hızlanma artar veya azalır. Bu nedenle, orantı veya logaritma ile, gezegenin öğlen konumu ile verilen konum arasındaki orta noktada artış veya azalmayı bulun. Gezegenin günlük hareketine bu şekilde bulunan artışı ekleyin veya bu şekilde bulunan düşüşü çıkarın. Sonra bunu ortalama kazanç (a) olarak kullanın ve sorunu normal yolla çözün.

Örnek 7. Mart 1920'de, ivmeye gereken süreyi ayırarak, Ay ne zaman Kova burcuna girer? 14 Mart 1920'de Ay'ın konumu 12 Oğlak 44 ve 15 Mart'ta 24 Oğlak 53'tür. Dolayısıyla günlük hareketi 12° 09'. 15 Mart ile 16 Mart arasındaki günlük hareketi 12° 24'. 24 saat boyunca artış miktarı böylece 15' olur.

15 Mart öğlen zam 15'in ½'si veya 8'. Bu nedenle öğlen hareketi, 12° 24' günlük hareketten veya 12° 16' günlük hareketten 8' daha azdır.

Günlük hareket azaltıldığında, 12° 24' 744' olur. 744'ü 15' günlük artışa bölmek, her 1' artış için Ay'da 50' yolculuk verir. 15 Mart 1920 öğlen, Ay'ın Kova burcuna girmesi 5° 07' veya 307'dir. 307'yi 50'ye bölmek Ay'ın Kova'ya girdiği andaki artışı öğlenki artışından 6' fazla verir. Artışı öğlen ile bu konum arasında yarı yolda istediğimiz için 6'yı 2'ye bölüyoruz ve 3' veriyor. Bu 3' öğlen 12° 16' hareketine eklenmesi, 5° 07' için ortalama seyahati 12° 19' olarak verir.

(a) 12° 19' veya 739' dir.

(b) 5° 07' veya 307'.

(c) 24 saat veya 1440m.

Orantılı olarak, (b) 307'yi (c) 1440 ile çarpmak 442080'i verir. 442080'i (a) 739'a bölmek (d) 598' veya 9h 58' verir. Logaritmalarla, log çıkarma. (a) günlükten .2897. (b) .6712, günlük olan .3815'i verir. (d) 9h 58'.

Her iki yöntemle de bulunan 9h 58m'yi öğlene eklemek, Moon 00 Kova 00 15 Mart 1920, 21:58 Greenwich saatini verir.

Güneş Devrimleri

Bir güneş devrimi, transit Güneş'in doğum haritasında kapladığı zodyak aynı işaretine, ° ve 'ine döndüğü an için dikilen bir haritadır. Harita, kişinin o sırada işgal ettiği enlem ve boylam için dikilmelidir. Araştırma departmanımız, güneş devrimlerini gelecek yıl boyunca neler olacağını göstermede güvenilir bulmadı. Ancak Güneş'in doğum haritası konumu üzerinden geçiş zamanı, yaratıcı bir değer dönemidir.

Örnek 8. 1932'de Los Angeles, California'da günün hangi Standart saati için, 317c çizelgesine göre bir güneş devrimi çizelgesi oluşturulmalıdır?

4 Temmuz 1932, efemeris Güneş 12 Yengeç 16'yı gösterir ve bu nedenle gerekli konumdan (b) 20' eksiktir.

Güneş'in günlük hareketi (a) 57' dir.

(c) 24 saat veya 1440m.

Problemi sıradan bir şekilde çözmek, (b) 20' hareket etmek için Güneş'in 8sa 25m gerektirdiğini gösterir. Greenwich saatiyle 20:25'ten, Los Angeles'ın 8h Standart saat farkını çıkarın ve geçiş yapan Güneş birleşimi Güneş'i verir.*r* 4 Temmuz 1932, 00:25, Pasifik Standart Saati.

Ay Devrimleri

Geçiş yapan Ay, doğum haritası yeri ile kavuştuğunda, bir tür ay devrimidir. Diğer ve daha yaratıcı dönem, transit Ay'ın Güneş'in doğum haritası konumuyla kavuştuğu zamandır. Her iki durumda da harita, kişinin o sırada işgal ettiği enlem ve boylam için oluşturulmalıdır. Araştırma departmanımız, bir sonraki ay boyunca ne olacağını gösteren Ay devrimlerini güvenilir bulmadı. Ve Yeni Ay tarafından işgal edilen doğum haritasındaki evin, sıradan geçiş konumlarından daha önemli olduğunu bulamadı. Bu konuda çok fazla araştırma yaptıktan sonra, bir doğum haritası armatürüne veya başka bir doğum haritası konumuna düşen Güneş veya Ay tutulmasının, ağır bir geçişten daha önemli olmadığını keşfetti.

Bir ay döngüsünü oluşturma zamanını bulmak için, örnek 2, 3 ve 4'te gösterildiği gibi, bir açının mükemmel olduğu veya bir gezegenin belirli bir konuma ulaştığını hesaplarken olduğu gibi Ay'ın döngü konumuna ulaştığı zamanı bulun.

Günlük Devrimler

Günlük bir devrim, Asc an için dikilmiş bir çizelgedir. verilen günde, Asc'ın işgal ettiği zodyağın, ° ve ' işaretine ulaşır. doğum haritasında. Grafik şu şekilde olmalıdır:

o sırada kişinin işgal ettiği enlem ve boylam için dikilir. Araştırma departmanımız, ertesi gün ne olacağını göstermek için günlük devrimleri güvenilir bulmadı.

Yükselişte seçilen bir işaret, ° ve ' vermek için bir çizelge oluşturulacak günün saatini bulma örnekleri. Bölüm 8'in 249 ve 251. sayfalarında verilmiştir (Seri Ders 117).

-

Kurs X-2

Doğum Astrolojisi:
Bölüm 2 Burcun Gelişimi

Bölüm 8

Burcun Düzeltilmesi

Seri Ders Numarası 117

Orijinal Telif Hakkı, 1934
Elbert Benjamin
aka CC Zain

Telif hakkı 2010, Işık Kilisesi

Doğruluk için Düzeltilmiş Tablonun Kontrol Edilmesi

30 farklı mesleğin doğum haritası sabitleri referans kitabında verilmiştir.*Meslek Nasıl Seçilir*.[1]20 farklı olayın doğum haritası ve ilerleme sabitleri referans kitabında belirtilmiştir.*Ne Zaman ve Hangi Olaylar Olacak?*.[2]160 farklı hastalığın doğum haritası ve ilerleme sabitleri, Kurs XVI, Stellar Healing'de verilmektedir. Diğer doğum haritası ve ilerleme sabitleri, ek C. of L. Astrological Reports'da verilmiştir.

Eğer çizelge doğruysa, olaydan etkilenen yaşam bölümünün haritasını çıkaran evin yöneticisine ve olayın ana-ilerlemiş sabitlerine - genellikle birkaç evin yöneticilerini içeren - yalnızca büyük ilerlemeli bir yönü olmayacak. olayın meydana geldiği zaman, ancak ek bir kontrol olarak, her durumda olayı gösteren ana-ilerlemiş yön, küçük-ilerlemiş bir yön ile güçlendirilmeli ve bir geçiş yönü tarafından serbest bırakılmalıdır. Hem küçük-ilerlemiş yönü hem de transit yönü, bu büyük-ilerlemiş yönün dört terminalinden birine yapılmalıdır.

Evin yöneticisi, büyük-ilerlemiş açıdan etkilenen yaşam bölümünün ve diğer büyük-ilerlemiş sabitlerin her birinin haritasını çıkarsa, böylece küçük-ilerlemiş bir yön tarafından güçlendirilmezse ve geçiş anında bir geçiş yönü tarafından serbest bırakılırsa. olay, grafiğin ev konumları doğru değil.



David Bellasco

25 Temmuz 1853, 23:40 LMT 122½W 38K.

Ünlü (1.'de 10. hükümdar, üçlü MC) tiyatro yapımcısı Venüs kavuşumu Merkür 5. ev, tiyatro evi, üçgen Ay, altmışlık Mars; Merkür üçgen Plüton, altmışlık Mars.

Halktan bol miktarda para; Jüpiter 8.evde, Güneş üçgeninde, Ay üçgeninde.

Dramatik yetenek: Neptün yükselmiş, Yükselen sekstil, yarısekstil Ay.

Özgünlük: Uranüs birleşimi Asc.

Başkalarıyla işbirliği. Plüton, Güneş ile kare, Merkür üçgeni.

Organizasyon, sistem, azim: 1. Satürn, sekstil Güneş.



Bölüm 8

Burcun Düzeltilmesi

Bu derslerde sunulan görüşlere göre doğum haritası, insanın astral bedenindeki düşünce enerjilerinin bir haritasıdır ve ilerlemiş yönler, evrenin zamanını ve doğasını haritalar. bu düşünce enerjilerine gezegensel enerjiler ekleyen iç-düzlem hava durumu. Böylece doğum astrolojisi, seçilen herhangi bir zamanda insanın daha ince bedenindeki çeşitli güçleri tahmin etmenin bir aracı haline gelir.

Bu kuvvetler, herhangi bir doğa kuvveti gibi, kendi hallerine bırakılırsa, alışık oldukları kanallardan akarlar. Elektrik akımı ve bir akarsu akımı veya ağaçların arasından rüzgar böyle akar. Böylece Güneş'ten gelen ışık da dünyamıza çarpar. Yine de tüm bu güçler insan tarafından dizginlenmiş ve kendi seçtiği işi yapmak için alışılmış kanallarından saptırılmıştır.

Ve bu doğum astrolojisi dersleri dizisinin amaçlarından biri, yalnızca insanın astral bedenine ulaşan enerjilerin hacim ve doğal eğilimleri olarak nasıl doğru bir şekilde tahmin edilebileceğini göstermek değil, aynı zamanda bunların hangi yöntemlerle uygulanacağını da göstermek olmuştur. kontrol edilebilir, yönlendirilebilir ve onlardan en çok arzu ettiği işi yapmak için kullanılabilir.

Ancak, güçlerinin böyle bir tahmini doğru olacaksa ve daha yapıcı bir amacı gerçekleştirmek için nasıl yönlendirilebileceklerine ilişkin talimatlar sağlam olacaksa, bu konuların yargılandığı temeli oluşturan doğum haritası. doğru olmalı.

Ne yazık ki, birçok insan doğum saatini bilmiyor. Doğanın, insanın bu ihmalini gidermek için kesin ve kolay bir yol sağlaması gerektiği söylenebilir. Ancak keşfedebildiğim kadarıyla, her doğumun doğru zamanlamasının önemini kavrayamayanların cehaletini telafi edebileceğimiz bu kadar kolay ve kesin bir yöntem yok. Ve bu Doğada oldukça tutarlı görünüyor; çünkü yanlış yapmak ne kadar masum olursa olsun, cehalet için pahalı bir ödeme yapmak onun adetidir.

Keşke sadece doğum günü bilindiğinde, doğum haritasının düzeltilebileceği ve böylece burç, derece ve dakika yükselişinin kesin olarak bilinebileceği kolay bir yöntem olsaydı. Yine de "ev başlangıç noktalarını ilerletme", "öğle noktası yöntemi", "gün doğumu yöntemi", "gelgit noktası yöntemi", "sekizgen nokta yöntemi", "geliştirilmiş Mısır yöntemi", "işaretçi yöntemi" ile deneyler yaptım. yöntem", saat çizelgesine dayalı yöntemler ve kişinin adına dayalı yöntemler, hiçbirinde arzu ettiğim kesinlik ve kesinliği bulamadan.

Dergiler, kolay ve kesin bir yöntemle doğum haritasını düzeltecek kişilerin parlak ilanlarını tutuyor. Yine de, bu bireylere doğru zamanlanmış bir doğum gönderildiğinde, yalnızca gün belirtilmişse, haritanın doğru olarak döndürülmesinin çoğu zaman tamamen farklı olduğunu görüyorum.

doğum hastanesinde elektrikli saatin verdiği süre için dikilenden daha fazla.

Günün saati verilse bile, önce düzeltmedikçe, asla bir çizelge çizmemekle övünenler var.

Araştırma departmanımızda, verilen günün saatini kullanmayı her zaman daha iyi bulduk. Bu şekilde elde edilen çizelge birkaç derece hatalı olabilir; ancak doğumda bulunan biri tarafından bir saat tarafından tespit edilen yaklaşık zamanı kullanarak ortaya çıkan hatanın, haritayı bir teoriye uydurmaya çalışırken yaygın olarak meydana gelen hatadan çok daha küçük olduğuna inanıyoruz. Bir doğum doğru zamanlanmışsa, onu herhangi bir şekilde dengelemenin büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Teoriler gerçeklere uyacak şekilde yapılmalıdır ve gözlemlenen doğum zamanı, bu durumda tüm teorilerin uygun hale getirilmesi gerektiği gerçeğidir.

Gelecekteki belirsiz doğum zamanlarının en iyi çözümü, tüm doğumların doğru bir şekilde zamanlanmasını ve kaydedilmesini sağlayacak bir kamuoyu oluşturmaktır. Ancak bu arada doğum gününü bilen ama saatini bilmeyenlerin cesaretinin kırılmasına gerek yok. Bir harita üzerinde, haritanın ait olduğu kişinin işbirliği ile yeterince çalışma yapılırsa, onu düzeltmek, yani Yükselen üzerindeki işaret, derece ve dakika kesin olarak tespit edilene kadar onunla deney yapmak mümkündür. Ancak yapılan iş, bireye sağladığı fayda, harcanan emekten ölçülemeyecek kadar daha değerliyken, çoğu zaman o kadar büyüktür ki, profesyonel astrolog ona gereken özenli bakımı vermeyi göze alamaz. Zamanının bir değeri vardır ve aldığı tazminat karşılığında belki birkaç gün harcamayı göze alamaz.

Ancak astroloji öğrencisi, doğru olduğundan emin olana kadar çizelgesini deneyebilir. Profesyonel bir astrologun maaş olarak alacağı birkaç cüzi dolar yerine, eğer haritasını anlamak için zahmete girerse, bu onun için çok daha başarılı bir hayat demektir. Başarı ve başarısızlık arasındaki tüm fark anlamına gelebilir. Zaman ve emek açısından maliyeti ne olursa olsun, doğru doğum haritasına sahip olmamayı göze alamaz.

Düzeltmede İlk Adım

İlk adım, genel bir kural olarak, yükselen burcu bulmaktır. Bölüm 3 (Seri Ders 105), Kurs XI'de belirtildiği gibi oldukça sık,*Burç Tanımlamak*, birinci evdeki gezegenler, Yükselen'in zirvesini yöneten gezegenin bulunduğu burç, Güneş burcu ve Hakim gezegen, hepsinin kişisel görünüm üzerinde bir miktar etkisi vardır. Bu nedenle, ara sıra yükselen burç, kişiyi hiçbir hata yapamayacak kadar net bir şekilde işaretlese de, daha sıklıkla bu diğer etkilerin birleşik etkisi o kadar güçlüdür ki, yalnızca yükselen burcun verdiği görünümden yargıyı yetersiz kılar.

Daha yaygın olarak, kişisel görünüm, doğru doğum haritasına işaret eden bir dizi göstergeden biri olarak alınmalıdır. Bu diğer faktörlerle birlikte kullanılmalıdır ve bunu yapmak için kişi hakkında ne kadar çok şey bilinirse o kadar iyi olur. Hayatın her bölümünde sahip olduğu servet türü ve her biriyle ilgili olağanüstü olayların ne zaman gerçekleştiği önemlidir.

Hayatın herhangi bir bölümüne göre zaten çekilmiş olan servet, kendi içinde net bir şekilde kesildiğinde.

eğilim, bir gezegenin, Anahtar Kelimesi ve yönlerinin Anahtar Kelimesi ile bu servetin özelliği olan yaşam bölümünü yöneten eve hükmettiği anlamına gelir.

Bir ev, o evde olmayan bir gezegen tarafından yönetilebilir, bu doğru. Ancak, yaşamın 12 evin her biri ile ilgili olarak deneyimlediği olaylara veya koşullara atıfta bulunarak, bir önceki açıları gösteren bir deneme çizelgesi ile araştırma yaparak, gezegenlerin tam olarak nasıl uyması gerektiği çoğu zaman çabucak anlaşılır hale gelir. bilinen etkileri üretmek için çeşitli evler.

Bu, yapbozun bir araya getirilmesine çok benzer. Başlangıç olarak, yükselen burç hakkında herhangi bir fikir yoksa, bir Doğal Harita kullanmak iyi olur. Yani, Yükselen'de derecesi olmayan Koç olan bir çizelge kullanmak. Bu deneme haritası daha sonra, gezegenlerin ev konumlarına ve evlerin gezegensel yönetimine ilişkin, yaşamın bilinen gerçeklerine uyan bir yere ulaşana kadar, yavaş yavaş döndürülerek manipüle edilebilir. Ve bir yapboz gibi, uygun ilişkiler kurulduğunda, doğru kombinasyonların elde edildiği açıktır.

Doğal Harita, Koç'un 1. evin zirvesinde, Boğa'nın 2. evin zirvesinde, İkizlerin 3. evin zirvesinde olduğu bir haritadır; doğum gününde Greenwich'teki efemeriste göründükleri gibi yerleştirilmiş gezegenlerle.

Bu, doğum saati yaklaşık olarak bilinmediğinde bile kullanılacak tüm çizelgelerin en iyisidir ve dikkatli olmak için gereken büyük miktarda işi yapmak için hiçbir teşvik yoktur.

düzeltme. Yani, yükselen burçta sadece bir tahminde bulunmaktansa, böyle bir çizelgeden hüküm vermek daha iyidir.

Böyle bir Doğal Haritadan, her gezegenin etkilediği yaşam bölümünü tahmin etmek için hiçbir girişimde bulunulmamalıdır. Bu gibi durumlarda Bölüm 3 (Seri Ders 47), Kurs II'de verilen bir evdeki gezegenlerin genel önemini bilmek yeterlidir.*Astrolojik İmzalar*ve Bölüm 7 (Seri Ders 116).

Birkaç dakika içinde doğum günü için efemeristen kopyalanabilen böyle bir Doğal Harita ile başlayarak, göz, efemeris sayfasını ve burada gösterildiği gibi gezegenler arasında oluşan başlıca yönleri takip etmelidir - Major-İlerlemiş Gezegenlerin İlerlemiş Yönleri - ve efemeristeki gezegenler ile doğum haritası gezegenleri arasında oluşan başlıca yönler - doğum haritası gezegenlerinin Başlıca İlerlemiş Yönleri not edildi.

Herhangi bir çizelge oluşturmadan bile, hazır zekalı bir kişi, kendisine yardımcı olacak bir dizi efemeridden başka bir şey olmadan, halka açık bir platformdan oldukça şaşırtıcı bir astroloji gösterisi sunabilir.

Dinleyicilerden birinin doğum gününü ve yılını vermesini ister. Efemeriste bu tarihi bulur ve parmağıyla işaretler.

Sonra, okumayı alan kişi yaşlıysa, gözünü efemeris sütununda veya hatta birkaç sayfasında gezdirir ve Büyük-İlerlemiş Gezegenler arasındaki ve onlardan doğum haritasına kadar daha muhteşem yönleri seçer. parmağıyla işaretlediği gezegenler.

Doğum tarihinden görünümün oluştuğu güne kadar efemeriste günler gibi yıllar geçtiğini sayarak, böyle bir yılda bireyin çok sıkıntı çektiğini, aşılması gereken engellerin olduğunu, aşılması gereken engellerin olduğunu seyirciye anlatır. hayal kırıklığı ve kayıp vb. vardı. Mevcut olanlara, kendisinin adlandırdığı bir başka yılda, bireyin iyi bir talihinin olduğunu, sevgi konularının başarılı olduğunu veya ilerleme için güzel fırsatların mevcut olduğunu bildirir.

Gezegenin genel doğası olaya eşlik eden koşulları ve Bölüm 6 (Seri Ders 108), Kurs XI'de verilen açının Anahtar Kelimesini gösterir. *Burç Tanımlamak*, hayatın içine çekilen talih veya talihsizliğin doğasını gösterir. Bölüm 3, 4 ve 5 (Seri Dersler 112-114), her bir Ana-İlerlemiş Yön altında on gezegenin her birine yaygın olarak neyin çekildiği konusunda daha fazla bilgi verir.

Yönleri hızlı bir şekilde not etmek ve meydana geldiklerinde geçen günlerin sayısını önceden saymak için hızlı bir öğrenci, böylece, başlıca Büyük Gelişimlerin çoğunun astral beden boyunca geçici yıldız antenleri oluşturduğu yılları bulabilir ve bunu kendisi kadar hızlı yapabilir. Kürsüden böyle bir okuma vererek konuşabilir.

Her durumda yalnızca en belirgin Ana-İlerlenmiş Yönleri seçerek, genel terimlerle tanımladığı olayın belirlenen yıl içinde gerçekleştiğini garanti edebilir. Elbette ayrıntı veremez veya ilerlemiş açıdan etkilenen yaşam bölümünü belirleyemez, çünkü bu, gezegenlerin ev konumlarının bilinmesini gerektirir. Ancak böyle bir yöntemi izleyerek şunları gösterebilir:

tek bir akşam boyunca bir dinleyici topluluğunda çok sayıda insan hayatlarının en belirgin olaylarını ve bunların meydana geldiği yılları belirtir.

Deneme ve hata

Olaylar bu şekilde genel terimlerle ve ev konumları olmadan yaklaşık tarihlerde tanımlanabildiğinden, öğrencinin düzeltme sürecinde bir gezegen tarafından yaygın olarak uygulanan genel etki ile etkilenen yaşam bölümü arasında dikkatli bir şekilde ayrım yapması gerekir.

Işık Kardeşliği Astrolojik Raporları, burçlar ve gezegenler doğru evleri işgal edene kadar haritayı döndürmeye yönelik bu deneme yanılma sürecinde çok yardımcı olacaktır. Çeşitli meslekler için Doğum Haritası Sabitleri değerli ipuçları verebilir. Aynı şekilde, XVI.*yıldız şifa*, istihdam edilebilir.

Bu B. of L. Raporlarına atıfta bulunarak, örneğin, yalnızca 7. Evin hükümdarı için Büyük-İlerlemiş bir Yön olduğunda, insanların evlendiğini, ayrıldığını veya boşandığını görüyoruz. Boşanmada veya diğer konularda yasal işlem yapılırsa, 9'un hükümdarının zamanında Büyük İlerlemiş bir Yön vardır.

İnsanlar, ancak hem 5. Evin hükümdarı hem de 8. Evin hükümdarı için Büyük-İlerleyen bir Yön olduğunda ölüm yoluyla çocuklarını kaybederler. Anneler, yalnızca 10'uncu yüzyılın hükümdarı için bir Büyük-İlerlemiş Yön ve 8'in hükümdarı için bir Ana-İleri Yön olduğunda ölür. Babalar sadece oradayken ölür

4. Evin hükümdarı ve 8. Evin hükümdarı için Büyük İlerlemiş bir Yöndür. Erkek veya kız kardeşler, yalnızca 3. Evin hükümdarı ve 8. Evin hükümdarı için Büyük-İlerlemiş bir Yön olduğunda ölürler.

İnsanlar, yalnızca 2.'nin hükümdarı için Büyük-İlerlemiş bir Yön olduğunda para kazanır veya kaybeder. Yalnızca 6. Evin hükümdarı için Büyük-İlerlenmiş bir Yön ve 1. Evin hükümdarı için bir Büyük-İleri Yön olduğunda hastadırlar. Sadece 10'uncu Evin hükümdarı için Büyük İlerlemeli bir Yön ve 6'nın hükümdarı için bir başka Yön olduğunda iş bulurlar veya onu kaybederler.

Bu İlerlemiş Sabitler ve B. of L. Astrological Reports'da verilen diğerlerinin yanı sıra olağanüstü bir olayın esas olarak etkilediği evin yönettiği yaşam bölümünün tümü, evlerin birbirleriyle olan ilişkisine ilişkin göstergeler olarak kullanılabilir. Doğru doğum haritasındaki burçlar ve gezegenler

Bu deneme yanılma yöntemiyle, doğru olana yakın görünen bir harita elde edildiğinde, gezegenin gezegenin içinde olup olmadığını anlamak için, gösterilen yaşam bölümünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak her ev sırayla dikkate alınmalıdır. ya da zirvesine hükmediyorsa, böyle bir talih ya da talihsizliği gösterir. Benzer şekilde, evi yöneten gezegenin Başlıca-İlerlemiş Yönleri, belirtilen zamanlarda çekilen olayların beklendiği gibi olup olmadığını belirlemek için hesaplanmalıdır.

Küçük İlerlemeler, kendi haritasını düzeltmeye çalışan veya oldukça yakından ilişkili olduğu bir kişinin haritasını düzeltmeye çalışan kişi için de büyük değer taşır.

İyi tanımlanmış bir Küçük Olayı cezbetmek için yeterince öneme sahip yeni bir Küçük-İlerlemiş Unsur oluşana kadar nadiren uzun süre beklemek gerekir. Bu tür olaylar nadiren bellekte güçlü bir şekilde işaretlenecek kadar önemlidir. Ancak ortaya çıktıklarında kolayca gözlemlenirler. Ve, Ana Gelişmeler kadar, açı yapan gezegenlerin yönettiği veya işgal ettiği evler tarafından yönetilen yaşamın bölümleriyle ilgili olayları çekme eğilimindedirler. Ve çok sık meydana geldikleri için, seçilen doğum haritasının doğruluğunu tamamen kontrol etmek için bir yıl içinde yeterince gözlemlemek mümkündür.

Bu nedenle, birey özellikle iyi vakit geçirdiği bir sosyal etkinliğe davet edilirse, onunla çakışan Küçük-İlerleme Yönü'ne bakabilir. Ödenmesini hiç beklemediği küçük bir borç tahsil edilirse, o günkü Küçük İlerlemelere baksın ve bu tahsilat ile seçilen tablodaki evin konumu açısından nasıl örtüştüğünü tespit etsin. Ya da bir düşman edinirse, küçük bir yolculuğa çıkarsa ya da hayatın ortak akışını oluşturan sayısız Küçük Faaliyetlerden herhangi birini yaparsa, o zamandaki Küçük Gelişmelerin ev konumlarıyla olan ilişkileri aracılığıyla nasıl ortaya çıktığını gözlemlemesine izin verin. karar verdiği tablodur.

Deneme Tablosunun Günün Saatini Bulma

Böyle bir deneme ve yanılma çizelgesi, 10. evde yaklaşık olarak bir dereceye kadar işarete sahip olmalıdır. Evler Tablosundan, bu burç ve derece 10'undayken verilen çeşitli ev başlangıç noktalarına diğer burçları ve dereceleri kopyalayın. Ardından, Evler Tablosunda, 10'uncu ayın zirvesindeki bu işaret ve derece konumuna Yıldız Zamanının ne karşılık geldiğini gözlemleyin. Efemeris'te doğum gününe dönün

ve orada verilen Öğlen Yıldız Zamanına dikkat edin. Efemeris'te verilen öğlen için Yıldız Saati ile burç ve dereceden ve 10. ayın zirvesinde belirlenen doğumun Yıldız Saati arasındaki fark, doğumun gerçekleştiği gün Öğleden itibaren yaklaşık LMT Aralığını verir.

Öğrenci, bu Aralığın başka bir güne geçmeden 12 saatten fazla olamayacağını ve bunun caiz olmadığını; çünkü insanlar genellikle doğdukları günü bilirler. Sonuç olarak, fark 12 saatten fazla göründüğünde, Öğleden Aralığı bulmak için, daha az olan Yıldız Zamanına 24 saat eklenmeli ve diğer Yıldız Zamanı bundan çıkarılmalıdır.

30 Kasım 1920 için, MC'de 00 Boğa 00 ile bir haritamız olduğunu varsayalım. Şimdi 16h 36m 13s'den 1h 51m 37s çıkarırsak, bize 14h 44m 36s'lik bir Aralık verir. Öğlen Yıldız Saati 16h 36m 13s olduğundan ve 1h 51m 37s elde etmek için bu Aralığı çıkardığımız için, günün saatini almak için Öğleden 14h 44m 36s çıkarmamız gerektiğini gösterir. Ama bu bizi bir önceki güne, yani doğumun 30 Kasım'da yapılmasına izin verilmeyen 29 Kasım'a götürüyor.

Bu nedenle, bunu yapmak yerine, 1h 51m 37s'ye 24h ekleriz ve bize 25h 51m 37s veririz. Ve bundan bize 9h 15m 24s veren 16h 36m 13s'yi çıkarıyoruz. Ve Öğlen Yıldız Zamanına gelince, Yıldız Doğum Zamanını elde etmek için bu 9h 15m 24s'yi eklemeliyiz, bu Aralığın Öğleden Sonra olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak doğum zamanı, 30 Kasım 1920, 21:15 LMT eksi veya artı EGMT Aralığı için saat başına 9.86 saniye düzeltmesidir.

MC'de Tam Dereceyi ve Dakikayı Bulma

Öğrenci, doğum çizelgesini deneme yanılma yöntemiyle olabildiğince yakından düzelttiğinde, daha sonra MC'de tam derece ve dakikayı tespit etmeye çalışmalıdır. Bu çalışmada, iki yöntemden birini veya her ikisini uygulayabilir. Biri Prenatal Dönem Metodu, diğeri ise Yükselen ve Midheaven'ın ilerlemelerini ve ilerlemelerini kullanmaktır.

Asc. ve MC, yalnızca yaşamda gezegenlerin ilerleyişleriyle yeterince açıklanamayan olaylar olduğunda mümkündür.

Asc için İlerleyen yönleri. ve MC ve Asc. ve MC, enerji toplayan ve olayları yaşama çeken geçici yıldız antenleri oluşturmada, gezegenlere ve gezegenlere benzer yönler kadar etkilidir. Sonuç olarak, doğum haritasında bu Açılardan veya bu Açılardan güçlü Büyük İlerleme Yönleri varsa, bunlar karakteristik olaylarla işaretlenmiş olmalıdır.

Asc'ye veya Asc'den ilerlemiş yönleri kullanmada karşılaşılan zorluk. ve MC düzeltmenin temeli olarak, beklenenden daha sık olarak, aynı zamanda bu gelişmiş yönlerden birinin yürürlükte olduğu gerçeğinde yatmaktadır, aynı zamanda gezegenler arasında ilerlemiş bir görünümdür. Bu şartlar altında olayın çekilmesinde Asc'ın hangi rolü üstlendiğini belirlemek hiçbir şekilde basit bir mesele değildir. veya MC ve Büyük-İlerlemiş gezegenler tarafından hangi kısmın alındığı.

Translated from English to Turkish - www.onlinedoctranslator.com

Yine de şundan emin olabiliriz ki, Büyük İlerleyen Asc. veya Büyük-İlerlemiş MC, gezegenlere olağanüstü açılar yapar veya Büyük-İlerlemiş gezegenler, Yükseliş için olağanüstü açılar yapar. veya MC, oldukça önemli olaylar hayata girer. Eğer Asc. dahil, bunlar kişisel konularla ilgilidir; ancak eğer MC, işin bir parçasıysa, onur ve iş etkilenir. Bu nedenle, deneme çizelgesinde bu ağır ilerlemeli yönler oluştuğunda böyle hiçbir koşulun mevcut olmadığı keşfedilirse, bunun henüz tam olarak doğru olmadığı kesindir.

İyi bir yöntem, ilk olarak, her birinin zamanında gezegenlerin Ana-İlerlemiş Yönleri ile meydana gelen yaşam olaylarını karşılaştırmak, her olayın bu şekilde uygun şekilde açıklanıp açıklanmadığını ve değilse de Yükseliş'i içeren bir ilerlemenin olup olmadığını ayırt etmektir. veya MC bunu hesaba katsa iyi olur. Bunu yaptıktan sonra, Ana-İlerlenmiş Yönleri Yükseliş'ten ve Yükseliş'e taşıyın. ve MC, doğumdan başlayarak ve düzeltmenin denendiği zamana kadar her birini tablolaştırarak.

Grafik, Asc üzerindeki tam dereceye göre doğruysa. ve MC, bu şekilde çizelgelenen her bir ilerlemiş yönün zamanı, yaşamdaki karakteristik bir olaya karşılık gelecektir. Olaylar, bu gelişmiş yönlerin zamanıyla yakından örtüşmüyorsa, tablonun daha fazla manipülasyona ihtiyacı vardır; ve bu durumda doğruya yakınsa Asc yapmak için gereken ileri veya geri hareket miktarı. ve MC'nin olaylara uygun şekilde uyması genellikle açıkça belirtilir. Daha ileri bir kontrol olarak, Asc'ye gidiş ve gelişte Minör İlerleyen Yönler. ve MC kullanılabilir.

Bu deneme yanılma yöntemi, sürekli çalışma ve dikkatli kontrol gerektirir, ancak kapsamlı bir şekilde uygulanırsa, bildiğim başka herhangi bir yöntemle düzeltilmiş olandan daha örtülü olarak güvenilebilecek bir çizelge verir.

Hermes'in Truitini

Normal koşullar altında, bir çocuğun gebe kaldığı andaki ufuk ile doğum anındaki Ay'ın yeri arasında bir konum değişimi var gibi görünmektedir; ve bir çocuğun gebe kaldığı andaki Ay'ın yeri ile bir çocuğun doğum anındaki ufuk arasındaki konumların değişimi.

Yer ve gök arasındaki sempatik ilişkilere yapay koşullar veya istenmeyen olaylar müdahale etmediğinde, Yükselen veya Alçalan burcundaki burcun derecesi, doğumda Ay'ın işgal ettiği burcun derecesi olur; ve Ay'ın gebe kaldığında işgal ettiği zodyak derecesi, doğumda Yükselen veya Alçalan burçtaki zodyağın derecesi olur.

Hermes'in Truitine'i olarak uzak bir geçmişten aktarılan bu yasa, diğer değerli faktörleri ekleyen modern astrologlar tarafından güçlendirildi. Bu eski yasanın modern faktörlerle ve çok sayıda ayrıntıyla bağlantılı olarak uygulanması, Doğum Öncesi Dönem adı verilen ayrıntılı bir teoriye yol açmıştır.

Doğum Öncesi Dönem

Doğum öncesi dönem, burçları düzeltmede çok değerlidir, ancak bence, tüm astrologlar tarafından paylaşılmayan, zaman olmadığı sürece düzeltmede oldukça değersizdir.

Doğum tarihi, başka bir yöntemle doğru zamandan yarım saat sonra belirlenir.

Yöntemi uygulamak için, Ay'ın döllenme sırasında işgal ettiği burcu ve dereceyi yaklaşık olarak bilmek gerekir ve bunu tespit etmek için doğumda Yükselen üzerindeki yaklaşık işareti ve dereceyi bilmek gerekir.

Bu bağlamda kullanılan gebe kalma sözcüğü, herhangi bir fiziksel eylemle çakışmaz, ancak yumurta ve spermin birleşmesi yoluyla, doğacak çocuğun astral bedeninin böylece döllenmiş yumurtaya bağlandığı anı belirtir. Benim düşünceme göre, herkes tarafından paylaşılmayan bu bağlılık, hiçbir zaman ebeveynlerin fiziksel ilişkilerinden önce gelmez. Bununla birlikte, yumurtanın döllenmesi ve astral formun ona bağlanması, ebeveynlerin birleşmesinden sonraki birkaç gün içinde herhangi bir zamanda gerçekleşebilir.

Yaklaşık olarak bilinen doğum zamanı ve kesin olarak bilinen gebelik gün sayısı ile, gebe kalma zamanını yakından hesaplamak basit bir meseledir; Ay'ın doğum haritasında işgal ettiği derece, o sırada ufuktaki dereceyi temsil eder ve Ay, doğum haritasının yaklaşık olarak bilinen ufkundan çok uzakta olmayan bir zodyak derecesinde olmalıdır.

Döllenme anındaki ufuktaki derece ve işaretten, gebe kalma anındaki günün saati kolaylıkla hesaplanabilir ve bu andan itibaren, herhangi bir doğum haritasında olduğu gibi, Ay'ın gebelikteki derecesi belirlenebilir. Bu şekilde bulunan Ay'ın gebe kalma derecesi, doğum haritasının ufkunda tam dereceyi temsil eder.

Ne yazık ki bu yöntemin yanılmazlığı nedeniyle, bazı durumlarda kesin gebelik gün sayısını belirlemek çok zordur.

Yöntemin hevesli savunucuları, kadranların varsayılan değerine ve zodyakın belirli derecelerinin varsayılan cinsiyet değerine dayanan çok karmaşık bazı Cinsiyet Kanunları formüle etmişlerdir. Ay ve Yükselen'in kapladığı alanın değerine göre, çağ için -gerçek gebe kalma anının yaygın olarak bilindiği gibi- dikilen harita çocuğun cinsiyetini doğrulamadıkça, çağ hayali ve farklı bir çağ için bir çağ olarak kabul edilir. gün aranır.

Hermes'in Truitine'i kesinlikle bir doğal yasa formüle ediyor gibi görünse de, savunucularının adlandırdığı şekliyle bu "Üstün Cinsiyet Yasası", bana üstü kapalı olarak güvenilemeyecek kadar yapay ve teorik görünüyor. Yine de, doğum astrolojisi pratiğinde karşılaşılan en zor durumlardan birini çözmek için ciddi, en azından kısmen başarılı bir girişim olduğu için, araştırmayı ve eleştirel çalışmayı hak ediyor.

Bunu yapmak isteyenler, Doğum Öncesi Dönemle bağlantılı olarak “En Üstün Cinsiyet Yasası”nın çeşitli sonuçlarının tam bir açıklamasını EH Bailey tarafından yazılan ve şu başlığı taşıyan oldukça büyük bir kitapta bulabilirler.*Doğum Öncesi Dönem*.

Kendi araştırmalarımda ve araştırma departmanımızın araştırmalarında, bu kadar belirsiz bir konuda karar vermenin mümkün olduğu kadar yakın olduğunu, doğum zamanı yaklaşık olarak bilindiğinde “Üstün Cinsiyet Yasası” na başvurmadan doğumun gerçekleştiğini bulduk. çizelge düzeltilebilir

On çizelgeden yaklaşık yedisinde Doğum Öncesi Dönem tarafından yükselen burcun doğru derecesi ve dakikası. Görünüşe göre, tüm çizelgelerin yaklaşık %30'u düzenli tedavi yöntemine uymuyor, çünkü aletli doğumlar, yapay ortam veya diğer koşullar nedeniyle gebelik süresi normal kurala uymuyor.

Bu varyasyonları hesaplamak için Bailey tarafından verilen kurallar vardır, ancak bunlar kısa süre sonra onları tamamen tatmin edici kılmayan şaşırtıcı karmaşıklıklara yol açar. Sonuç olarak, öğrencinin Doğum Öncesi Döneme çok kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma yapmak için zamanı ve eğilimi yoksa, Doğum Öncesi Dönem tarafından yapılan düzeltmenin olası gözlem hatasının ötesinde bir doğum zamanı verdiğini bulduğunda, onun için daha iyi olur. daha önce bahsedilen diğer yöntemlerle düzeltme.

Ay ve Yükselen veya Ay ve Torun olsun Kullanılmalıdır

Doğum Öncesi Çağı uygularken ilk temel bilgi, yer değişiminin Ay ile Yükselen arasında mı yoksa Ay ile Torun arasında mı gerçekleştiğidir. Bunu belirlerken, gebelik süresinin ortalamadan daha kısa mı yoksa daha uzun mu olduğunu belirlemede olduğu gibi, doğum haritasındaki en önemli üç faktörden diğeri olan Güneş'in de dikkate alınması gerekir.

KURAL XIX. Doğum haritasında Ay ışıkta Yükselirken, konumu çağda Yükselen üzerindeki derecedir ve Ay'ın çağdaki konumu doğum haritasındaki Yükselen üzerindeki derecedir.

KURAL XX. Doğum haritasında Ay ışıkta Azalırken, konumu çağda Torun üzerindeki derecedir ve Ay'ın çağdaki konumu doğum haritasındaki Torun üzerindeki derecedir.

Gestasyonun 273 Günden Daha Kısa veya Daha Uzun Olup Olmadığı

Ortalama gebelik süresi, on kameri ay veya dokuz takvim ayı veya 273 gün olarak kabul edilir. Gebelik süresinin 273 günden daha uzun mu yoksa daha kısa mı olduğunu bilmek için aşağıdaki kurallar formüle edilmiştir:

KURAL XXI Doğum haritasında Ay Işıkta Artıyorsa ve Dünyanın Altındaysa veya Işıkta Azalıyorsa ve Dünyanın üstündeyse, gebelik süresi 273 günden fazladır.

KURAL XXII. Doğum haritasında Ay, Işıkta Artıyorsa ve Dünyanın Üstündeyken veya Işıkta Azalıyorsa ve Dünyanın Altındaysa, gebelik süresi 273 günden azdır.

Gebelik Ne Kadar Daha Kısa veya 273'ten Daha Uzun?
günler

Gebelik süresinin 273 günden az ya da çok olduğu günlerin sayısını bulmak için geleneksel olarak aşağıdaki iki kural kullanılır:

KURAL XXIII. Gebelik süresinin ortalama uzunluktan daha fazla olduğu gösterildiğinde, doğum haritasında Ay ile Ufuk arasındaki dünyanın günlük dönüşü ile yaklaştığı derecelerin sayısını bulun ve

bu sayıyı 13'e (Ay'ın ortalama günlük hareketi) bölün, bu da gebeliğin işgal ettiği 273'ü aşan günlerin sayısını verecektir.

KURAL XXIV. Gebelik süresinin ortalama uzunluktan daha az olduğu gösterildiğinde, doğum haritasında Ay ve Ufuk arasındaki dünyanın günlük hareketi nedeniyle en son geçtiği derece sayısını bulun ve bu sayıyı 13'e bölün (Ay'ın ortalama günlük hareketi), gebelik tarafından işgal edilen 273'ten daha az gün sayısını verecektir.

Teorik olarak, efemeriste yukarıdaki kurallarla belirtilen gün sayısı kadar geriye doğru sayıldığında, Ay yaklaşık doğumda, yukarıdaki kurallarla belirlendiği gibi, aynı burçta ve Yükselen veya Alçalan tarafından işgal edilen tam dereceye yakın olmalıdır. çizelge.

Ne yazık ki, gerçekte durum her zaman böyle değildir, ancak Ay'ın böyle bir işaret ve derecede olduğu efemeriste genellikle bir güne yakındır ve bu durumda o son gün kullanılmalıdır. Cinsiyet Yasasının uygulanmasında, 273 günden fazla olduğunda gebelik süresine 14 gün daha eklendiği veya gebelik süresi gösterildiğinde 14 ek gün çıkarıldığı kuralında bir değişiklik vardır. 273 günden az olmalıdır. Ayrıca, Cinsiyet Yasası nedeniyle özel muamele gerektiren Üç Düzensiz Dönem olduğu varsayılmaktadır.

Karmaşıklıklar çoğalmaya başlar. Bununla birlikte, her on doğum haritasından yaklaşık yedisinin, doğum zamanı yaklaşık olarak bilindiğinde, bu ayrıntılı ve ayrıntılı bilgilerden herhangi birine atıfta bulunmaksızın Doğum Öncesi Dönem tarafından düzeltilebileceğine inanıyorum.

tüm astrologlar tarafından lehte tutulmayan özel düşünceler. Bu nedenle, normal Doğum Öncesi Kurallarını iki örnek çizelgeye uygulayalım:

Örnek 1. Kasım ayında New York'ta bir çocuk doğdu 22, 1920, yaklaşık olarak saat 05:00, Yerel Ortalama Saat. Gerçek doğum anında yükselen tam derece ve dakika neydi?

İlk önce, sadece Güneş ve Ay'ı ekleyerek doğum zamanı için bir deneme haritası oluşturuyoruz (Diyagram A bu bölümün önünde).

Ay ışıkta artarken -Güneş ile karşıt yöne doğru hareket ederken- Ay'ın doğum haritasındaki yeri, 11 Koç 41, çağda Yükselen'dir (Kural XIX). Ayrıca (Kural XXI) gebelik süresi 273 günden fazladır.

6 Akrep'ten 12 Koç'a 156 derecedir. Bunu 13'e bölün ve gebelik süresi olarak 273'ten 12 gün fazla verir (Kural XXIII).

9 takvim ayını geriye saymak bizi 22 Şubat'a getiriyor; ve 273 gün veya 10 kameri ay bulmak istediğimizden, doğumda olduğu gibi Ay'ın 12 Koç'ta bu güne yakın hangi tarihte olduğuna bakarız. Bu 23 Şubat 1920.

23 Şubat'tan 12 gün geriye saymak bize 11 Şubat'ı verir. Burada Ay'ı 17 Akrep'te buluyoruz. Ancak, doğumun doğru olmasının yarım saat veya daha kısa bir süre içinde gerçekleştiğine inanmak için nedenlerimiz olduğu için, Ay 5 Akrep 28'de olacak şekilde başka bir gün 10 Şubat'a geri dönüyoruz.

gebelik süresini bulma kuralı bizi doğru güne yaklaştırıyor ama tam günü vermiyor.

Bu gebe kalma gününde Yükselen veya Çağ, Ay'ın doğum haritasındaki yeri olduğu için, 11 Koç 41'in 10 Şubat 1920'de Yükselen'de saat kaçta olduğunu bulmalıyız. New York için Evler Tablosu 11 Koç 41 Yükselen'deyken Yıldız Zamanının 18h 27dk 00s olduğunu gösterir. 10 Şubat öğlen Yıldız Saati 21sa 17dk 06s idi. 21h 17m 06s'den 18h 27m 00s'yi çıkarmak, öğleden önce 2h 50m 06s'lik bir Aralık verir. Buna artı 2h 06m EGMT Aralığı (ST'den çıkarmaya eşdeğer) için saat başına 9.86s düzeltmesini ekleyin ve New York'taki Epoch'un eksi LMT Aralığı olarak 2h 50m 27s verir. Bu, saat 9:10 LMT New York veya artı 10 Şubat 1920'de 2h 06m EGMT Aralığı anlamına gelir.

Ay'ın 10 Şubat'taki yeri, artı EGMT Aralığı 2h 06m (9:10 LMT New York) 6 Akrep 31 olarak bulundu. Bu nedenle 6 Akrep 31 doğumda Yükselen'deydi.

New York Evleri Tablosu, 6 Akrep 31 Yükselen'deyken, Yıldız Zamanının 9h 05m 07s olduğunu gösteriyor. 22 Kasım 1920'de öğlen Yıldız Saati, 16h 04m 40s. 16h 04m 40s'den 9h 05m 07s'yi çıkarmak, öğleden önce 6h 59m 33s'lik bir Aralık verir. Buradan eksi 2h 04m EGMT Aralığı için saat başına 9.86s düzeltmesini çıkarın ve eksi 6h 59m 12s LMT Aralığı verir. Bunu öğlenden çıkarmak, New York'taki LMT doğum saatini 5:01 am olarak verir.

Örnek 2. Aralık ayında New York'ta bir çocuk doğdu 3, 1920, 15:08, Yerel Ortalama Saat. tam olarak neydi

Gerçek doğum anında Yükselen'de derece ve dakika?

Önce sadece Güneş ve Ay'ı ekleyerek bir deneme haritası oluşturuyoruz (Diyagram B bu bölümün başında).

Bu çizelgede verilen süre için Ay'ın Işıkta Azaldığı - Güneş ile kavuşum yönünde ilerlediği görülüyor. Bu nedenle (Kural XX), Ay'ın doğumdaki konumu, 25 Başak 41, döllenme sırasındaki Torun'du. Ayrıca (Kural XXII), gebelik süresi 273 günden azdı.

Kural XXIV'ü uygulamak, 26 Başak'tan 17 Akrep'e 51 derecedir. 51'i 13'e bölün ve gebelik süresinin 273 günden az olduğu gün sayısı olarak 4'ü verir.

Efemeris 9 takvim ayı içinde geri dönüp 26 Başak'ta tekrar Ay'ı gösteren bu zamana yakın bir gün ararken 5 Mart 1920'ye geliyoruz. Ancak görüldüğü gibi gebelik süresi bu ortalamadan 4 gün daha azdı. zaman, bu yüzden 9 Mart'a Epoch günü olarak geliyoruz.

Daha sonra, 25 Başak 41'in Asendanda olduğu New York'ta günün saatini bilmek istiyoruz, bu da 25 Balık 41'in Yükselen'de olduğu zaman ile aynı.

New York için Evler Tablosu bize, 25 Balık 41'in Yükselen'de olduğu zaman, Yıldız Zamanının 17s 50m 05s olduğunu gösteriyor. 9 Mart 1920'de öğlen Yıldız Saati 23h 07dk 29s idi. 23h 07m 29s'den 17h 50m 05s'yi çıkarmak bize 5h 17m 24s'lik bir Aralık verir. Buradan eksi 21m EGMT Aralığı için saat başına 9.86s düzeltmesini çıkarın ve bize eksi LMT olarak 5h 17m 20s verir.

New York'ta Çağ Aralığı. Bu, 6:43 LMT New York veya 11:39 Greenwich, 5 Mart 1920 anlamına gelir.

Sonra 9 Mart 1920'de Greenwich saat 11:39'da Ay'ın konumunu hesaplıyoruz ve 13 Akrep 01 olduğunu buluyoruz. Bu nedenle, doğum haritasında 13 Akrep 01, Yükselen'de 13 Boğa 01'i Azalan'daydı. gerçek doğum anında.

New York için Evler Tablosu, 13 Boğa 01 Yükselen'deyken, Yıldız Zamanının 19s 45dk 55s olduğunu gösteriyor. 3 Aralık 1920'de öğlen Yıldız Saati, 16h 48m 02s'dir. 19h 45m 55s'den 16h 48m 02s'yi çıkarmak, öğleden sonra 2h 57m 53s'lik bir aralık verir. Bundan artı 7h 54m EGMT Aralığı için saat başına 9.86s düzeltmesini çıkarın ve artı LMT Aralığı olarak 2h 56m 35s verir. Bu, New York'ta LMT doğum saatini 2:57 pm olarak verir.

Yukarıdaki iki tipik örnekten, olağandışı koşulların mevcut olduğu durumlar dışında, Doğum Öncesi Dönem tarafından yapılan düzeltmenin, bir doğum haritasının oluşturulmasında normal olarak mevcut olandan daha büyük matematiksel zorluklar sunmadığı görülecektir.

Bazen yukarıda gösterilen basit kurallara uymayan bir doğumla karşılaşılır ve daha sonra astrologun becerikliliği sınırına kadar vergilendirilebilir. Bu karmaşık vakalarda, elde edilen doğum haritasının doğruluğunu kontrol etmek için Doğum Öncesi Dönem dışında başka yöntemler kullanılırsa sonuçlar daha tatmin edicidir.

Astrologun Müşterisine Karşı Sorumluluğu

Saygın bir astrologun işinde müvekkilinin falını anlatmanın çok küçük bir rolü vardır. Bunun yerine, çalışması büyük ölçüde, doğum haritasının ve ilerlemiş yönlerin incelenmesiyle ortaya konduğu gibi müşterisine açık olan olasılıkların dikkatli bir değerlendirmesinden ve bu olasılıklardan en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak tavsiyeler ve talimatlar sunmaktan ibarettir.

Ulusal olayların gidişatından ve diğer insanların faaliyetleri ve servetlerinden kaynaklanan ve bireyin üzerinde hiçbir kontrolü olmayan koşullar olabilir ve çoğu zaman da vardır. Ve eğer bu olayların doğası, ne zaman olacağı ve hayatı üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirilirse, bu ona belirli bir avantaj sağlayacaktır. Bu bilgiyle, kendi işlerini bu koşullara uygun hale getirmek için önceden şekillendirebilir.

Yine de astrolog, hayatını etkileyen olayların çoğunun kaçınılmaz olmadığı konusunda onu etkilemek için biraz çaba sarf etmelidir. Sadece astral bedeninde belirli bir şekilde organize edilmiş düşünce hücrelerine sahip olduğu için ona çekilirler. Astral bedeninin düşünce organizasyonunu değiştirmek ve ilerlemiş yönlerin enerjisini sadece o normalden daha aktif olmayı seçtiği düşünce hücresi gruplarını mümkün kılacak kanallara yönlendirmek onun gücü dahilindedir.

Doğum haritası, astrolog tarafından bireyin doğduğu doğal eğilimlerin ve niteliklerin haritası olarak görülmelidir. Ruhun önceki deneyimlerinin etkisinin bir haritasıdır. haritası değil

değişmeyen koşullar değil, yalnızca karakter ve doğumda var oldukları gibi koşulları çekme gücü.

Yine de yaşamın başladığı hammaddeleri deyim yerindeyse ortaya çıkarıyor. Bundan, astrolog, harcanan çabadan en tatmin edici sonuçları verecek olan çaba yollarını ayırt edebilmelidir. Ve müşterisine tavsiyelerde bulunmalı ve sahip olduğu hammaddeleri kullanarak hayatından en iyi şekilde yararlanabilmesi için nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatmalıdır.

Astrolog bu nedenle doğum haritasından yaşamın her bölümünü analiz etmeli ve bu on iki bölümün her biri ile ilgili olarak çekilen olayların normal eğilimini ayırt etmelidir. Bu bilgi, belirtildiği gibi, yalnızca en fazla ilerleme sağlamak için enerjilerin yönlendirilmesi gereken çaba çizgisini belirlemek için değil, aynı zamanda müşteriye düşünce organizasyonlarını nasıl yeniden şekillendireceği konusunda verilmesi gereken tavsiyeler için bir temel olarak kullanılmalıdır. Yaşamın uyumsuz bölümlerinde, talihsizlik çekmeyi bıraksınlar.

İlerleyen yönler, kaçınılmaz olayları ima eden şeyler olarak değil, astral beden boyunca uzanan geçici yıldız antenleri, radyo modası, birey tarafından manipüle edilmezse, astral bedenindeki düşünce hücrelerine eklenen yeni enerji olarak kabul edilmelidir. onların terminalleri.

İç düzlemden çalışan düşünce hücreleri çok şey başaracaksa, yani sonuç olaylarını çekecekse, onlara enerji sağlanmalıdır. Herhangi bir gelişmiş açı, ek enerji sağlayan ve böylece astral bedenin düşünce hücrelerinin daha fazla iş yapmasını sağlayan bir anteni haritalar. Önemli olayları çekebilirler

onlara ulaşan enerji miktarıyla karşılaştırılabilir. Bu nedenle, herhangi bir gelişmiş yön, aksi takdirde mevcut olmayacak olayları çekmek için olanaklar sunar.

Sorun, uyumsuz bir geçici yıldız anteni tarafından alınan enerjinin astral bedene ulaşmasını engellemek değil, ulaştığı düşünce hücrelerinin ortaya çıkan aktivitesinin onları çekecek kadar uyumlu olmasını sağlayacak şekilde yönlendirmek, manipüle etmek veya kontrol etmektir. felaket yerine şanslı olaylar.

Astral bedendeki düşünce hücrelerine eklenen en uyumsuz geçici enerji bile, onları doğum haritasında haritalandıran gezegenlerin güçlü talihli yönleriyle gösterildiği gibi, kendileri temelde talihlidirler, zihinsel tutum ya da ahenk ile yönlendirilmeleri zor değildir. Mevcut olabilecek Güçler, hatırı sayılır bir servet çekecek kanallara toplanacak. Astrolog, bu nedenle, bu tür koşullar altında çaba sarf etmekten vazgeçmek için acele etmemelidir; bunun yerine ek enerjiden nasıl yararlanılabileceğine dair dikkatli bir analiz yapın.

Daha zor bir problem ise, doğum haritasından ve ilerlemiş açıdan bakıldığında, enerjinin kendi haline bırakılması halinde talihsizliği çekeceği açıktır. Ancak bu gibi durumlarda bile, yeni enerjinin niteliğini zihinsel tutum yoluyla değiştirmek için olanaklar açıktır. Tam olarak bu olasılıkların neler olduğu ve müvekkilinin belirli faaliyetlerden ve belirli çevre türlerinden mümkün olduğunca tamamen kaçınması gerektiği, astrolog tarafından keskin bir muhakeme gerektirir.

Düşünce hücrelerinin uyumu ya da uyumsuzluğu, çekilen olayın bahtını ya da talihsizliğini belirlediğinden,

Yaşamın belirli bir bölümündeki düşünce hücrelerine daha büyük bir uyum verildiği ölçüde, olaylar o ölçüde daha şanslıdır. Bu tür bir uyum, ya bir Zihinsel Panzehirin uygun şekilde uygulanması yoluyla ya da Dönüşüm yoluyla, her iki yöntemde de değiştirilen düşünce hücrelerinin bileşimi yoluyla verilebilir; ya da uyumlu Toplanma Kuvvetlerinin uygulanması yoluyla, süreç uyumlu enerjilerin o sırada ilerlemiş yönler tarafından haritalanan tüm geçici yıldız antenlerine ulaştığı ve böylece yaşamın çeşitli bölümlerini yöneten yıldız hücrelerine giden yolunu bulduğu, tamamen uyumlu hale getirildiği uyumlu Toplanma Kuvvetleri.

Böylece, diğer şeylerin yanı sıra, ilerlemiş yönlerin sunduğu olasılıkları değerlendirmek ve müşterisine astral bedeninin düşünce yapısının nasıl değiştirilebileceğini ve ilerlemiş yönler tarafından haritalanan yeni enerjilerin nasıl yönlendirilebileceğini öğretmek astrologun işi olur. en iyi avantaj.

Hayat her bireye bir dizi problem sunar ve astrolog, astroloji bilgisi ve bilinçaltının işleyişi ile insanlara bu problemleri en avantajlı şekilde çözmelerinde yardımcı olmak konusunda uzman olmalıdır. Ortaya çıkabilecek her koşulda en iyi hareket tarzı ve en iyi zihinsel tutum vardır; ve müvekkili için bunları keşfetmek ve ona açıklamak astrologun görevidir.

Müvekkiline, bir hareket tarzını ve zihinsel tutumu uygun hale getiren koşulların gelişme eğilimine işaret ederken, telkin gücünü daima aklında tutmalıdır. Korku duygusu aşılamak yerine, yapıcı çabanın yolunu göstermelidir. Onun bakış açısı

En olumsuz koşullar altında bile, onları olabileceklerinden daha iyi hale getirmek için her zaman bir şeyler yapılabilir olmalıdır.

Astrolog, tavsiyeleri aracılığıyla insanlara, doğum çizelgelerinin aksi takdirde dayattığı sınırlamaların üstesinden gelmede, aksi takdirde ilerlemiş yönler tarafından haritalanan geçici yıldız antenlerinin çekeceği rahatsızlıklardan kaçmada ve yararlılık, mutluluk ve maneviyat kazanmada yardımcı olabilir. , kendisini görevinde başarılı saymakta haklı mı?

Böylece, kendisinin yanı sıra başkalarına da, EVRENSEL REFAHLARINA EN ÇOK KATKIDA BULUNMASINA yardımcı olacaktır.

-

son notlar

1 Baskısı tükenmiş, bkz.*Astroloji: 30 Yıllık Araştırma*Doris Chase Doane tarafından.

2 a.g.e.

Bu, bu kursun final sınavı DEĞİLDİR

Aşağıdaki sorular çalışma amaçlıdır

sadece.

Çalışma Soruları

Kurs X-2 Doğum Astrolojisi
Burçta İlerleme

(Hermetik Sistem)

Lütfen Dikkat: Sınav için yalnızca bir final sınav kağıdı vardır.

Kurs X'in iki bölümü.

Bölüm 1
Hermetik İlerleme Sistemi

1. Keldanilere tahminde bulunma konusunda olağandışı kesinlik kazandıran nedir?

2. Diğerlerini almadan önce bir sistemde uzmanlaşmak neden en iyisidir?

3. Küçük İlerlemeler ihmal edildiğinde eksik olan nedir?

4. Neden birçok insan Transitlerin gücünü abartma eğilimindedir?

5. Üç tür ilerlemenin değeri nasıl kontrol edilmelidir?

6. Neden tüm gereksiz faktörler ihmal edilmelidir?

7. Pek çok etkeni barındırdığı sürece hangi sistem izlenirse izlensin belirli bireylerin başlangıçta kesin sonuçlar alması neden mümkündür?

8. Tahmin, astral bedendeki belirli düşünce hücresi gruplarıyla ilgili olarak neyin tespit edilmesine bağlıdır?

9. Hızlar arttıkça zamana ne olur?

10. Çok yavaş olan Büyük Aşama Zamanının 24 saatinde meydana gelen olayların dış dünyanın hızlı Takvim Zamanında ifade edilmesi ne kadar sürer?

11. Orta derecede yavaş Küçük İlerleme Zamanının 27.3 gününde (bir astrolojik ay) meydana gelen olayların dış dünyanın hızlı Takvim Zamanında ifade edilmesi ne kadar sürer?

12. Hızlı Transit süresinin 365,b gününde (bir yıl) meydana gelen olayların dış dünyanın hızlı Takvim zamanında ifade edilmesi ne kadar sürer?

13. İlerlemiş bir gezegen, doğum haritasındaki bir gezegenle veya başka bir büyük-ilerlemiş gezegenle açı oluşturduğunda, bu enerji salınımı astral bedende ne oluşturur?

14. Büyük, küçük veya transit ilerleme ile ilerlemiş bir durum tarafından belirtilen olayın gerçekleşmesinin beklenebileceği etkin küre nedir?

15. Mükemmelden bir derecede, en yüksek yükün yaklaşık ne kadarı ilerlemiş bir görünüm tarafından alınır?

16. Bir ilerlemenin gösterdiği olayın önemi neye bağlıdır?

17. İlerlemiş bir görünüm tarafından haritalanan geçici havanın, topladığı enerjiye uyumlu bir dönüş mü yoksa onu uyumsuz statik ile mi yükleyeceğini belirleyen nedir?

18. Çektiği olayın talihi veya talihsizliği astral bedende neye bağlıdır?

19. Gelişmiş bir görünüm tarafından haritalanan geçici bir yıldız anteni tarafından sağlanan enerji, bir grup düşünce hücresinin hissettiği uyum veya uyumsuzluğun miktarını belirlemede genellikle doğum haritasındaki yönlerle haritalanan kalıcı antenlerden daha mı önemlidir?

20. Doğum haritasına ek olarak, bir astrologun ilgilenmesi gereken önceden belirlenebilen zamanlarda astral bedeninde yapısal değişikliklere neden olan enerji salınımlarını ölçen bir bireyin hayatındaki üç olumlu etki nelerdir?

21. Bir Büyük-İlerlenmiş Unsur, bir Bağımsız Küçük-İlerlenmiş Unsur ve bir Bağımsız Transit Unsur tarafından uygulanan etkideki tek fark nedir?

22. Logaritma ile hesaplandığında, orantı ile hesaplandığında ilerlenmiş bir yönün mükemmel olduğu kesin süre arasında herhangi bir fark var mı?

23. Sınırlama Tarihi nedir?

24. Büyük İlerleme Tarihi nedir?

25. On gezegenin her biri için, ilerlemiş bir açıdan dahil olan bir baş etki olduğunda, etkilenen üç şeyi belirtin.

Bölüm 2
Güneş ve Açıların Büyük İlerlemeleri

1. Bir kişi, yaratık veya önemli bir olayın doğduğu andaki iç düzlemdeki hava durumu ile daha sonra doğan şeyin iç düzlemdeki makyajı arasındaki ilişki nedir?

2. İlerlemiş bir görünüm tarafından haritalanan iç düzlem hava durumu, düşünce hücrelerinin arzularına ne yapar?

3. İlerleyen yönler yoluyla ek enerji alan düşünce hücreleri, arzu ettikleri türden olayları yaşama çekmek için hangi iç düzlem gücünü kullanır?

4. Herhangi bir zamanda bir bireyi etkileyen en önemli iç düzlem hava durumunu haritalayan nedir?

5. Genel olarak kaç terminalde büyük ilerleme var?

6. Bir olay meydana geldiğinde veya bir hastalık geliştiğinde, ana ilerleme sabitlerinin her biri her zaman ne tarafından pekiştirilir?

7. Bir olay meydana geldiğinde veya bir hastalık geliştiğinde, ana ilerleme sabitlerinin her biri her zaman ne tarafından serbest bırakılır?

8. Herhangi bir ilerleme durumu için dış küre sınırı nedir?

9. Gezegenlerin konumlarının hesaplandığı doğum günündeki EGMT Aralığından Sınırlama Tarihi nasıl bulunur?

10. Sınırlı Tarih her zaman doğumla aynı yılda mı?

11. Herhangi bir takvim yılı için Büyük İlerleme Tarihinin bulunmasında, sayım efemeriste hangi tarihten itibaren başlar?

12. Büyük İlerleme Tarihinin bulunmasında doğumdan bu yana geçen yılların sayısı mı hesaplanmalıdır?

13. Midheaven Sabiti nasıl bulunur?

14. Büyük ilerlemeler çalışırken, doğrudan orantı yerine logaritma kullanmak neden genellikle daha kolaydır?

15. Takvim aralığı eşdeğer EGMT Aralığına nasıl dönüştürülür?

16. Belirli bir efemeris gününde, bir gezegenin büyük ilerleme ile ne kadar ilerlediğini bulmak için hangi logaritmalar eklenir?

17. Belirli bir tarihte majör, minör veya transit geçişli MH nasıl bulunur?

18. Majör, minör veya transit geçişli Asc nasıldır? belirli bir tarihte bulundu?

19. Görünüşün mükemmelden uzaklığının logaritmasından çıkarılanın logaritması, gezegenin açıyı kapatması için gereken EGMT Aralığının logaritmasını bulmak için?

20. Gezegenin açıyı kapatması için gereken EGMT Aralığı bulunduğunda, açının mükemmel olduğu takvim tarihi nasıl belirlenir?

21. Büyük ilerleme ile Güneş altı günde yaklaşık ne kadar hareket eder ve bir ayda ne kadar uzağa gider?

22. Asc. bir doğum haritası gezegen için mükemmel mi?

23. İlerlemiş burçların ilerlemiş hareketi nasıldır? MC veya Asc. bulundu?

24. Ne zaman MC veya Asc günlük hareket. ve gezegen bulundu, aralarındaki açının mükemmel olduğu takvim tarihi nasıl belirlendi?

25. Yükselen'i doğum enlemine göre düzeltmek için logaritma kullanırken, düzeltmenin logaritması nasıl bulunur?

Bölüm 3
Ay'ın Önemli Gelişmeleri

1. İlerlemiş bir gezegenin doğum haritası terminaline kıyasla ne kadar gücü vardır?

2. Güçteki bu farklılıktan başka, bir açı alan bir doğum haritası gezegeninin, ilerleme yoluyla aynı veçheye dahil olduğu zamandan farklı bir etkisi olur mu?

3. Her gezegen tarafından haritalanan iç düzlem hava durumu, düşünce hücrelerinin o gezegenin karakteristik yaşam koşullarını ve olaylarını getirmesine neden olma eğiliminde midir?

4. İlerlemiş bir açıdan etkilenen iç düzlem havasının olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu gösteren nedir ve ne şekilde?

5. İlerlemiş bir görünüm tarafından haritalanan iç düzlem hava durumunun esas olarak etkileyeceği yaşam bölümünü gösteren nedir?

6. Bir kişi yalnızca hangi gezegenin ilerlemiş bir yönü olduğunda onur alır?

7. Ay'ın ilerlemiş bir görünümünden etkilenen geçici ruh halini ne gösterir?

8. Hangi gezegenin en çok hataya neden olma eğilimini içeren uyumsuz ilerlemiş yönler?

9. Venüs'ün düzlem içi havasından ne kadar iyi şans etkilenir?

10. Mars'ı içeren herhangi bir ilerleme durumu altında hangi iki şey yapılmalıdır?

11. Satıcılık gezegeni nedir?

12. Satürn'ün dahil olduğu herhangi bir gelişmiş açıda hangi iki şey yapılmalıdır?

13. Uranüs iç düzlem havasının etkisiyle değişimlerin meydana geldiği araç nedir?

14. Neptün tarafından vaat edilenler genellikle yüzde kaç oranında indirime tabi tutulmalıdır?

15. Kişi hangi iç düzlem havasında, her iki düzlemdekilerin düşüncelerine karşı en duyarlı hale gelir?

16. Diğer gezegenler tarafından yapılmış benzer gelişmiş açılara kıyasla Ay'ın yaptığı gelişmiş açıların çektiği olaylar hakkında ne kadar önemlidir?

17. Majör, minör veya transit ilerlemeli MC veya Asc'nin sapma hareketi nasıl bulunur?

18. Büyük ilerleme gösteren MC'yi içeren paralel bir yönün hangi takvim tarihini bulmada ilk adım nedir?
veya Art. mükemmel?

19. Büyük ilerleme gösteren MC'yi içeren paralel bir yönün takvim tarihini bulmadaki ikinci adım nedir?
veya Art. mükemmel?

20. Ne zaman MC veya Artan sapma ile günlük hareket. haritada. D. ve Haritadaki sapma ile gezegenin günlük hareketi. D. Bulundu, ardından nasıl bir yöntem izleniyor?

21. Ay'ın yaptığı tüm önemli ilerlemeler ne kadar ileride hesaplanmalıdır?

22. Ay tarafından yapılan gelişmiş açıları hesaplarken, majör-ilerlemiş MC ve majör-ilerlemiş Yükselişin işaretini, derecesini ve dakikasını ve eğimini haritaya yazmak neden avantajlıdır? art arda iki Harita için hesaplanmıştır. D.'ler arasında ilerlemiş Ay Hesaplamaları yapılacak mı?

23. Bu şekilde yazılır, MC veya Asc'nin yıllık burç hareketi ve yıllık sapma hareketi nasıldır. bulundu?

24. Bir yılı kapsayan Ay'ın büyük gelişmiş yönlerini hesaplamaya hangi tarihte başlamak avantajlıdır?

25. Ay'ın ana gelişmiş yönlerini logaritmalarla hesaplamak orantıdan neden daha kolay?

4. Bölüm
Gezegenlerin Başlıca Gelişmeleri

1. Hangi gezegenleri içeren paralellikler ve kavuşumlar elverişlidir?

2. Hangi gezegenleri içeren paralellikler ve kavuşumlar elverişsizdir?

3. Herhangi iki gezegen arasındaki hangi yönler uygundur?

4. Herhangi iki gezegen arasındaki hangi yönler olumsuzdur?

5. Düşünce hücrelerinin, olumlu olayları mı yoksa olumsuz olayları mı hayata geçirmek için psikokinetik güçlerini kullanacağı neye bağlıdır?

6. Herhangi bir gezegen tipinin düşünce hücreleri, yapıcı veya yıkıcı olarak ifade edebilir mi?

7. İlerlemiş bir bakış açısı altında, yalnızca ilgili gezegenlerin özelliği olan yapıcı düşüncelerin zihne girmesine izin vermek neden tavsiye edilir?

8. Onunla çakışan talihi veya talihsizliği belirleyen bir yön tarafından haritalanan iç düzlem hava durumu mu?

9. Düşünce hücrelerinin psikokinetik gücüyle olan ilişkisinin fiziksel çevrenin etkisi ne kadar önemli?

10. Hangi cebirsel toplam, belirli bir ilerleme durumu altında ne olacağını gösterir?

11. İlerleyen bir yönün gösterdiğinden daha şanslı bir olayın çekileceğini garantilemek için, terminallerinin her biri tarafından haritalanan düşünce hücrelerinin ne alması gerekir?

12. Güneş ile olumsuz bir gezegen arasındaki olumsuz bir ilerleme durumu altında ne tür düşünceler geliştirilmelidir?

13. Güneş'i içeren olumsuz gelişmiş açılar altında hangi şeylere özel dikkat gösterilmelidir?

14. Ay'ın dahil olduğu olumsuz gelişmiş açılar altında hangi şeylere özel dikkat gösterilmelidir?

15. İyi fikirler ve değerli keşifler genellikle Merkür'ü içeren olumsuz bir ilerleme durumuna mı geliyor?

16. Venüs'ü içeren olumsuz bir ilerleme durumu altında, başkalarından gelen küçümsemelere nasıl davranılmalıdır?

17. Bir kaza meydana geldiğinde hangi gezegenin her zaman mevcut olduğunu içeren gelişmiş bir görünüm?

18. Hangi gezegeni içeren olumsuz ilerleme durumlarında, kendini beğenmişlik, savurganlık ve aşırı genişlemeden kaçınılmalıdır?

19. Satürn'ü içeren olumsuz bir ilerleme durumu altında hangi düşünceler geliştirilmelidir?

20. Hangi gezegeni içeren olumsuz bir ilerleme durumu altında bile astrolojide ve okült bilimlerde alışılmadık derecede iyi ilerlemeler kaydedilebilir?

21. Kurgu yazımı, müzik veya dramatik çalışmalarda genellikle hangi gezegeni içeren olumsuz bir ilerleme durumu altında bile iyi bir ilerleme kaydedilebilir?

22. Plüton'u içeren olumsuz bir ilerleme durumunda hangi şeylerden kaçınılmalıdır?

23. MC'yi veya Yükseliş'i içeren ilerlemiş bir görünüm altında alınan ana enerji nedir? ?

24. MH'yi içeren olumsuz bir ilerleme durumu altında hangi düşünceler ve eylemler geliştirilmelidir?

25. Asc. ?

Bölüm 5
Güneş ve Açıların Küçük İlerlemeleri

1. Küçük ilerlemeli yönlerin uyguladığı iki farklı etki nelerdir?

2. Benzer bir majör-ilerlemiş yönüne göre ne kadar güce sahip, bağımsız bir minör-ilerlemiş yönü var?

3. Küçük olaylar hangi gelişmiş yönlerle örtüşür?

4. Büyük-gelişmiş bir yönün, büyük bir olayı çekmek için yeterli güç kazanması için, hangi şekilde güçlendirilmelidir?

5. Terminallerinden birinin minör-ilerlemiş yönüne ek olarak, olay hayata girdiği anda majör-ilerlemiş yönüne ek olarak başka hangi gelişmiş veçhe mevcut olmalıdır?

6. Neden bazı durumlarda, bir minör-ilerlemiş yönün ne zaman bir doğum haritasının veya büyük-ilerlemiş bir pozisyonun bir derecelik etkin küre içinde olduğunu ve ne zaman olmadığını tam olarak belirleyebilmek önemlidir?

7. Küçük ilerlemeli yönler, çizelgeleri düzeltmeye nasıl yardımcı olur?

8. Küçük ilerlemeli yönler, işleri yapmak için en iyi zamanın seçilmesine nasıl yardımcı olur?

9. Diğer küçük ilerlemiş gezegenlere yapılan küçük-ilerlemiş açıların herhangi bir önemi var mı?

10. Güneş Sabiti Nedir?

11. Güneş Sabiti nasıl bulunur?

12. Küçük İlerleme Tarihi nedir?

13. Küçük İlerleme Tarihi nasıl bulunur?

14. Küçük Efemeris Tarihi nedir?

15. Minör Efemeris Tarihi nasıl bulunur?

16. Belirli bir takvim tarihinde gezegenlerin Küçük-İlerlemiş Konumu nasıl bulunur?

17. Bir doğum haritasının veya majör ilerlemiş pozisyonun küçük-ilerlemiş yönünün mükemmel olduğu takvim tarihi nasıl bulunur?

18. Minor-Progressed'den takvim tarihi nasıl bulunur? MC?

19. Minor-Progressed MC veya Asc'ın zodyak hareketi nasıldır? bulundu?

20. Belirli bir Asc için MC'deki işaret nasıl bulunur? ?

21. Minör-ilerleyen MC veya Asc'dan bir yönün hangi takvim tarihi üzerinde bulunduğu nasıl bulunur. majör ilerleme veya doğum haritası pozisyonu için mükemmel mi?

22. Minör-ilerleyen MC veya Artan'ın düşüşü nasıl? belirli bir takvim tarihi için bulundu?

23. Minör ilerlemeli sapma ile hareket nasıldır? MC veya Asc. bulundu?

24. Bir majör, minör veya transit ilerlemiş bir gezegenin, MC'de ilerlediği veya Yükselişte ilerlediği takvim tarihi nasıl bulunur? Zodyakın belirli bir işaretine, derecesine ve dakikasına mı, yoksa belirli bir derece ve sapma dakikasına mı ulaşıyor?

25. Minör-ilerleyen MC veya Asc'nin hangi takvim tarihi üzerinde bulunduğu nasıl bulunur. majör ilerleme veya doğum haritası konumu ile paralel bir açı yapar mı?

Bölüm 6
Ay ve Gezegenlerin Küçük İlerlemeleri

1. Minör-ilerlemiş bir yönün majör-ilerlemiş bir terminale olan uyumu ya da uyumsuzluğu, o zaman çekilen olayın uyumu ya da uyumsuzluğu üzerinde kayda değer bir etkiye sahip midir?

2. Büyük ilerleme gösteren bir yönün ortaya çıkardığı olayın ne kadar lehte veya aleyhte olacağını belirlemek kolay mı?

3. Büyük ölçüde ilerlemiş bir yönün güçlendirilmiş güç zirveleri ile neler elde edilebileceğine dair adil bir tahmin?

4. Olayların ne kadar olumlu veya olumsuz olacağını tahmin ederken, bu iki gezegeni içeren büyük-ilerlemiş bir yönün çekimine kapılırken, doğumdaki iki gezegenin uyumu veya uyumsuzluğu ne ölçüde dikkate alınmalıdır?

5. Neden tek bir ana-ilerlemiş yön bazen yaşamın bir bölümünde kayıp ve diğerinde kazanç getirir?

6. İlerlemiş bir üçgenin hayata talihsizlik getirmesi hangi koşullar altında mümkündür?

7. İlerlemiş bir karenin hayata iyi şans getirmesi hangi koşullar altında mümkündür?

8. İlerlemiş bir açıdan etkilenen yaşamın her bölümünden beklenen fayda veya zararı hangi hesaplamalar gösteriyor?

9. Bir birey, Güneş'i içeren olumlu bir gelişmiş açı altındayken, emrinde ne gibi bir avantaja sahiptir?

10. Bu hangi şekilde uygun bir Toplanma Gücü olarak kullanılabilir?

11. Gezegenlerden gelen enerjiler yalnızca hangi koşullar altında Toplanan Kuvvetler haline gelir?

12. Ay'ın yaptığı gelişmiş yönler neden bu kadar sıklıkla elverişli Toplanma Kuvvetleri olarak kullanılabilir?

13. Merkür'ün dahil olduğu olumlu gelişmeler ne için kolaylık sağlıyor?

14. Venüs'ü içeren olumlu bir ilerleme durumu altında başkalarına karşı hangi tutum en iyisidir?

15. Mars'ı içeren olumlu bir ilerleme durumu altında bile, düşmanlıktan kaçınmak her zaman mümkündür.

16. Mars'ı içeren olumlu bir ilerleme durumu altında ihtiyaç duyulan tek şey nedir?

17. Olumlu gelişmiş bir açı altında Jüpiter ne yapmak için hiçbir çabadan kaçınılmamalıdır?

18. Hangi gezegeni içeren olumlu gelişmiş yönler altında, en iyi avantaj için alımlar yapılabilir?

19. Satürn'ü içeren olumlu bir ilerleme durumu altında bile, hangi düşüncelerin xiulian uygulamasına ihtiyacı var?

20. Uranüs'ü içeren olumlu bir ilerleme durumu altında bile oluşan bağlılıklar genellikle kalıcı mıdır?

21. Gerçek ruhsal ilerlemeye yardımcı olmak için tüm gelişmiş yönlerden en iyilerinden biri nedir?

22. Plüton'un dahil olduğu olumlu bir ilerleme durumu altında bile, bir kişi bir an için kendi kontrolünü teslim etmeli mi?

23. MH'yi içeren olumlu bir ilerleme durumu kapsamında ne yapılmalıdır?

24. Asc'yi içeren olumlu bir ilerleme yönü altında ne yapılmalı? ?

25. Küçük ilerlemeli yönler, yarım saatlik takvim zamanından daha az bir hassasiyetle nasıl hesaplanabilir?

Bölüm 7
Geçişler, Devrimler ve Döngüler

1. Karakteristik bir majör-ilerlemiş yönün minör-ilerlemiş yönü ile pekiştirilmesi ve bir transit-ilerlenmiş veçhe tarafından majör-ilerlenmiş yönün terminallerinden birine salıverilmesi dışında, hiç büyük bir olay meydana gelir mi?

2. Transit yönlerin uyguladığı iki farklı etki nelerdir?

3. Büyük ilerlemeli yönlere kıyasla, transit ilerlemeli yönler ne kadar güce sahiptir?

4. Önemli ilerleme aşamalarını görmezden gelenler, ortalama olarak önemli geçiş yönlerinin yarısını neden gözden kaçırıyorlar?

5. Transit-ilerleyen yönlerin önemli işlevi hakkında bilgi, doğum çizelgelerinin düzeltilmesine nasıl yardımcı olur?

6. MC ve Asc'nin transit yönlerini yapın. doğum haritasına ve büyük ilerleme pozisyonlarına tetikleyici etki mi gösteriyor?

7. Gezegenlerin, MC ve Asc'nin paralel açılarını yapın. tetikleyici etkisi var mı?

8. Transit yönlerin yalnızca hangi konumlarda değeri vardır?

9. Ulusları ve dünyayı etkileyen astrolojik anlaşmazlıklar genellikle hangi insanlar aracılığıyla işler?

10. Olağan koşullar altında çok az etkiye sahip olan gelişmiş bir yönün, farklı çevresel koşullar altında nasıl şiddetli bir etkiye sahip olabileceğini açıklayın?

11. Büyük ilerlemeli bir yön, yıllarca bir olayı çekmeden bir derece etkili küre içinde olduğu için, bu, sonunda kendine özgü bir olay meydana getirmeyeceği anlamına mı geliyor?

12. Bir okuma yaparken telkin gücünü göz önünde bulundurmak neden bu kadar gerekli?

13. Herhangi bir takvim gününde günün herhangi bir saatinde bir gezegenin transit ilerlemiş konumu nasıl bulunur?

14. İlerleyen bir transit yönü mükemmel olduğunda takvim tarihi ve günün saati nasıl belirlenir?

15. Belirli bir tarihte transit ilerlemeli MC nasıl bulunur?

16. Transit nasıl ilerliyor? belirli bir tarihte bulundu?

17. Transit ilerlemeli MH'den takvim tarihi nasıl belirlenir?

18. Transit-ilerleyen MC'nin zodyak hareketi nasıldır? veya Art. bulundu?

19. Transit ilerlemeli bir yönün bir doğum haritası veya büyük ilerlemeli pozisyon için mükemmel olduğu takvim tarihi nasıl bulunur?

20. Transit ilerlemeli MC veya Asc'nin düşüşü nasıl? belirli bir tarih için bulundu?

21. Transitin sapma ile hareketi nasıl ilerledi? MC veya Asc. bulundu?

22. Günün saati, gökyüzündeki bir açının mükemmel olması veya bir gezegenin belirli bir işarete, boylam derecesine ve dakikasına ulaşması veya belirli bir sapma derecesi ve dakikasına nasıl ulaşılıyor?

23. Güneş devrimleri, bir sonraki yıl içinde ne olacağını tahmin etmede güvenilir bulundu mu?

24. Ay devrimleri, bir sonraki ay ne olacağını tahmin etmede güvenilir bulundu mu?

25. Günlük devrimler, ertesi gün ne olacağını tahmin etmede güvenilir bulundu mu?

Bölüm 8
Burcun Düzeltilmesi

1. Doğadaki diğer güçlerle aynı kontrole tabi olan insanın daha ince bedenine eklenen gezegensel enerjiler ne şekildedir?

2. Bu nedenle, astrolojik olarak ortaya konduğu gibi, astrolojik güçlerin hacmini ve doğal eğilimini tahmin etmekten bile daha önemli olan, hangi bilgidir?

3. Bir bireyin doğru doğum haritasına sahip olmak neden bu kadar önemlidir?

4. Doğum saati kaydedilmeden doğru doğum haritasını belirlemenin kolay ve kesin bir yöntemi var mı?

5. Doğum zamanı not edildiğinde, doğum çizelgelerinin çok fazla düzeltilmesi neden kötü bir uygulamadır?

6. Gelecekteki belirsiz doğum zamanlarının en iyi çözümü nedir?

7. Profesyonel astrologlar, yaklaşık bir saat verilmemişken neden genellikle doğru doğum zamanını tespit etmekte başarısız oluyorlar?

8. Neden kişi, profesyonel astrologdan daha iyi, kendi çizelgesini şüpheye yer bırakmayacak şekilde düzeltmek için yeterli çalışmayı göze alabilir?

9. Düzeltmenin ilk adımı nedir?

10. Kişisel görünüm neden doğru yükselen burcun yalnızca bir göstergesi olarak görülsün?

11. Evler bilinen olaylara uyana kadar haritayı döndürmenin ilkesi nedir?

12. Doğal Harita ile ne kastedilmektedir?

13. Neden, bir Doğal Haritadan veya ev konumlarının bilinmediği başka bir haritadan, ilerlemiş bir açıdan etkilenen yaşam bölümünü tahmin etmek için hiçbir girişimde bulunulmamalıdır?

14. Hazır zekalı bir kişi, bir harita oluşturmadan nasıl halka açık bir platformdan şaşırtıcı bir astroloji gösterisi sunabilir?

15. Bir harita için doğru ev konumlarını belirleme deneme yanılma çalışmasında, doğum saati bilinmediğinde, astrolojik araştırma nasıl avantaj sağlayabilir?

16. Küçük İlerlemeler, kendi haritasını düzeltmeye çalışan bir kişi tarafından nasıl kullanılabilir?

17. Doğru olduğuna inanılan bir harita tespit edildiğinde, doğum gününün saati nasıl tespit edilir?

18. Hermes'in Truitini nedir?

19. Prenatal Epoch yönteminin Hermes'in Truitine yönteminden farkı nedir?

20. Doğum saati yaklaşık olarak bilindiği zaman, çizelgelerin yüzde kaçı, Asc'daki tam derece ve dakikaya göre düzeltilebilir. Prenatal Epoch tarafından?

21. Öğrenci, Doğum Öncesi Dönem tarafından belirli bir haritanın düzeltilmesinin olası gözlem hatasının ötesinde bir doğum zamanı verdiğini bulduğunda ne yapmalıdır?

22. Saygın bir astrologun başlıca işi müşterinin falını anlatmak yerine ne oluşturur?

23. Müneccim, müvekkilinin hayatını etkileyebilecek olayların kaçınılmaz olmadığı konusunda müvekkilini neden etkilemelidir?

24. Müvekkili ile konuşurken astrolog neden düşüncelerinin gücünü ve telkin gücünü dikkate alsın?

25. Astrolog, görevinin başarısını hangi standarda göre ölçmelidir?

Not: Sadece bir final sınavı vardır.
Kurs X'in iki Bölümü.

-